Field Museum of Natural History

LIBRARY

Chicago

From Strecker Collection

Class A 46.03 Book Gr556

Gemini 3632

Gen
1777.3

79463
v.1

ENTOMOLOGISCHE

BEYTRÄGE

ZU

DES RITTER LINNE'

ZWÖLFTEN AUSGABE

DES NATURSYSTEMS

VON

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Paſtor an der Kirche S. Blaſii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede der Geſellſchaft Naturforſchender Freunde in Berlin, der Herzoglichen deutſchen Geſellſchaft in Helmſtädt, der Naturforſchergeſellſchaft in Halle, und der Königlich Schwediſchen patriotiſchen Geſellſchaft zu Stockholm.

DRITTEN THEILES DRITTER BAND.

34917

Leipzig,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1781.

R.B. Gen
F777.3
V. 3/3-4

FIELD
MUSEUM

F/F4F

VORREDE.

Dieſer *dritte Band* meiner entomologiſchen Beyträge iſt zu einer ziemlichen Stärke angewachſen, weil die *neuen Arten* der *Spinner*, der *Eulen* und der *Spanner* ungemein zahlreich ſind. Mit den *letztern* habe ich ihn geſchloſſen, und werde den *vierten und letzten Theil* der Lepidopterorum mit den *Blattwicklern* anfangen; alsdann aber auch dieſe ganze Klaſſe der Inſekten zu Ende bringen.

Statt des *ſchuldigen Nachtrags* zu allen bisher erſchienenen Bänden will ich meine Leſer mit den wichtigſten und neueſten *Inſektenwerken* bekannt machen, die in dieſem Jahre herausgekommen ſind. Einige müſste ich beynahe ganz ausſchreiben, welches ohne Nutzen wäre. Ein jeder kann ſich daraus die Inſekten aller Geſchlechter und Arten ſehr leicht ſeinem Exemplare beytragen; mich aber einer *unbeſchreiblichen Arbeit* überheben.

Das erſte neue Inſektenwerk führt den Titel:

Repréſentation exactement colorée d'après Nature des *Cigales* & des *Punaiſes*, qui ſe trouvent dans les quatre Parties du monde, l'Europe, l'Aſie, l'Afrique & l'Amérique, raſſemblées & décrites par Caſpar *Stoll*, à Amſterdam chez Jean Chrét. *Sepp.* gr. 4. 1780.

Auſserdem hat das Werk einen holländiſchen Haupttitel, und iſt in beyden Sprachen abgefaſst. Bis jezt ſind davon *drey Hefte* erſchienen. Der Preis von jedem 4 holländiſche Gulden. Bey dem dritten wird verſprochen, daſs den Beſitzern des Originals auch der *deutſche Text* unentgeldlich ſolle nachgeliefert werden. Ferner, daſs jeder deutſche Textbogen des eigennützigen Nachdrucks wegen durch J. C. *Sepp* eigenhändig ſolle unterſchrieben ſeyn, auf daſs keine verſtümmelte Kopie dieſes Werks für das Seinige ausgegeben werde.

Wer die *Seppiſchen Malereyen* aus den Niederländiſchen Inſekten und aus ſeinem Vogelwerke kennet, der wird ſich bey dieſem gleichen Fleiſs, gleiche Feinheit und Geſchicklichkeit verſprechen können.

Dieſes gegenwärtige iſt gleichſam ein Pendant zu Cramers Papillons exotiques, deren Ausgabe Herr *Stoll* jezt beſorget. Nur Schade, daſs man in beyden Werken, bey den Inſekten, wie im *Drury*, nichts als eine magere Beſchreibung derſelben, und gar keine Naturgeſchichte findet. Daher der Preis dem eigentlichen Nutzen, wenn wir das Syſtem ausnehmen,

men, wenig entſpricht, da das Kramerſche Werk, wenn es mit dem vierten Theile geſchloſſen wird, 160 Thlr. koſtet.

Der Verfaſſer hat zuerſt die *Zigalen* (Cicada L.), hernach die *Wanzen* (Cimex L.) beſchrieben und abgebildet.

Bey den *erſten* hat er die Linnéiſche Eintheilung in *fünf Familien* beybehalten; ſolche aber mit der *ſechſten* (Fulgora) vermehret, welches hier die erſte iſt.

1) Fulgora *Laternaria* L. t. 1. f. 1.
2) *Cic. Foliacea:* Cigale feuillée à taches noires & blanches: eine *neue.* t. 1. f. 2.
3) *Foliac.* L'Orphelin rouge & noir. t. 1. f. 3. eine *neue.*
4) *Deflexa:* La Cigale Demoiſelle. t. 1. f. 4. eine *neue.*
5) *Deflexa:* Porte-miroir noir. t. 1. f. 5. eine *neue.*
6) Cicada *Querula.* t. 1. f. 6. (m. Beytr. Tom. II. p. 151. no. 17.)
7) *Fulgora* fuſca. t. 2. f. 7. (Beytr. II. p. 123. no. 3. Fulg. *tenebroſa* Fabric.)
8) *Cruciata:* La *Croix.* t. 2. f. 8. eine *neue.*
9) *Deflexa:* Cic. *Phalaenoïdes* L. no. 40. t. 2. f. 9.
10) *Ranatra:* Cic. *Rubra* L. no. 45. t. 2. f. 10.
11) *Mannifera:* Cic. *Haematodes* L. no. 14. t. 2. f. 11.

Wanzen.

Die Eintheilung nach der äuſserlichen Form, und nach dem eigenen Syſtem des Verfaſſers, etwas vom Linnéiſchen verſchieden: in *ſieben Familien.*

1) *Erſte Familie:* glatter Bruſtſchild; das Rückenſchildchen ſo groſs, daſs es die Flügel und den Hinterleib bedeckt.

2) Bruſtſchild glatt und breit; Rückenſchildchen groſs und faſt dreyeckig; bedeckt mit ſeinem ſpitzen Winkel den halben Hinterleib.

3) An den Schultern des Bruſtſchildes ein ſpitzer Dorn; Rückenſchildchen groſs und dreyeckig; die Ränder des Hinterleibs gezähnelt.

4) Bruſtſchild dreyeckig, nach dem Kopfe zu ſpitz zu laufend; Rückenſchildchen klein; bey den Weibchen mehrentheils die Hinterfüſse dicke, und an der Innenſeite dornicht. Bey andern die Füſse häutig, wie Schwimmfüſse.

5) Bruſtſchild und Körper ſehr flach; die Flügel kürzer als der Körper. Einige, als die Bettwanzen, ganz flügellos.

6) Bruſtſchild uneben, bucklicht und zweytheilicht. Der Kopf ſehr hervorſtehend, und mit dem Bruſtſchilde durch einen Einſchnitt vereiniget. Der Saugrüſsel kurz, und wie ein Halbzirkel gekrümmet; der Körper ſchmächtig; der Hinterleib klein. Die beyden Vorderfüſse dicker als die vier hinterſten.

7) Bruſtſchild glatt; der ganze Körper lang und ſchmächtig; die Füſse ſehr lang. Hieher die länglichten Waſſerwanzen.

Hierauf die *Waſſerſkorpione und Waſſerwanzen.*

1) Karaktere der *erſten.*

Kleine mikroſkopiſche fadenförmige Fühlhörner unter den Augen. Der Saugrüſsel unter dem Bruſtſchilde zurückgebogen; die Flügeldecken mehrentheils hart, hornartig, am Ende häutig:

tig: rückwärts in der Queer gefaltet; bedecken Körper und Flügel; ein Rückenschildchen; die Vorderfüsse zangenförmig, wie die Scheeren der Fangheuschrecken (Mantis). Die Fusblätter zweygliedricht.

2) Karaktere der *zweyten.*

Die Fühlhörner kürzer als der Brustschild; ein unterwärts zurückgebogener Saugrüssel; ein Rückenschildchen; harte, über einander liegende Flügeldecken, die den Körper und die Flügel bedecken; die Hinterfüsse zum Schwimmen; die Fusblätter zweygliedricht.

1) Punaise à écusson violet. t. 1. f. 1. *1ste fam.* eine *neue.*
2) P. de Java. t. 1. f. 2. *2te fam.* eine *neue.*
3) P. épineuse. t. 1. f. 3. *3te fam. neue.*
4) P. à bandes jaunes. t. 1. f. 4. *4te fam. neue.*
5) P. à deux points. t. 1. f. 5. *3te fam. neue.*
6) *Nepa* rustica Fabric. t. 1. f. I. (Beytr. II. p. 177. no. 2.)
7) *Nepa* cinerea L. no. 5. t. 1. f. II.
8) Pun. lisse à avirons. t. 1. f. III. *neue.*
9) Cimex *cristatus* Linn. n. 62. t. 1. f. 6. *6te fam.*
10) Cimex *nobilis* L. no. 3. t. 2. f. 7. *1te fam.*
11) P. rayée de Suriname. t. 2. f. 8. *1te fam. neue.*
12) Cim. *lineatus* L. no. 6. t. 2. f. 9. *1te fam.*
13) Cim. *incarnatus* Drury II. p. 67. t. 36. f. 5. t. 2. f. 10. *2te fam.*
14) Cim. *ornatus* L. no. 56. t. 2. f. 11. *2te fam.*
15) Cimex *punctatus* Degeer III. p. 335. no. 5. t. 34. f. 6.) t. 1. f. 12. *3te fam.*
16) P. à bandes orange. t. 2. f. 13. *4te fam. neue.*
17) P. à pattes membraneuses. t. 2. f. 14. *4te fam. neue.*
18) Cim. *Stockerus* L. no. 2. t. 3. f. 15. *1te fam.*

19) P. bleue de Stocker. t. 3 f. 16. *1te fam. neue.*
20) P. verte de Stocker. t. 3. f. 17. *1te fam. neue.*
21) P. brune à point blanc. t. 3. f. 18. *2te fam. neue.*
22) Cim. *Lineola* L. no. 52. t. 3. f. 19. *4te fam.*
23) P. de Pharaon. t 3. f. 20. *4te fam. neue.*
24) P. à écuſſon en fleurs. t. 4. f. 21 *1te fam. neue.*
25) P. à écuſſon bleu d'azur. t. 4. f. 22. *1te fam. neue.*
26) P. à écuſſon doré. t. 4. f. 23. *1te fam. neue.*

II. Heft.

I. *Zikaden.*

12) *Ranatra:* Cigale griſe. t. 3. f. 12. *neue.*
13) Mannifera Tettigon: Chanteuſe des Champs. t. 3. f. 13. (Seba IV. t. 85. f. 7. 8.) *neue.*
14) Cic. Mannif. *Septemdecim* L. no. 20. t. 3. f. 14.
15) C. Mannif. *Capenſis* L. no. 13. t. 3. f. 15.
16) Mannif. Cig. écailleuſe de Java. t. 4. f. 16. *neue.*
17) Mannif. Cig. bigarrée. t. 4. f. 17. *neue.*
18) Fulgora: Cig. verte. t. 4. f. 18. *neue.*

II. *Wanzen.*

27) Pun. verte de Stocker. t. 4. f. 24. *1te fam. neue.*
28) P. à bords en Damier. t. 4. f. 25. *2te fam. neue.*
29) P. à Y renverſé. t. 4. f. 26. *2te fam. neue.*
30) P. d'une couleur. t. 4. f. 27. *2te fam. neue.*
31) P. Sexagone t. 4. f. 28. *4te fam. neue.*
32) P. violette. t. 5. f. 29. *2te fam. neue.*
33) P. à arc jaune. t. 5. f. 30. *2te fam. neue.*
34) P. Arlequin. t. 5. f. 31. *2te fam. neue.*
35) P. de Potagers à *taches rouges.* t. 5. f. 32. *2te fam. neue.*
36) Cimex *oleraceus* L. no. 53. t. 5. f. 33. *2te fam. neue.*
37) P. à épaules cornues. t. 5. f. 34. *3te fam. neue.*

38) P.

38) P. à bordure rouge. t. 5. f. 35. *4te fam. neue.*
39) P. à abdomen quarré. t. 5. f. 36. *4te fam. neue.*
40) P. brune. t. 5. f. 37. *4te fam. neue.*
41) Cimex *perſonatus* L. no. 64. t. 5. f. 38. *6te fam.*
42) Cimex *aurantius Sulzeri* (Geſch. t. 10. f. 10.) t. 6. f. 39. *2te fam.*
43) Cimex *nigripes Sulzeri* (t. 10. f. 9.) t. 6. f. 40. *2te fam.*
44) Cimex *Janus* Fabric. (Beytr. II. p. 247. no. 20.) t. 6. f. 41. *2te fam.*
45) P. Couleur d'Ocre. t. 6. f. 42. *2te fam. neue.*
46) P. à Dos agathe. t. 6. f. 43. *2te fam. neue.*
47) Cimex *haemorrhoïdalis* L. no. 35. t. 6 f. 44. *3te fam.*
48) P. des Bois. t. 6. f. 45. *3te fam. neue.*
49) Cimex *Baccarum* L. no. 45. t. 6. f. 46. *3te fam.*
50) P. à tête pointue. t. 6. f. 47. *3te fam. neue.*
51) P. à écuſſon rouge. t. 7. f. 48. *1te fam. neue.*
52) P. à écuſſon à bandes. t. 7. f. 49. *1te fam. neue.*
53) P. à écuſſon avec des yeux. t. 7. f. 50. *1te fam. neue.*
54) P. à groſſes pattes. t. 8. f. 51. *4te fam. neue.*
55) Nepa *grandis* L. no. 1. t. 7. f. IV.
56) Le Scorpion aquatique noir de Tranquebar. t. 7. f. V. *neuer.*
57) Nepa *Plano Sulzeri* (t. 10. f. 2.) t. 7. f. VI.

III. Heft.

I. *Zikaden.*

19) *Deflexa*: Cig. à ailes de Gaze. t. 4. f. 19. *neue.*
20) *Ranatra:* Cig. à quatre points. t. 4. f. 20. *neue.*
21) *Ranatra:* Cig. à Harnois jaune. t. 4. f. 21. *neue.*
22) Cicada *Cruciata aurita* L. no. 7. t. 4. f. 22.
23) *Fulgora* Diadema L. no. 2. t. 5. f. 22.
24) *Fulgora:* Cig. à tête obtuſe. t. 5. f. 23. *neue.*

25) Cicada *foliata* L. no. 2. t. 5. f. 24.
26) *Ranatra:* Cig. au Colier rouge. t. 5. f. 25. *neue.*
27) Cicada *Ranatra* Sanguinolenta L. no. 22. t. 5. f. 27.
28) *Fulgora:* Cig. Porte-Lanterne ponctuée. t. 6. f. 28. *neue.*
29) Fulgora *Flammea* L. no. 7. t. 6. f. 29.
30) *Deflexa:* Cig. parée. t. 6. f. 30. *neue.*
43) Cicada *Foliacea* fronditia L. no. 3. t. 6. f. 31.
44) *Cruciata:* Cig. Porte-Joug. t. 6. f. 32. *neue.*

II. *Wanzen.*

58) P. Hottentot (Femelle) t. 8. f. 52. *4te fam. neue.*
59) — — (Mâle) t. 8. f. 53
60) P. à pattes feuilletées. t. 8. f. 54. *4te fam. neue.*
61) P. à Luisant d'or. t. 8. f. 55. *4te fam. neue.*
62) P. de Goyaves. t. 8. f. 56. *4te fam. neue.*
63) P. de la Jusquiame de Suriname. t. 8. f. 57. *4te fam. neue.*
64) P. à Reflet vert. t. 9. f. 57. *1te fam. neue.* An Fabricii *Irroratus* no. 15?
65) P. Jaune à Ecusson. t. 9. f. 58. *4te fam. neue.*
66) P. Porte-Lis. t. 9. f. 59. *1te fam. neue.*
67) P. à Ecusson couleur de Canele. t. 9. f. 60. *1te fam. neue.*
68) P. Samojede. t. 9. f. 61. *1te fam. neue.*
69) P. Griffon, de Suriname. t. 9. f. 62. *6te fam. neue.*
70) Cimex *Lacustris* L. no. 117. t. 9. f. 63. *7te fam.*
71) Grande P. à deux taches. t. 9. f. 64. *6te fam. neue.*
72) Cimex *Andreae* L.? no. 80. t. 9. f. 65. *6te fam.*
73) P. épineuse à ventre rouge. t. 9. f. 66. *6te fam. neue.*
74) P. à antennes en massue. t. 10. f. 67. *4te fam. neue.*

75) P.

75) P. à pieds crochus. t. 10. f. 68. *4te fam. neue.*
76) P. à Dos rouge. t. 10. f. 69. *4te fam. neue.*
77) P. modeſte. t. 10. f. 70. *4te fam. neue.*
78) P. à raye blanche. t. 10. f. 71. *4te fam. neue.*
79) P. à bout d' Abdomen. t. 10. f. 72. *4te fam. neue.*
80) P. coureuſe aux Echaſſes. t. 10. f. 73. *4te fam. neue.*
81) P. bigarrée. t. 11. f. 74. *4te fam. neue.*
82) P. à quatre points. t. 11. f. 75. *4te fam. neue.*
83) P. à corcelet vert. t. 11. f. 76. *4te fam. neue.*
84) P. à collier blanc. t. 11. f. 77. *4te fam. neue.*
85) P. à antennes bigarrées. t. 11. f. 78. *4te fam. neue.* f. 79. *Mâle.*
86) La belle P. à bout d' ailes blanc. t. 11. f. 80. *4te fam. neue.*
87) Cim. *Hyoſcyami* L. no. 76. t. 11. f. 80. *. *4te fam.*
88) P. à taches de Sang. t. 11. f. 81. *4te fam. neue.*
88) P. jaune en Demi-Lune. t. 11. f. 82. *4te fam. neue.*
90) Cimex 2-*puſtulatus* L. no. 29. t. 11. f. 83. *4te fam.*
91) Nepa *linearis* L. no. 7. t. 12. f. VII.

Wir erinnern hierbey noch, daſs die Bogen und Kupfertafeln der Zigalen und Wanzen in den Heften ſo unbequem unter einander durch gebunden ſind, daſs man ſich kaum heraus finden kann. Warum nicht lieber ein Heft von Zigalen, und eines von Wanzen?

Von den Papillons d' Europe etc. beſitze ich den 4ten und 5ten Heft, bey welchem ſich der umgedruckte Bogen Ii des 3ten Heftes befindet, weil in dem erſten aus Verſehen falſche Verwechſelungen geſchehen waren. Alſo

auf

auf dieſem, und im 4ten Heft *folgende Schmetterlinge:*

1) Pap. Pleb. Rur. *Betulae L.* no. 220. t. 35. no. 70.
2) — — — *Quercus* L. no. 222. t. 35. no. 71.
3) — — — *Pruni* L. no. 221. Varietates *Eſperi* I. t. 39. Suppl. 15. f. 1. a. f. 1. b.) t. 35. no. 72.
4) Pap. Pleb. Rur. *Pruni* L. no. 221. t. 35. no. 73.
5) — — — *Quercus* L. no. 222. Varietas *Eſperi* t. 39. Suppl. 15. f. 3.) t. 35. no. 74.
6) Pap. Pleb. Rur. Porte-queue brun à taches fauves. t. 35. no. 75. *Ein neuer.*

Im IVten Heft.

7) Pap. Pleb. Rur. *Boeticus* L. no. 226. t. 37. no. 76. Le *Porte-queue bleu ſtrié.*
8) Pap. Pleb. Rur. *Echion* L. no. 224. t. 37. no. 77. Le *Porte-queue à double queue.*
9) Pap. Pleb. Rur. *Tireſias Eſperi* t. 34. Suppl. 10. f. 1. foem. f. 2. Mas.) t. 37. no. 78.
10) Pap. Pleb. Rur. *Tireſias Eſperi* Varietas t. 49. f. 2.) t. 37. no. 79. *Les petits porte-queue.*
11) Pap. Pleb. Rur. *Argus* L. no. 232. t. 38. no. 80. *Argus bleu.*
12) Pap. Pleb. Rur. *Meleager Eſperi* t. 45. f. 2.) t. 38. no. 81. *Argus bleu découpé.*
13) Pap. Pl. Rur. *Bellargus Eſperi* t. 32. f. 3.) t. 39. f. 82. *Argus bleu céleſte.* a b c d e f. Varietates Maris et foeminae.
14) Pap. Pl. Rur. *Coridon Eſperi* t. 33. f. 4.) t. 39. no. 83. *Argus bleu Nacré.*
15) Pap. Pl. Rur. *Hylas Eſperi* t. 45. f. 3.) t. 40. no. 84. *Argus bleu pâle.*

16) Pap.

16) Pap. Pl. Rur. *Telephii Eſperi* t. 41. f. 2.) t. 40. no. 85. *Argus bleu-violet.*

17) Pap. Pl. Rur. *Arion* L. no. 230. t. 40. no. 86. t. 41. no. 86. *Argus bleu à bandes brunes.*

18) Pap. Pl. Rur. *Biton Eſperi* t. 33. f. 5.) t. 41. f. 87. *Argus bleu à bandes brunes, lignes blanches.*

19) Pap. Pl. Rur. *Argiolus* L. no. 234. t. 42. no. 88. *Le Demi-argus.*

20) Pap. Pl. Rur. *Phocas Eſperi* t. 35. f. 1. 2.) t. 43. no. 89. *Argus Myope.*

21) Pap. Pl. Rur. *Rubi* L. no. 237. t. 43. no. 90. *Argus verd.*

22) Pap. Pl. Vrb. *Actorion* L. no. 262. t. 43. no. 91. *L' Argus bronzé.*

23) Pap. Pl. Rur. *Virgaureae* L. no. 253. et Foeminae *Hippothoë* no. 254. t. 44. no. 92. *Argus Satiné.*

24) Pap. Pl. Rur. *Roeſelii* III. t. 37. f. 6. 7. *Eſperi Hippothoë.* t. 22. f. 3.) t. 44. no. 93. *Argus Satiné à taches noires.*

25) Pap. Pl. Vrb. *Steropes Eſperi* t. 41. f. 1.) t. 44. no. 94. *le Miroir.*

26) Pap. Pl. Vrb. *Comma* L. no. 256. t. 45. no. 95. La *Bande noire.*

27) Pap. Pl. Vrbic. *Paniſcas Eſperi* t. 28. f. 2.) t. 45. no. 96. *L' Echiquier.*

28) Pap. Pl. Vrbic. *Malvae* L. no. 267. t. 46. no. 97. *Le Plein-Chant.*

29) Pap. Pl. Vrbic. *Tages* L. no. 268. t. 46. no. 98. *Le Papillon Griſette.*

30) Pap. *Helicon. Apollo* L. no. 50. t. 47. no. 99. *L' Apollon.*

31) Pap. Helicon. *Mnemoſyne* L. 51. t. 48. no. 100. *Le Semi-Apollon.*

32) Pap. Dan. Cand. *Crataegi* L. no. 72. t. 48. no. 101. *Le Gazé.*

Im

Im Vten Heft.

33) Pap. *Brassicae* Linn. no. 75. t. 49. no. 202. *Le grand Papillon du Chou.*

34) Pap. *Rapae* Linn. no. 76. t. 49. no. 203. *Le petit Pap. du Chou.*

35) Pap. *Napi* Linn. no. 77. t. 50. no. 204. *Le Papillon Blanc veiné de verd.*

36) Pap. *Sinapi* Linn. no. 79. t. 50. no. 205. *Le Papillon blanc de Lait.*

37) Pap. *Daplidice* Linn. no. 81. t. 50. no. 206. *Le Pap. blanc marbré de Verd.*

38) Pap. *Cardamines* Linn. no. 85. t. 51. no. 207. *L' Aurore.*

39) Pap. *Eupheno* Linn. no. 88. t. 52. no. 208. *L' Aurore de Provence.*

40) *La Diane.* t. 52. no. 209. (Der Wiener *Polixena.* v. *Esper* I. t. 15. f. 1. *Rumina.*)

41) Pap. *Rhamni* Linn. no. 206. Var. no. 205. *Cleopatra.* t. 53. no. 210. *Le Citron.*

42) Pap. *Hyale* Linn. no. 200. t. 54 no. 211. *Le Souci.*

43) Pap. *Palaeno* Linn. no. 99. t. 54. no. 212. *Le Soufre.*

44) Pap. *Morio (Antiopa* L.) Varietas t. 55. Suppl. I. no. 1. et 3.

45) *La Tortue moyenne.* t. 55. no. 3. bis. (Der Wiener *Xanthomelas* p. 175.)

46) Varietas Pap. *Gamma maris.* t. 55. Suite de no. 5. t. 5.

47) *Le V blanc.* t. 56. Suppl. II. no. 5. bis. (Der Wiener *Vau album* p. 176.)

48) *La Carte géographique rouge.* t. 56. no. 8. bis. (*Schaeff.* Ic. t. 132. f. 1. 2.)

49) Varietas *Foeminae.* t. 10. f. 11. c. t. 57. Suppl. 3.

50) Varieté du *petit Sylvain.* no. 13. t. 11. t. 57. Suite du no. 13. t. 11.

51) Va-

51) Varieté *mâle du Tabac d' Eſpagne.* no. 15. t. 12. t. 57. Suite du no. 15. t. 12.
52) *Le Cardinal.* t. 58. Suppl. IV. no. 15. bis. (Der Wiener *Pandora.*)
53) Varietates Papp. *Adippe* Linn. no. 212. et *Aglaja.* no. 211. t. 58. Suite du no. 16. t. 13.
54) Variet. du Pap. *le Chiffre.* t. 15. no. 19. t. 59. Suppl. V. (*Eſper* I. t. 18. f. 1.)
55) Pap. *L' Ino*, t. 59. no. 20. bis. *neuer.*
56) Pap. *L' Agave.* t. 59. no. 20. bis. *neuer.*
57) Var. Pap. *Dia* L. no. 207. *Maris.* t. 60. Suppl. VI. Suite du no. 21. t. 15.
58) *La Palés*, grande et petite eſpece, t. 60. no. 21. bis. et 21. tert. (*Eſper* Contin. t. 6. f. 4. 5. *Arſilache.*)

Unter dieſen allen drey bis vier neue; die übrigen alle theils ſehr bekannte, theils häufig abgebildete, oder blos Abänderungen. Wie vielmal muſs man alſo eine Sache bezahlen? Hätten die Verfaſſer nicht beſſer gethan, daſs ſie nur auf dieſe Abbildungen verwieſen hätten? Deſſen ohnerachtet konnten ſie das, was ſie für neu, und merkwürdig hielten, beybringen.

Von *Eſpers* Fortſetzung der europäiſchen Schmetterlinge, oder deſſen 3ten Theile, haben wir *den erſten und zweyten Heft.*

1) Pap. Equ. Ach. *Ajax* L. no. 32. t. 51. f. 1.
2) Pap. Pl. Vrbic. *Malvae.* t. 23. Varietas. t. 51. f. 2.
3) Pap. Pl. Vrbic. *Alceae.* t. 51. f. 3. ein *neuer.*
4) Pap. Pl. Rur. *Tiphys.* t. 51. f. 4. *neuer.*

5) Pap.

5) Pap. Nymph. Phaler. *Vau album.* t. 52. f. 1. ein *neuer.*
6) Pap. Pl. Rur. *Eumedon.* t. 52. f. 2. foem. 3. Mas. *neuer.*
7) Pap. N. Gemm. *Fidia.* t. 49. Varietas. t. 52. f. 4.
8) Pap. Pl. Rur. *Amphion.* t. 53. f. 1. *neuer.*
9) Pap. N. Phal. *Rumina* L. ad t. 15. Tom. I. t. 53. f. 2. aa. Larva. b. Chryſallis. c. Imago.
10) Pap. N. Gemm. *Pronoë.* t. 54. f. 1. *neuer.*
11) Pap. N. Gemm. *Alexis.* t. 44. Varietas. t. 54. f. 2.
12) Pap. N. Gemm. *Philoxenus.* t. 54. f. 3. *neuer.*
13) Pap. Pl. Rur. *Cleobis.* t. 40. Varietas. t. 54. f. 4. a b.
14) Pap. Pl. Rur. *Hylas.* t. 45. Foemina. t. 55. f. 1.
15) Pap. Pl. Rur. *Bellargi* foeminae Varietates. t. 55. f. 2. 3. 4. f. 6. Mas. ad t. 32. Tom. I.
16) Pap. Pl. Rur. *Icari.* t. 32. Variet. t. 55. f. 5.
17) Pap. Pl. Rur. *Medon.* t. 32. Variet. t. 55. f. 7.
18) Pap. Dan. Cand. *Phicomone.* t. 56. f. 1. Mas. f. 2. Foem. *neuer.*
19) Pap. Pl. Vrbic. *Telegonus.* t. 56. f. 3. *neuer.*
20) Pap. N. Phal. *Arſilache.* t. 56. f. 4. *neuer.* f. 5. Varietas.
21) Pap. N. Gemm. *Actaea.* t. 57. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem. *neuer.*
22) Pap. Dan. Feſt. *Hyperanthi.* t. 5. f. 1. Tom. I. Varietates. t. 57. f. 2. 3. 4.
23) Pap. N. Phaler. *Pandora.* t. 58. f. 1. Mas. f. 2. Foemina. *neuer.*
24) Pap. N. Phaler. *Niphe* L. no. 208. t. 58. f. 3.
25) Pap. Pl. Rur. *Amphidamas.* t. 58. f. 4. *neuer.*
26) Pap. Helic. *Mnemoſyne* L. no. 51. t. 2. f. 2. Foemina, t. 58. f. 5.
27) Pap. N. Phal. *Camilla.* t. 59. f. 1.
28) Pap. Pl. Rur. *Arion.* t. 20. Varietas. t. 59. f. 2.

29) Pap.

29) Pap. N. Phal. *Calbum.* t. 13. Variet. t. 59. f. 3.
30) Pap. N. Phal. *Prorſa.* t. 15. Variet. t. 59. f. 4.
31) Pap. N. Phal. *Levana.* t. 15. Variet. t. 59. f. 5.
32) Pap. N. Phal. *Trivia.* t. 37. Tom. I. foem. t. 60. f. 1.
33) Pap. N. Phal. *Aglaja.* foem. t. 60. f. 2.
34) Pap. N. Phal. *Adippe* Varietas. t. 60. f. 3.
35) Pap. N. Phal. *Paphia.* t. 17. Variet. t. 60. f. 4.
36) Pap. Pl. Rur. *Phlaeas.* t. 22. Variet. t. 60. f. 5.
37) Pap. N. Phal. *Didymae.* t. 41. Variet. t. 61. f. 1.
38) Pap. N. Phal. *Diae.* t. 16. Variet. t. 61. f. 2.
39) Pap. N. Phal. *Maturna.* t. 16. foem. t. 61. f. 3.
40) Pap. N. Phal. *Corythallia.* t. 61. f. 4. foem. f. 5. Mas. *neuer.*
41) Pap. N. Phal. *Athaliae.* t. 47. Variet. t. 61. f. 6.
42) Pap. Pl. Rur. *Meleager.* t. 45. f. 2. foem. t. 62. f. 1. Mas.
43) Pap. Pl. Rur. *Hipponoë.* t. 25. f. 5. foem. t. 62. f. 2. Mas.
44) Pap. N. Phal. *L album.* t. 62. f. 3. a. maris Varietas. b. foem.
45) Pap. Pl. Rur. *Biton.* t. 33. f. 5. Mas. t. 62. f. 4. Foem.
46) Pap. Pl. Rur. *Phlaeas.* t. 21. f. 1. Mas. t. 62. f. 5.

Aus *Eſpers* 2tem Bande ſind noch einige *Schwärmerarten* nachzuholen.

1) *Sphinx* Indiae Orient. Vulgo Var. Sph. *Celerio* L. no. 12. t. 22. f. 1.
2) Sph. *Populi* Var. t. 22. f. 2.
3) Sph. *Tiliae* Var. t. 22. f. 3.
4) Sph. *Veſpertilio* t. 22. f. 4. (*Füeſsl.* Archiv der Entomol. t. 11. A.)
5) Sph. *Feneſtrina.* t. 23. f. 1. et f. 1. *. (S. Beytr. III B. 2 Th. p. 209. no. 23.)

6) Sph. *Bombyliformis.* t. 23. f. 2.
7) Sph. *Oeſtriformis.* t. 23. f. 3.
8) Sph. Adſc. *Lonicerae.* t. 24. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem.
9) Sph. A. *Piloſellae.* t. 24. f. 2. a. Mas. f. 1. b. Foem.
10) Sph. A. *Scabioſae.* t. 24. f. 3. a. Mas. f. 3. b. Foem.
11) Sph. A. *Achilleae.* t. 25. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem. *neuer.*
12) Sph. A. *Peucedani.* t. 25. f. 2. *neuer.*
13) Sph. *Lonicerae.* Var. t. 25. f. 3.

Aus *Cramers* Pap. exot. Tom. III. und Tom. IV. Heft 25 bis 28 haben wir beyzubringen.

I) Zu den *trojaniſchen Rittern.*

A) *Linnéiſche.*

1) *Aeneas Cram.* III. t. 279. AB. *Mas;* CD. *Foem.*
2) *Polytes* — — t. 265. AB. *Foem.* C. *Mas.*
3) *Anchiſes* — IV. t. 318. AB *Mas.* CD. *Foem.*

B) *Neue.*

1) *Amoſis Cram.* III. t. 269. AB.
2) *Panthonus* — t. 278. CD.
3) *Severus* — t. 277. AB. *Mas.* t. 278. AB. *Foem.*
4) *Tullus* — t. 277. CD.

II) Zu *den Griechen oder Achivern.*

A) *Linnéiſche.*

1) *Jaſon* no. 26. *Cram.* IV. t. 329. AB.

B) *Neue.*

1) *Aeilus* — — IV. t. 317. AB.
2) *Ariſteus* — — — t. 318. EF.
3) *Sinon* — — — t. 317. CD. *Mas.* (S. im. *Beytr.*

m. *Beytr.* III B. 1 Th. p. 72. no. 7.) EF. *Foem.*

4) *Pherecides* no. 26. *Cram.* IV. t. 330. AB.

III) Zu den *Helikoniern.*

A) *Linnéiſche.*

1) *Piera* L. *Cram.* IV. t. 291. CD. *Foem.* E. *Mas.* Pap. *Vitré.*

2) *Terpſicore* — t. 298. AB. *Foem.* C. *Mas.*

3) *Cephea* — t. 298. DE.

4) *Horta* — t. 298. FG.

B) *Neue.*

1) *Eumella* — III. t. 280. D.

2) *Euritea* — t. 280. C.

3) *Liberia* — t. 268. GH.

4) *Andremona* — IV. t. 297. A.

5) *Vdalrica* — t. 297. B.

6) *Numata* — t. 297. CD.

7) *Ludovica* — t. 297. E.

8) *Equicola* — t. 297. F.

9) *Pireta* — t. 315. A. cf. *Piera* L.

10) *Diaphana* — t. 315. DE. *Foem.* t. 231. C. *Mas.*

11) *Selene* — t. 315. F. *Foem.* G. *Mas.*

12) *Paſinuntia* — t. 316. A. *Mas.* BC. *Foem.*

13) *Pamela* — t. 319. A.

IV) Zu den *Danaïden.*

A) Zu den *Weißen.*

I) *Linnéiſche.*

II) *Neue.*

1) *Delia* *Cram.* III. t. 273. A.

2) *Meſentina* — t. 270. AB.

3) *Aurora Cram.* IV. t. 299. AB. *Mas.* CD *Foem.*
4) *Zelmira* — t. 320. CD. *Foem.* EF. *Mas.*

B) Zu den *Bunten.*
I) *Linnéiſche.*
1) *Midamus Cram.* III. t. 266. AB.
2) *Caſſus* — IV. t. 314. CD.
II) *Neue.*
1) *Baſiliſſa* — III. t. 266. C. (S. *Kleem.* Beytr. I. t. 9. f. 1. 2.)
2) *Dyndima* — t. 271. GH.
3) *Eleuſina* — t. 266. D.
4) *Epitus* — t. 270. C.
5) *Odilia* — IV. t. 329. CD.
6) *Baſilia* — — EF.

V) Zu den *Nymphen.*
A) *Aeugigte.*
I) *Linnéiſche.*
1) *Orithya Cram.* IV. t. 290. AB. *Mas.* CD. *Foem.*
2) *Lena* — t. 291. AB. *Mas.* t. 198. DE. *Foem.*
3) *Leda* — t. 292. A. *Mas.* Vol. III. t. 126. CD. *Foem.*
II) *Neue.*
1) *Anna* — III. t. 281. AB.
2) *Egiſta* — — CD.
3) *Judiana* — t. 280. AB.
4) *Orithya* — t. 281. EF.
5) *Sabina* — IV. t. 289. AB. *Foem.* CD. *Mas.*
6) *Mermeria* — t. 289. EF.
7) *Genoveva* — t. 290. EF.
8) *My-*

8) *Mycena Cram.* IV. t. 290. F.
9) *Phedima* — t. 292. B.
10) *Arcenſia* — t. 292. C.
11) *Junia* — — DE.
12) *Ebuſa* — — FG.
13) *Chloris* — t. 293. AB.
14) *Myncea* — t. 293. C.
15) *Clariſſa* — t. 293. DE.
16) *Camerta* — — F.
17) *Liſandra* — — GH.
18) *Arceſilaus* — — AB. *Foem.* CD. *Mas.* (v. *Fabric.* S. E. p. 484. no. 182. Pap. N. Phal. *Chorinaeus.*)
19) *Sophonisba* — t. 295. AB.
20) *Quiteria* — t. 313. AB. *Foem.* CD. *Mas.*
21) *Arete* — t. 313. EF.
22) *Otrea* — t. 314. AB.
23) *Meone* — t. 314. EF. cf. *Linn. Megaera* no. 142.
24) *Agnes* — t. 324. AB.
25) *Renata* — t. 326. A.
26) *Roſina* — — B.
27) *Juſtina* — — C.
28) *Mamerta* — — D.
29) *Franciſca* — — EF.

B) Zu den *ohnäugigten geſchmückten.*

I) *Linnéiſche.*
1) *Panope Cram.* IV. t. 294. EF.
2) *Nauplia* — t. 316. DE. *Foem.* FG. *Mas.*
3) *Polychloros* — t. 330. CD.

II) *Neue.*
1) *Iſmare* — III. t. 279. EF.

2) *Columella Cram.* III. t. 296. AB.
3) *Cornobita* — t. 296. CD. (*Pallas* Reise Ausz. Anh. no. 62. Pap. Helic. *Sappho.*)
4) *Leucothoë* — t. 296. EF.
5) *Zingha* — IV. t. 315. BC.
6) *Antonoë**) — t. 320. AB. *Mus.* t. 279. CD. *Foem.*
7) *Veronica* — t. 325. CD.
8) *Agatha* — t. 327. AB.
9) *Valentina* — — CD.
10) *Blandina* — — EF.
11) *Sulpitia* — t. 328. AB.
12) *Irenea* — — CD.
13) *Lucina* — t. 330. EF.

VI) Zu dem *Pöbel.*

A) *Bauern.*
I) *Linnéische.*
1) *Marsyas Cram.* IV. t. 332. AB.
II) *Neue.*
1) *Fatima* — III. t. 271. ABCD.
2) *Flegyas* — t. 280. EF.
3) *Iolaus* — t. 270. FG.
4) *Ladon* — t. 270. DE.
5) *Larydas* — t. 282. H.
6) *Mandana* — t. 271. EF.
7) *Mi-*

*) Nicht *Eucharis*, auch nicht *Hyparete* Linn. wie ich in meinen Beyträgen angegeben habe.

Ich danke hier dem würdigen Herausgeber aufrichtigst für die Verbesserung aller Fehler, denen ich in den entomol. Beytr. besonders in Absicht der ausländischen Schmetterlinge nicht wohl entgehen konnte, und wobey ich mich immer auf die Aussprüche anderer verlassen mußte. Männer, die mit solchem Glimpf anderer Fehler verbessern, sehe ich als Lehrer und Wohlthäter an.

7) *Micylus Cram.* III. t. 282. FG.
8) *Oreſtes* — t. 282. AB.
9) *Palegon* — t. 284. F.
10) *Silenus* — — E.
11) *Venulius* — t. 286. G.
12) *Nedymona* — IV. t. 299. EF.
13) *Eumolphus* — t. 299. GH.
14) *Camillus* — t. 300. AB.
15) *Ebuſus* — — CD.
16) *Beon* — t. 319. BC.
17) *Lajus* — — DE.
18) *Triopus* — t. 320. GH.
19) *Atymnus* — t. 331. DE.
20) *Evander* — t. 331. FG.
21) *Caranus* — t. 332. CD.
22) *Orus* — — EF.
23) *Bubaſtus* — — GH.
24) *Arogeus* — t. 333. AB.
25) *Phalantus* — — CD.
26) *Megacles* — — EF.
27) *Crolus* — — GH.
28) *Thaſus* — — I.
29) *Syncellus* — t. 334. AB.
30) *Menander* — — CD.
31) *Therſander* — t. 335. AB.
32) *Ouranus* — — C.
33) *Epaphus* — — DE.
34) *Lamis* — — FG.
35) *Melander* — t. 336. A. *Foem.* B. *Mas.*
36) *Gelanor* — — CD.
37) *Crotopus* — — EF.
38) *Labdacus* — — GH.

B) *Städter.*

I) *Linnéiſche.*

1) *Peleus Cram.* III. t. 284. F.

II) *Neue.*

1) *Aſtylos Cram.* III. t. 283. AB.
2) *Auleſtis* — — EFG.
3) *Chromus* — t. 284. E.
4) *Eroteas* — t. 288. CD.
5) *Creteus* — t. 284. CD.
6) *Ladon* — t. 280. G.
7) *Melander* — t. 270. H.
8) *Fantaſos* — IV. t. 300. EF.
9) *Criniſus* — — GH.
10) *Adraſtus* — t. 319. FG.
11) *Flyas* — t. 328. E.
12) *Otreus* — — F.
13) *Aſychis* — t. 333. EF.
14) *Tryxus* — — GH.
15) *Orcus* — — IK.

VII) Zu den *Schwärmern.*

A) *Rechtmäßige.*

I) *Linnéiſche.*

1) *Vitis Cram.* III. t. 267. C. *Mas.* t. 268. E. *Foem.*

II) *Neue.*

1) *Achemenides* — III. t. 267. AB.
2) *Eacus* — t. 285. E.
3) *Faro* — — C.
4) *Hippotes* — t. 286. A.
5) *Hypothous* — t. 285. D.
6) *Menephron* — t. 285. A.
7) *Opheltes* — t. 285. B.
8) *Pyracmon* — t. 287. B.
9) *Ruſtica* — IV. t. 301. A. (Beytr. III B. 2 Th. p. 206. no. 10.)
10) *Lucetius* — IV. t. 301. B.
11) *Oenotrus* — — C.
12) *Scyron*

12) *Scyron Cram.* IV. t. 301. E.
13) *Neoptolemus* — — F.
14) *Alope* — — G.
15) *Pandion* — t. 321. A.

B) *Angenommene.*

I) *Linnéiſche.*

II) *Neue.*

1) *Heber Cram.* III. t. 287. A.
2) *Melanthus* — t. 286. B.
3) *Coras* — IV. t. 312. A.
4) *Meones* — t. 325. E.
5) *Nyctéus* — — F.

VIII) Zu den *Attakerphalänen.*

A) *Linnéiſche.*

1) *Capenſis Cram.* IV. t. 325. G. *Foem.* t. 302. A. *Mas.*

B) *Neue.*

1) *Aglaura Cram.* III. t. 263. F.
2) *Cyane* — t. 267. D.
3) *Lactucina* — t. 273. BC.
4) *Mirabilis* — t. 271. B.
5) *Modeſtia* — t. 272. CD.
6) *Zerbina* — t. 287. E.
7) *Capenſis* — IV. t. 302. AB.
(Von *Paphia* L. no. 4. verſchieden.)
8) *Honeſta* — IV. t. 302. C.
9) *Nauſica* — t. 303. BC. *Mas.*
10) *Io* — — DE. *Foem.* FG. *Mas.*
11) *Calchas* — t. 303. A.
12) *Metea* — t. 304. A.
13) *Domina* — — B.
14) *Obſoleta* — — C.
15) *Canitia* — — D.

16) *Peregrina Cram.* IV. t. 305. A.
17) *Ruſtica* — — B.
18) *Avia* — t. 307. A.
19) *Alcinoë* — t. 322. AB.

IX) Zu den *Spinnern.*

I) *Linnéiſche.*

II) *Neue.*

1) *Nivea* IV. t. 321. B.
2) *Brotea* — t. 322. E.
3) *Bitia* — — F.

X) Zu den *Eulen.*

I) *Linnéiſche.*

II) *Neue.*

1) *Servia Cram.* IV. t. 321. CDE.
2) *Sergilia* — — F.
3) *Hypermneſtra* — t. 323. AB.
4) *Melicerte* Var. — — CDE. cf. t. 62. CD.
5) *Mezentia* — — F.
6) *Euriſtea* — t. 324. A.
7) *Damonia* — — BCDE.
8) *Oculata* — — F.
9) *Ancea* — — G.

XI) Zu den *Spannern.*

I) *Linnéiſche.*

II) *Neue.*

1) *Panthona Cram.* IV. t. 322. C.
2) *Glaucopis* — — D.

In dem 1ſten Probeheft von *Füeſsly* Archiv der Inſektengeſchichte iſt:

1) Beytrag zur Naturgeſch. des *Mittelperlmutterfalters* Pap. *Adippe* L. Tab. I. von *Füeßl.*

2) Der

2) Der *Fledermausschwärmer:* Sph. *Vespertilio* von *Füeßly.* Tab. II. A.
3) *Die schwarze Todtenkopfraupe* (Sph. *Atropos*) Tab. III. von *Hübner* in Halle, mit Zusätzen von *Füeßly.*
4) Der *Köchlinsschwärmer*, Sph. *Koechlini*, von *Füeßly.* Tab. IV. A.
Viel ähnliches mit Sph. *Galii.* Derselbe beym *Esper* II. t. 8. f. 4. Varietas Sph. *Celerio.*
5) Der *Trauerschwärmer*, Sph. *Infausta* L. no. 43. von *Füeßly* Tab. II. B.
6) Die *Perspektivfliege: Diopsis*, Tab. V. f. 1-5.
7) Naturgeschichte des *Silbermönchs:* Phal. *argentea* von *Herbst*, Tab. VI.
S. die Rezension dieses Instituts im I St. des *Leipziger Magazins* zur Naturkunde &c. p. 138.

Ich komme nun zu einem Insektenwerke, das der Herr Hofmeister bey dem Braunschweigischen Karolino, *Knoch*, angefangen, und dessen 1ten Heft unter dem Titel: Beyträge zur Insektengeschichte, 8. Leipzig 1781. geliefert hat. Es sind dabey sechs illuminirte Kupfertafeln; aber so fein, getreu, und vortrefflich, dass ich sie den *Röselschen* und *Seppischen* Zeichnungen an die Seite zu setzen kein Bedenken trage. Einige sehr seltene Insekten, besonders Phalänen, sind nicht nur *sehr genau* beschrieben; sondern der würdige Herr Verfasser hat auch die Oekonomie und Naturgeschichte derselben so weit als möglich verfolget, und daher verschiedene Merkwürdigkeiten, aus eigener Beobachtung und Erfahrung bekannt

bekannt gemacht, die man in manchem groſſen und koſtbaren Inſektenwerke vergeblich ſucht. Ob ich gleich dieſe Beyträge ſchon bey dieſem dritten Bande des dritten Theils genutzt habe; ſo will ich doch den Inhalt kurz herſetzen, weil ſie noch nicht in vielen Händen ſind, und recht vorzüglich verdienen, bekannter zu werden.

1) Phal. Geom. *Seſquiſtriataria*, der *grüne Spannmeſſer mit anderthalb weißen Streifen.* Tab. I. f. 1. *Hufnagels Vernaria.*

2) Ph. Noct. C *aureum*, das goldene C. Tab. I. f. 2. Der *Wiener* N. *Bractea.* p. 314.

3) Ph. Geom. *Melanaria* L. no. 212. Tab. I. f. 3. der *Schwärzling.*

4) Ph. Geom. *Punctaria* L. no. 200. der *Punktſtrich.* Tab. I. f. 4.

5) Ph. Geom. *Innotata*, die *Beyfuſsmotte.* Tab. I. f. 8. *Hufnagels Innotata.*

6) Phal. *Bombyx Eueria*, der *Wollträger.* Tab. II. f. 6. Mas. f. 7. Foem. *neu.*

7) Ph. Geom. *Albicillata* L. no. 255. der *weiſse Schleier.* Tab. II. f. 8. *Raupe.*

8) Ph. Noct. *argentea*, der *ſilberfleckichte Mönch.* Tab. III. f. 2. *Berlin. Mag.* I B. 6 St. p. 648. Tab. Tit. *Archiv* der Entomol. t. 6.

9) Ph. Bomb. *Vidua*, die *junge Wittwe.* Tab. III. f. 3. *neu.*

10) Ph. Geom. *Lichenaria*, die *Moosmotte.* Tab. III. f. 9. Foem. *Hufnagels Lichenaria.*

11) Ph. Geom. *Pectinataria*, das *gekämmte Fühlhorn.* Tab. III. f. 10. *neu.*

12) Ph. Noct. *Diſſimilis*, das *unähnliche Weibchen.* Tab. IV. f. 3. Foem. f. 4. Mas. *neu.*

13) Ph.

13) Ph. Noct. *Domiduca*, die *Sturmhaube.* Tab. IV. f. 5. *Hufnagels Domiduca*, der Wiener N. *Ianthina.*

14) Ph. Bomb. *Velitaris*, die *Segelmotte.* Tab. IV. f. 8. *Hufnagels* Velitaris.

15) Phal. Tin. *Perlella*, die *Perlmotte.* Tab. IV. f. 6. *Scop.* Perlella p. 243. no. 620.

16) Ph. Tin. *Pinetella*, die *Fichtenmotte.* Linn. no. 358. Tab. IV. f. 7.

17) Pap. Pleb. Vrbicola *Silvius*, der *Silvius.* Tab. V. f. 1. 2. *neu.*

18) Pap. Nymph. Phal. *Arsilache*, die *Arsilache.* Tab. V. f. 3. 4. *Espers* Arsilache I. t. 56. f. 5.

19) Pap. Pl. Rur. *Optilete*, das *Gelbauge.* Tab. V. f. 5. 6. *neu.*

20) Curculio *Albinus* L. no. 79. die *Weissstirn.* Tab. VI. f. 1-7.

21) Curculio *Nebulosus* L. no. 84. die *Wolkendecke.* Tab. VI. f. 8-11.

Pallas hat abermal ein neues Insektenwerk angefangen, das sein Name schon empfiehlt, und dem Gründlichkeit und Genauigkeit den Werth geben. Der Titel ist:

Icones Insectorum, praesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarium, quae collegit et descriptionibus illustravit —

Fasc. I. mit 3 illuminirten Kupfertafeln.

Es werden in allem 4 Hefte mit 13 Platten werden, und jede Ausgabe kostet 2 Rthl.

In dem *ersten Hefte:*

1) *Lucanus* apterus t. A. f. 1. a b c. (S. m. Beyträge I. p. 116.)

2) Scar. *Moeris* t. A. f. 2. *neu.*

3) Scar.

3) Scar. *Mopſus.* t. A. f. 3. (differt a *Voet.* t. 26. f. 28. et *Schaeff.* Ic. t. 3. f. 7.)
4) Scar. *Menalcas.* t. A. f. 4. a b. (Beytr. I. p. 70.)
5) Scar. *Bonaſus.* t. A. f. 5. (Beytr. I. p. 69.)
6) Scar. *Gibbulus.* t. A. f. 6. (*Geoffr.* I. p. 90. no. 5.)
7) Scar. *Scriptus.* t. A. f. 7. (Beytr. I. p. 100.)
8) Scar. *Ammon.* t. A. f. 8. AB. (Beytr. I. p. 116.)
9) Scar. *Tenebrioïdes.* t. A f. 9. *neu.*
10) Scar. *Pectinatus.* t. A. f. 10. (*Fabric.* Ent. App. p. 818. *Trox* horridus.)
11) Scar. *Morticinii.* t. A. f. 11.
12) Scar. *Coccinelloïdes.* t. A. f. 12. (Scar. *bimaculatus* Laxm. S. Beytr.)
13) Scar. *bimucronatus.* t. A. f. 13. *neu.*
14) Scar. *oxypterus.* t. A. f. 14. a b. (Beytr. I. p. 114. no. 230. p. 96. no. 125. p. 106. no. 181.)
15) Scar. *Alopecias.* t. A. f. 15. a. b. (Linn. Scar. *Syriacus:* Muſ. reg. p. 24. S. N. ed. 12. no. 56.)
16) Scar. *Arctos.* t. A. f. 16. *neu.*
17) Scar. *Bombyliformis.* t. A. f. 17. *neu.*
18) Scar. *Albellus.* t. A. f. 18. (Beytr. I. p. 114. no. 231. p. 111. no. 214.)
19) Scar. *Succinctus.* t. A. f. 19. *neu.*
20) Scar. *Aureolus.* t. A. f. 20. *neu.*
21) Scar. *Hololeucus.* t. B. f. A. 21. (Beytr. I. p. 114. no. 233.)
22) Scar. *Teſtaceus.* t. B. f. A. 22. *neu.*
23) Scar. *Hemiſphaericus.* t. B. f. A. 23. *neu.*
24) Scar. *Cruentus.* t. B. fig. A. 24. *neu.*
25) Curculio *Varicoſus.* t. B. f. 1. *neu.*
26) Curc. *Rynchoceros.* t. B. fig. 2. *neu.*
27) Curc. *Piceus.* t. B. fig. 3. (Beytr. I. p. 384. n. 67.)
28) Curc. *Anomalocerus.* t. B. fig. 4. (An Linn. Curc. *diſparis:* Muſ. reg. p. 50. Varietas?)
29) Curc. *Inderienſis.* t. B. fig. 5. (Beytr. I. p. 402. no. 35. p. 399. no. 14.)

30) Curc.

30) Curc. *Nomas.* t. B. fig. 6. (Beytr. I. p. 384. no. 66.)
31) Curc. *Candidatus.* t. B. fig. 7. Beytr. I. p. 402. no. 33.)
32) Curc. *Roridus.* t. B. fig. 8. *neu.*
33) Curc. *Cenchrus.* t. B. fig. 9. *neu.*
34) Curc. *Tetragrammus.* t. B. fig. 10. (*Lepech.* Reif. II. App. p. 329. t. 11. fig. 28.)
35) Curc. *Tribuloïdes.* t. B. fig. 11. *neu.*
36) Curc. *Nigrivittis.* t. B. fig. 12. *neu.*
37) Curc. *Vibex.* t. B. fig. 13. *neu.*
38) Curc. *Gibber.* t. B. fig. 14. *neu.*
39) Curc. *Carioſus.* t. H. fig. B. 15. *neu.*
40) Curc. *Feneſtratus.* t. H. fig. B. 16. *neu.*
41) Curc. *Flaviceps.* t. B. fig. 17. (*Lepech.* Reif. II. App. p. 327. t. 2. fig. 27.)
42) Curc. *Pictus.* t. H. fig. B. 18. (*Pall.* Reif. I. App. p. 463. no. 33.)
43) Curc. *Hololeucus.* t. H. fig. B. 19. *neu.*
44) Curc. *Tenebrioïdes.* t. B. fig. 20. (*Friſch* XIII. p. 28. t. 26. *Schaeff.* Ic. t. 62. fig. 11.)
45) Curc. *Albator.* t. B. fig. 21. *neu.*
46) *Mylaris gigantea.* t. C. fig. 1. (*Linn.* Tenebr. *Gigas.* S. N. ed. 12. p. 674. no. 1.)
47) Myl. *Gibboſa.* t. C. fig. 2. *neu.*
48) Myl. *ſpecioſa.* t. C. fig. 3. (Cf. *Schäff.* Ic. t. 51. fig. 3.)
49) Myl. *Violacea.* t. C. fig. 4. *neu.*
50) *Tenebrio auritus.* t. C. fig. 5. a b. *neu.*
51) Ten. *Pterygodes.* t. C. fig. 6. (*Fabr.* Ent. p. 252. no. 9. *Pimelia* reflexa. *Forsk.* Anim. p. 79. no. 9. Tenebr. *vulgaris.* S. Beytr.)
52) Ten. *Setoſus.* t. C. fig. 7. *neu.*
53) Ten. *Nomas.* t. C. fig. 8. (Beytr. I. p. 689. n. 15.)
54) Ten. *Longicornis.* t. C. fig. 9. (An *Pimelia* anguſtata *Fabr.* Ent. p. 253. no. 13?)

35) Ten.

55) Ten. *Hypolithus.* t. C. fig. 10. (*Geoffr.* I. p. 351. no. 8. An Linn. *Latipes* S. N. ed. 12. p. 678. no. 30?)
56) Ten. *Glandiformis.* t. C. fig. 11. a b. (Beytr. I. p. 688. no. 6.)
57) Ten. *Gibbus.* t. C. fig. 12. *neu.*
58) Ten. *Caſpicus.* t. C. fig. 13. *neu.*
59) Ten. *Muricatus.* t. C. fig. 14. (Beytr. I. p. 674. no. 17.)
60) Ten. *Cephalotes.* t. C. fig. 15. (Beytr. I. p. 674. no. 16.)
61) Ten. *Subgloboſus.* t. C. fig. 16. (Beytr. I. p. 677. no. 28. p. 688. no. 10.)
62) Ten. *Toruloſus.* t. C. fig. 17. *neu.*
63) Ten. *Coſtatus.* t. C. fig. 18. *neu.*
64) Ten. *Pubeſcens.* t. C. fig. 19. (An Linn. Ten. angulatus S. N. ed. 12. p. 677. no. 22?)
65) Ten. *Leucographus.* t. C. fig. 20. (Beytr. I. p. 684. no. 4.)
66) Ten. *Spinimanus.* t. C. fig. 23. (An Linn. Ten. gigas no. 14?)
67) Ten. *aſperrimus.* t. H. fig. C. 22. *neu.*
68) Ten. *Laticollis.* t. H. fig. C. 21. *neu.*

Wir danken übrigens dieſem unſerm Lehrer ebenfalls öffentlich für alle Berichtigungen unſerer Beyträge, und freuen uns, daſs wir dadurch ſolchen Kennern Anlaſs gegeben haben, viele Verwirrungen zu heben, die wir aufzulöſen nicht im Stande waren.

⁂ ⁂ ⁂

In des Franc. de Paula *Schrank* Enumeratio Inſectorum, Auſtriae Indigenorum c. figur. 8. Aug. Vindel. 1781. liefert der Verfaſſer 1127 Inſekten-

Inſektenarten nach einer ſyſtematiſchen Beſchreibung, mit beygefügtem Maaſs der Gröſſe, auch Anzeige der Oerter, wo er ſie in Oeſterreich gefunden. Die Schmetterlinge hat er übergangen, weil wir die Beſchreibung derſelben von *Schiffermüller* zu erwarten haben. Sein Werk zeuget von vielem Fleiſs und Genauigkeit eines ſehr erfahrnen Forſchers der Natur. S. Leipziger Magazin zur Naturkunde von Funk, Leske und Hindenburg, I St. p. 130.

Wir fügen dieſem bey

Ioh. Chr. *Fabricii* Species Inſectorum exhibentes eorum differentias ſpecificas, Synonyma Auctorum, loca natalia, metamorphoſin, adiectis obſervationibus, deſcriptionibus, Tom. I. 8. Hamb. et Kilonii.

In dieſem Werke ſind die in den verſchiedenen Schriften des Verfaſſers zerſtreuten neuentdeckten Inſekten zuſammengetragen, und viele Gattungen faſt um die Hälfte mit neuen Arten vermehrt: auch verſchiedene im Syſtem eingeſchlichene Fehler verbeſſert. Das übrige ſ. im Leipz. Magaz. I St. S. 126 ff.

Ferner gehöret hieher

Iohann Nepomuk von *Laicharting* zu Eichberg und Lüzelgnad, tyroliſchen Landmanns, Verzeichniſs und Beſchreibung der *Tyroler Inſekten* I Theil, käferartige Inſekten, I Band, Zürich, bey Füeſsly 1781. 8.

Der Verfaſſer macht *zehn Ordnungen* von Inſekten.

1) *Scaraboïdes*, käferartige.

2) *Grylloïdes*, grillenartige.

3) *Cimicoïdes*, wanzenartige.
4) *Papilionoïdes*, ſchmetterlingartige.
5) *Libelloïdes*, waſſerjungfernartige.
6) *Veſpoïdes*, weſpenartige.
7) *Muſcoïdes*, fliegenartige.
8) *Cancroïdes*, krebsartige.
9) *Aranoïdes*, ſpinnenartige.
10) *Oniſcoïdes*, aſſelartige.

Jeder ſind die Geſchlechtskennzeichen beygefügt, und jeder groſsen Ordnung wird ein Theil gewidmet ſeyn, der nach den Umſtänden wieder mehrere Bände begreifen wird.

In dieſes 1ten Theiles 1tem Bande iſt die erſte Ordnung der Tyroler *käferartigen* Inſekten beſchrieben. Es kommen hier folgende *Geſchlechter* vor:

I. *Lucanus*, *Schrotkäfer*.

Dabey vier *Linnéiſche* Arten: Cervus; Parallelepipedus; Caraboïdes; Cylindricus.

Bey dem *erſten* macht der Verf. eine artige Erfahrung bekannt, welche die *Röſelſche* Meynung, daſs die mit kurzen Kinnladen die *Weibchen* der mit langen Oberkinnladen ſind, begünſtiget. Er hat von jenen 2, und von dieſen 3 in eine Schachtel eingeſperrt, und bey Eröffnung derſelben 2 von der erſten Gattung mit 2 von der letzten *gepaart* gefunden.

Der walzenförmige Schrotkäfer macht den *füglichſten Uebergang* zu den *Dungkäfern*.

II. *Scarabaeus*, *Dung* (Miſt) *käfer*.

Dabey 17 *Linnéiſche* nebſt einigen andern bekannten, und drey *neue*.

Naſicornis, deſſen *Weibchen Forſteri* nov. Sp. Inſ. Cent. 1. p. 1. no. 1. Scar. *Excavatus*.

Ster-

Stercorarius; Vernalis; Foſſor; dieſer nicht immer gleich groſs; vielleicht *Scop.* Scar. *oblongus.*

Fimetarius; deſſen Griſeus hält er für eine eigene Art. no. 7. *Conſpurcatus:* noch eher eine Varietät des Fimetarii. *Teſſulatus:* keine Abänderung des Fimetarii. *Sacer:* in den wärmern Theilen Tyrols ſehr gemein.

Lunaris; das untrüglichſte Kennzeichen die vom *Linné* angegebene *Längsfurche* des Bruſtſchildes.

Armiger, Scop. Ann. 5. H. N. p. 78. n. 16. *Taurus; Vacca; Nuchicornis; Thoracocircularis*, Schäff. Ic. t. 74. f. 6? der *rundbrüſtige Dungkäfer Schreberi:* die Schäfferſche Abb. Ic. t. 73. f. 6. kömmt mit der Linn. Beſchr. nicht genau überein. Er hat vier abgeſonderte rothe Flecke auf den Flügeldecken, nicht aber, wie beym *Schäffer*, zwey rothe Bänder. Wie oft aber haben Sch. Malereyen ſchon getäuſcht?

Ovatus: Vitulus Fabric. Mant. p. 209. no. 101-102. Nicht Linn. Vacca; eher *Geoffr.* I. p. 90. Copris. 5. *Bouſier à deux cornes.*

Der *neuen ſind drey.*

1) Scar. *Icterícus*, der *gelbſüchtige Dungkäfer.* Niger, elytris flavis. Im Kuhkoth gemein.

2) Sc. *Verticicornis*, der *ſcheitelhörnige Dungkäfer.* Totus niger, verticis ſpina erecta. Im Kuhkoth etwas ſelten.

3) Sc. *Quadrituberculatus*, der *vierhökrige Dungkäfer.* Subtus tomentoſus obſcurus. Auf dortigen Viehweiden häufig.

III. *Trox*, *Erdſtaubkäfer.* Le *Sablieur.*

1) Trox *ſabuloſus* Linn. nicht Scop. *rugoſus;* denn dieſer iſt Sc. Taurus Linn. und Scop. *Illyricus.*

2) Trox *hiſpidus.* Pontopp. N. G. v. D. p. 199. no. 19.

3) Trox *barboſus*, der *bärtige Erdſtaubkäfer.*

Ein *neuer.* Nigreſcens. Im Sommer des Abends bey Hunderten, ſetzen ſich an die Blanken, die gemeinſten in Tyrol.

4) Trox *holoſericeus Scop.* Ann. 5. hiſt. nat. p. 77. no. 15. der *ſammetne Erdſtaubkäfer.*

IV. *Melolontha*, der *Laubkäfer.*

1) *Vulgaris* Sc. Melol. *Linn.* Man findet ſie mit *rothbraunem und ſchwarzem Bruſtſchilde* in fettem und ſteinichtem Erdreiche zugleich.

2) *Solſtitialis* L. im Tyroliſchen *Brachkäfer;* ſehr haaricht; hängt ſich gern an die Kornähren, und beſtätiget *Lentins* Meynung, daſs er das *Mutterkorn* verurſache.

3) *Dubia* Scop. E. C. p. 3. no. 4. Nicht zwey Exemplare einander gleich. Eine Abänderung tota obſcure-violacea. In *Lauis* (Lugano) oft im Julius ſo häufig, daſs ſie faſt alles Weinlaub abfreſſen. *Friſch* hat ihn daher nicht ohne Urſache *Weinblattkäfer* genannt.

4) *Agricola* L. 5) *Hortícola* L.

6) *Floricola*, *Blumenlaubkäfer.* Ein *neuer.* Auf Heraclium Sphondilium, und Achillea Millefol. L. Subpiloſa nigra, elytris griſeis. Cf. *Füeßl.* Verz. p. 3. no. 37. *Fabric.* S. E. p. 38. no. 30. *Geoffr.* I. p. 80. no. 15. *Derſelbe* nach *Füeßl.* Anzeige.

7) *Argentea*, der *überſilberte Laubkäfer.* Scar. *farinoſus* L. Auf *Weiden* ſehr gemein. Der grüne Staub unter dem Vergröſserungsglaſe perlmutterfarbige runde Bläschen.

V. *Trichius*, der *Schirmblumenkäfer.* Le *Chevilliard.*

1) Tr. *faſciatus* L. no. 70. Auf allen *Umbellen.*

2) *Hemipterus* L. no. 63. das Weibchen gröſser, ganz ſchwarz; der After endigt ſich in einen an der Spitze ſägeförmigen Legeſtachel.

VI. *Cetonia*, der *Metallkäfer.* La *Cetoine.*

1) Cet. *aurata* L. no. 78. Am *zweyten* Gliede des Hinterleibes zwo ausgehende Spitzen.

2) C.

2) C. *Stictica* L. no. 54. Das Männchen unterscheidet sich durch die mindere Gröfse, und eine Reihe von vier weifsen Flecken, die in der Mitte der Bauchringe hinunterlaufen. Dies sind eben die vier Flecke, die Stoff zur Verwirrung geben. Man beobachtete sie an einigen, und vermifste sie an andern. Die *erstern* nannte L. Variabilis; die letztern Sticticus. Es sind nicht zwo Arten, da sie der Verf. beyde oft in Copula angetroffen, und hat dadurch meine Muthmafsung Beytr. I. p. 50. gerechtfertiget. Aus *Röfel* II. Vorber. gehört nur p. 27. Tab. B. f. 5. und sonst nichts hieher. *Schäff.* Ic. t. 98. f. 8. ist sehr unnatürlich.

3) C. *hirta*, L. *hirtellus*, no. 69. dem Stictico sehr ähnlich; aber doch hinlänglich unterschieden.

VII. *Hister*, *Stutzkäfer.*

1) *Unicolor* L. no. 3.
2) *Quadrimaculatus* L. no. 6.
3) *Bimaculatus* L. no. 5.
4) *Pygmaeus* L. no. 4.

VIII. *Dermestes*, *Speckkäfer.*

1) *Lardarius* L. no. 1.
2) *Murinus* L. no. 18.
3) *Undatus* L. no. 3.
4) *Pellio* L. no. 4. Bey diesem die Gestalt der Fühlhörner sehr ungleich.
5) *Fumatus Fabric.* S. E. p. 57. no. 12. In Häusern und auf verschiedenen Blumen. Schwerlich Linn. *fumatus* no. 22.
6) *Vini*, *Weinspeckkäfer.* In den *Weinkellern* häufig, besonders an dem mit Wein befeuchteten Holz.

Testaceus exiguus.

Nach ihrem ganzen Habitus habe ich dieſe immer für Abänderungen des Ptinus fur, oder ſelbſt für den Pt. *Germanus* L. no. 6. gehalten. *Goeze.*

IX. *Boſtrichus*, *Kaputzkäfer.*

1) B. *Typographus*, D. Linn. no. 7.

Von der beſondern Oekonomie und Kolonien dieſer Käfer unter alten Borken hoffe ich noch einmal einige Bemerkungen mitzutheilen, weil ich davon merkwürdige Stücke beſitze. *Goeze.*

Der Verf. hat Recht, daſs *Sulzers* Abb. von dem Typogr. nicht mit dem eigentlichen Borkenkäfer übereinkomme. Sie ſind walzenförmig, und der Bruſtſchild länglicht.

2) *Piniperda*, L. D. no. 11.

3) B. *pectinatus*, der *gekämmte Kaputzkäfer.*

Niger; antennis pectinatis, ſat longis. Ein *neuer.* Weil die Flügeldecken ganz, und nicht abgeſtumpft ſind, kann es L. D. *Microgr.* nicht ſeyn.

X. *Ciſtela*, der *Fugenkäfer.*

1) *Pillula*; L. *Byrrhus* no. 4. Auf den Flügeldecken ſchwarz und goldgelb unterbrochene *Lineolae*, nicht Faſciae.

2) C. *varia Fabric.* S. E. p. 60. no. 2.

3) C. *Aenea Fabric.* l. c. no. 3.

XI. *Byrrhus*, *Knollkäfer.* La *Vrillette.* *)

1) *Scrophulariae* L. no. 1.

2) *Verbaſci* L. no. 3.

XII. *Ptinus*, *Bohrkäfer.* La *Panache.*

1) *Fur* L. no. 5.

2) *Rufovilloſus Degeer* IV. p. 230. no. 2.

XIII.

*) Iſt es ſchon erwieſen, daſs dieſe Käfer wie die *Ptinen* (Vrillettes, und ihre Larven ſich durch alles durchbohren?

XIII. *Sphaeridium*, der *Halbkugelkäfer.*

Sphaerid. *Fabric.* Dermeſtes *Linn. Geoffr.* Anthribus *Geoffr.* Silpha *Linn.* Coccinella *Linn.*

1) *Scaraboïdes* L. no. 17. Schwerlich *Scop.* Derm. Scaraboïdes E. C. p. 18. no. 36.
2) *Unipunctatum* L. Cocc. no. 6.
3) *Atomarium* L. Silpha no. 35.
4) *Haemorrhoïdale Geoffr.* Antrib. no. 5.
5) *Xantopterum Fabric.* Sphaer. *minutum?* no. 8.

XIV. *Silpha*, *Aaskäfer.*

1) *Veſpillo* L. no. 2. Oft auf den Blumen, am liebſten auf den Gipfeln von Bromus, Dactilis, Aira, und andern Grasarten. (Vielleicht die kleinere Art.)
2) *Littoralis* L. no. 11.
3) *Abſciſſa*, der *abgeſtutzte Aaskäfer.*

Atra, apice elytrorum truncato. Nur halb ſo groſs als der Littoralis. Ein *neuer.*

4) *Sinuata*, der *geſchwänzte*, *Geoffr.* I. p. 120. no. 2.
5) *Thoracica* L. no. 13.
6) *Quadripunctata* L. no. 14.
7) *Atrata* L. no. 12. *)
8) *Laevigata Geoffr.* I. p. 122. no. 8.
9) *Obſcura* L. no. 18. *Schäff.* t. 93. f. 5?
10) *Tyrolenſis.* Auf den feuchten Wieſen in den Thälern der Tyroler Eisberge.

Nigra, elytris caſtaneis. Ein *neuer.*

11) *Rugoſa* L. no. 16. **)
12) *Opaca* L. no. 15.

XV. *Oſtoma*, *Beinkäfer.*

1) *Rubicunda* L. Silpha ferruginea no. 19.
2) *Ferruginea Fabric.* S. E. p. 77. no. 3.

*) Zu dem Schäff. Citato Icon. t. 93. f. 5. hat mich *Füeſsl.* Verz. p. 6. verleitet, und nach ihm ſoll f. 6. S. *opaca* ſeyn.

**) *Degeer* Tom. IV. p. 182. no. 7. hat bey ſeinem Bouclier raboteux ſelbſt dieſe Rugoſam Linn. citirt. Doch habe ichs nachher eingeſehen, daſs er Unrecht hatte.

3) *Bipuſtulata* L. no. 4.
4) *Colon* L. no. 27.
5) *Diſcoidea Fabric.* S. E. p. 78. no. 5.

XVI. *Caſſida*, *Schildkäfer.*

1) *Canaliculata*, der *hohlgerandete Schildkäfer.* Nigra, ſupra rubra, marginibus thoracis elytrorumque canaliculatis. An einer Gartenmauer. Der gröſste von allen. Ein *neuer.*
2) *Affinis* Fabric. S. E. p. 88. no. 3. Wir geben dem Verf. Recht, daſs das Friſchiſche Citat eher zu dieſem, als zu *Viridis* zu ziehen ſey.
3) *Viridis* L. no. 1. Die Erfahrung, daſs die grünen Schildkäfer im Tode grün bleiben, hebt meine Vermuthung auf, daſs *Viridis* und *Nebuloſa* einerley Arten wären.
4) *Fuſca*, der *braune;* in der Gröſse des grünen: Nigra, ſupra fuſca. Ein *neuer.*

XVII. *Coccinella*, *Sonnenkäfer.*

1) C. 2-*punctata* L. no. 7.
2) C. 5-*punctata* L. no. 11.
3) C. 7-*punctata* L. no. 15.
4) C. 8-*punctata* L. no. 14. *Linné* hat das *Weibchen* beſchrieben, und des Staatsr. *Müllers* C. 6-*punctata* Pr. Z. D. no. 622. iſt das *Männchen.* Der Verf. hat ſie in der Begattung angetroffen.
5) *Notata* Fabric. Mant. p. 217. Cocc. 7-*maculata.*
6) *Conſtellata*, der *geſtirnte.* Nigra, elytris punctis ſeptem. Eine *neue.*
7) C. 20-*punctata* L. 26?
8) C. *Conglobata* L. no. 30.
9) C. *Tetragonata*, der gewürfelte L. C. 14-*punctata.* no. 14.
10) *Conglomerata* L. no. 31. Hieher meine Citata aus *Müller* und *Scop.* bey der vorigen.
11) *Ocellata* L. no. 3.
12) *Oblongoguttata* L. no. 38.

13) 10-

13) 10-*guttata* L. no. 33.
14) 14-*guttata* L. no. 34.
15) 2-*pustulata* L. no. 42.
16) 4-*pustulata* L. no. 43.
17) 6-*pustulata* L. no. 44.
18) 10-*pustulata* L. no. 45.
19) 14-*maculata* L. no. 46.

XVIII. *Chrysomela*, *Blattkäfer.*

1) *Chr. Tenebricosa.* L. *Tenebrio* laevigatus no. 29? Das Frischische Citat bey *Geoffroi* XIII. p. 27. t. 22. stellt nicht diese, sondern den Carabus Spinipes L. vor.
2) *Chr. Coriaria*, der *lederartige Blattkäfer.* Nicht Chr. Göttingensis L. aber vielleicht *Fabric.* Chr. Götting., da er bey der Tenebricosa sagt: Statura et summa affinitas Chr. Gött. at *triplo major.*
3) *Chr. Metallica*, der *metallfarbige.* Ein *neuer*, nur Fabric. *Cuprea* S. E. p. 96. no. 10. etwas ähnlich.
4) *Chr. Goettingensis* L. no. 4. Das Röselsche Citat II. 3 Kl. t. 5. gehört nicht hieher.
5) *Chr. Haemoptera* L. no. 11.
6) *Chr. Viridula* L. Faun. Su. ed. 2. no. 520.
7) *Chr. Versicolora Scop.* E. C. p. 72. no. 224. Coccin. *Vitellinae.* Vermuthlich Linn. Chr. *aenea* no. 8.
8) *Chr. Populi* L. no. 30.
9) *Chr. Staphylaea* L. no. 26.
10) *Chr. Polita* L. no. 27.
11) *Chr.* 10-*punctata* L. no. 32.
12) *Chr. Pallida* L. no. 25. Leicht mit dem Derm. *Fumatus* zu verwechseln. Auch nicht Geoffr. *Crioceris* I. p. 243. no. 6. Es ist kein *Crioceris.*
13) *Chr. Polygoni* L. no. 24. Bey *Schäff.* Ic. t. 51. f. 5. die *grüne;* und t. 173. f. 4. a. b. die *blaue* Art.

14) *Chr. Faſtuoſa* L. no. 18. Nahe mit der *Specioſa* L. verwandt.

15) *Chr. Sanguinolenta* L. no. 38. Durchaus nicht Scop. *Bupreſtis* Sanguinolenta. Scop. verſteht allemal durch *Bupreſtis* einen Cryptocephalus des Geoffroi.

16) *Chr. Marginata* L. no. 39. *Sulzers* Geſch. t. 3. f. 10. Chr. *marginata* nichts als eine Chryſ. ſanguinol.

17) *Chr. Marginella* L. n. 40.

18) *Chr. Betulae* L. no. 10. Nicht Scop. Cocc. *Betulae*, ſondern Riparia no. 223.

19) *Chr. Vitellinae* L. no. 23. Dies Scop. Cocc. *erratica* no. 226.

Um dieſes Geſchlecht hat der Verf. groſse Verdienſte, und viele Verwirrungen glücklich gehoben, auch eben ſo viele falſche Zitata berichtiget.

XIX. *Clytra*, *Sägekäfer.*

Chryſomela *Linn.* Melolontha *Geoffr.* Cryptocephalus *Fabric.* Bupreſtis *Scopoli.*

1) *Cl. Longipes* Fabric. S. E. p. 105. no. 1.

2) *Cl. Quadripuncta* L. no. 76.

3) *Cl. Rubicunda Geoffr.* I. p. 196. no. 2.

4) *Cl. Tridendata* L. no. 73.

XX. *Cryptocephalus*, *Fallkäfer. Le Gribouri.*

Cryptocephalus *Geoffr. Fabric.* Chryſom. *Linn.* Bupreſtis *Scopoli.*

1) *Cr. Sericeus* L. no. 86.

2) *Cr. Violaceus Geoffr.* I. p. 23. no. 1.

3) *Cr. Coryli* L. no. 88.

4) *Cr. Signatus* Scop. no. 207.

5) *Cr. 6-punctatus* L. no. 92.

6) *Cr. Imperialis*, der *kaiſerliche.* Niger, elytris ſtramineis. Ein *neuer*, in der Gröſse des Coryli.

7) *Cr.*

7) *Cr. Podae* Muſ. gr. p. 28. no. 9.
8) *Cr. Limbatus* Scop. no. 203.
9) *Cr. Hieroglyphicus* Schäff. Ic. t. 114. f. 6. a b?
10) *Cr. Frenatus*, der *gezäumte.* Niger, thorace luteo ſtriato. Ein *neuer.* Auf Weiden ſehr gemein.
11) *Cr. Triſtis*, der *Traurige.* Niger, maculis duabus luteis thoracis. Ein *neuer.* Auf Weiden.

XXI. *Crioceris*, *Schnurrkäfer.*

Crioceris *Geoffr. Fabric.* Chryſomela *Linn.* Attelabus *Scopoli.*
1) *Cr. Merdigera* L. no. 97.
2) *Cr. 12-punctata* L. no. 110. *Spargelkäfer.*
3) *Cr. Campeſtris* L. no. 113.
4) *Cr. Melanopa* L. no. 105.

XXII. *Adimonia*, der *Forchtkäfer.*

Galeruca *Geoffr.* Chryſomela *Linn. Fabr.*
1) *Adim. Tanaceti* Linn. no. 5. Hieher *Röſel* II. 5 Kl. p. 15. t. 5.
2) *Adim. Violacea Geoffr.* I. p. 254. no. 6.
3) *Adim. Polygonata Geoffr.* I. p. 224. no. 5.
4) *Adim. Verna*, der *Frühlings-Forchtkäfer.* Tomentoſa teſtacea. Ein *neuer.* Auf verſchiedenen Stauden, beſonders auf dem Viburnum lantana L.

XXIII. *Altica*, *Hüpfkäfer.*

Chryſomela *Linn.* Altica *Geoffr. Fabr.* Chryſomela *Fabric.*
1) *Altic. Hyoſcyami* L. no. 54.
2) *Altic. Voluta*, der *gerollte.* Nur einmal auf *Taubneſſeln.* Tota teſtacea nitida. Ein *neuer.*
3) *Altic. Exoleta* L. no. 59.
4) *Altic. Rufipes* L. no. 65.
5) *Altic. Nitidula* L. no. 60.
6) *Altic. Nemorum* L. no. 62.
7) *Altic. Atra* Geoffr. I. p. 247. no. 8.

XXIV.

XXIV. *Curculio*, *Rüſſelkäfer.*

1) *Curc. Germanus* L. no. 58.
2) *Curc. Gemmatus Scop.* no. 90.
3) *Curc. Vagus* Geoffr. I. p. 282. no. 10. Scop. Curc. *triſtis* no. 94. kömmt ihm am nächſten.
4) *Curc. Cupreus* Scop. no. 94. C. *infidus?*
5) *Curc. Anthracinus* Scop. no. 92.
6) *Curc. Argentatus* L. no. 73. *Sulzers* Anführungen aus Schäffers Entom. t. 86. alle irrig. Kein Mylatris.
7) *Curc. Viride aeris*, der *Berggrüne.* Auf wilden Kaſtanien. Ein *neuer.*

Totus viridis.

8) *Curc. Fuſcus* Schäff. Ic. t. 163. f. 6.
9) *Curc. Excavatus*, der *Ausgehöhlte.* In Wäldern. Ein *neuer.*

Niger, punctis excavatis ſtriatus fulvo-maculatus.

10) *Curc. Abietis* L. no. 57. et no. 19. *Pini.*
11) *Curc. Longipes*, der *Langfuß.* Nur einmal am Stamme eines Taxbaums. Ein *neuer.*

Longiroſtris murinus, pedibus anterioribus longiſſimis.

12) *Curc. Mutilatus*, der *geſtümmelte.* Auf einer Hangbutenſtaude. Ein *neuer.*

Supra ater ſubopacus, ſubtus niger elytris abbreviatis.

13) *Curc. Violaceus* L. no. 63.
14) *Curc. Granarius* L. no. 16.
15) *Curc. Lapathi* L. no. 20.
16) *Curc. Punctatus* Geoffr. I. p. 279. no. 5.
17) *Curc. Pericarpius* L. no. 31. Der *Kernbehälterrüſſelkäfer.*
18) *Curc. Scrophulariae* L. no. 61.
19) *Curc. Paraplecticus* L. no. 34.
20) *Curc. Colon* L. Mant. p. 531.

21) *Curc.*

21) *Curc. Pollinis*, der *Blumenſtaubrüſſelkäfer.* Auf der Berberis communis L. nicht ſelten. Ein *neuer*. Nigreſcens, maculis albeſcentibus piloſis.
22) *Curc. Purpureus* L. no. 14.
23) *Curc. Flavipes* Geoffr. I. p. 272. no. 8.
24) *Curc. Sulciroſtris* L. no. 85.
25) *Curc. Bilineatus* Sch. Ic. t. 155. f. 2.
26) *Curc. Viridis* L. no. 76.

XXV. *Rhinomacer*, der *Afterrüſſelkäfer.*

Rhinomacer *Geoffr.* Curculio *Linn. Fabric.* Attelabus *Linn. Fabric.* Curculio *Scopoli.*

1) *Rhin. Bacchus* L. no. 38. Hieher die meiſten Zitata bey C. *purpureus.*
2) *Rhin. Betulae* L. no. 39. *Friſch* XII. p. 17. t. 8. 2 Pl. iſt wohl C. *Bacchus.*
3) *Rhin. Coryli* L. Attel. 1. Hieher gehöret mit Recht auch Attel. Avellanae L.
4) *Rhin. Curculionoïdes* L. Att. 3.

XXVI. *Attelabus*, der *Bienenkäfer.*

Attelabus *Linn.* Clerus *Geoffr. Fabric.* Notoxus *Fabr.*

1) *Attel. Apiarius* L. Att. 10. Deſſen Larve in dem Neſte der Mauerbienen, und nährt ſich von den Bienenmaden.
2) *Attel. Formicarius* L. Att. 8.
3) *Attel. Mollis* L. no. 11.
4) *Attel. Geoffroyanus:* L. Derm. violaceus no. 13.

So weit gehet des erſten Bandes erſter Theil dieſes vortrefflichen Buchs. Ich habe darum einen ſo weitläuftigen Auszug daraus gemacht, weil ich noch kein Inſektenwerk kenne, worinnen mehr Genauigkeit, Gründlichkeit, und auf Erfahrungsgründen beruhende Berichtigung vieler Verwirrungen, auch mehr Beſcheidenheit und Wahrheitsliebe wäre, als in dieſem.

ſem. In dieſem mehr litterariſche, entomologiſche Kenntniſs, im *Schrank* etwas mehr eigentliche Naturgeſchichte. Beydes ein Paar der trefflichſten Bücher zur Entomologie.

* * *

Ein eben ſo wichtiges Werk für die Thier-Inſekten- und beſonders für die *Wurmgeſchichte* iſt folgendes:

Fauna Groenlandica: Syſtematice ſiſtens Animalia *Groenlandiae occidentalis*, hactenus indagata, quoad nomen ſpecificum, triviale, vernacalumque, Synonyma Auctorum plurium, Deſcriptionem, Locum, Victum, Generationem, Mores, Vſum, Capturamque ſinguli, prout detegendi occaſio fuit, maximaque parte ſecundum *proprias obſervationes Othonis Fabricii*, Miniſtri Evangelii, quondam Groenlandis ad Coloniam Friederichshaab, poſthac Norvagis Drangedaliae, nunc vero Danis Hopunti Jutiae, Membri Societatis Scientiarum, quae eſt Hafniae. 8. Hafniae et Lipſiae 1780.

Ein würdiger Schüler des würdigſten Otto Friedr. *Müllers!* Wer hätt' es geglaubt, daſs man von Grönland eine ſo reiche Faunam liefern könnte? Dieſe Fauna iſt gleichſam der Prodromus eines gröſſern Werks, das wir noch von dem Verf. zu erwarten haben, und welches aus drey Theilen beſtehen wird.

Pars I. *Phyſica* cum figuris variis rariorum.
— II. *Geographica* cum chartis.
— III. *Hiſtorica.*

In

In dieſer Fauna, wobey eine Kupfertafel, hat ſich der Verf. was die Klaſſen und Geſchlechter der Thiere betrifft, nach *Müllers* Zool. Dan. Pr. gerichtet. Von Inſekten 371 Arten. Von Würmern 709 Arten. Von *Bandwürmern* kommen p. 316 f. inſonderheit vor:

1) Taenia *Phocarum.*
2) — *Erythrini.*
3) — *Alcae.*
4) — *Tordae.*
5) — *Scorpii.*
6) — *Gaſteroſtei.*

Ich kann dieſes intereſſante Werk nicht genug empfehlen, weil es keinen Auszug leidet.

⁂ ⁂ ⁂

In den Bemerkungen der Churpfälziſchen phyſikaliſchen oekonom. Geſellſch. vom Jahr 1779. finde ich No. 4. Hrn. *Pollich* Abhandlung von einigen *Inſekten*, die in des Ritt. von *Linné* Naturſyſtem nicht befindlich ſind.

1) *Papilio Pompadour*, der *Weißſaum.*
2) *Cimex* punctum album, der *Weißpunkt.*
3) *Cimex ſuperbus*, der *Felſenſteiger.*
4) *Cimex* Vilburgenſis, der *Naſſauer.*
5) *Tenthredo* arbuſtorum, der *Baumgärtner.*
6) *Lucanus* aeneus, der *Kupferſchröter.*
7) *Ichneumon* mixtus, der *Miſchling.*
8) *Phalaena* bipunctata, der *Zweypunkt.*

Die glückliche Entdeckung der Oekonomie der *Prachtkäfer* (Bupreſtis), die bisher noch ſo dunkel war, haben wir dem Hrn. Pred. *Herbſt* in Berlin zu danken. S. Schriften der Berlin. Geſellſch. Naturf. Freunde, I. p. 85 ff.

Zum

Zum Beſchluſs will ich noch des neuen, prächtigen und koſtbaren Inſektenwerks gedenken, das nach *Baldingers* neuem Magaz. für Aerzte 2 B. 5 St. p. 464. von Lyon angekündiget iſt:

Les Inſectes de France, décrits et claſſés ſelon la méthode de Mr. *Linnaeus*, par Mr. de *Villers* des Acad. de Lyon & de Marſeille, deſſinés par Mr. *Gonichon* & gravés par les plus célebres Artiſtes, in 4. *quatre Volumes*, propoſés par Subſcription.

Darinn eine Menge ſeltener und wenig bekannter Inſekten: mehrere, von denen man geglaubt hat, ſie wären in Afrika und Amerika zu Hauſe. Im Junius 1781 die erſte, und im Junius 1783 die letzte Ausgabe. Der Preis 120 Livr. Die Zahl der Inſekten auf drittehalbtauſend. Bey jeder Ausgabe 12 - 15 Platten. Ueberall bis 230 Platten.

Wenn das ſo fortgehet, ſo fürchte ich, daſs allein das Inſektenſtudium anſehnliche Bankeroute veranlaſſen werde.

Vor der Michaëlismeſſe 1781.

3. Zungenlose *Spinner*, mit niedergedrückten Flügeln und Kammrücken (alis depressis, dorso cristato).

54. *Pudibunda*, der *Kopfhänger*.

Müller l. c. p. 669. no. 54. der *Kopfhänger*.

Füeßlins schweiz. Inf. p. 35. no. 671. der *Rothschwanz*.

Auf *Büchen*, *Eichen und Nußbäumen*.

— Magaz. der Entomol. II. B. p. 3.

Berlin. Magaz. II B. p. 418. no. 35.

Phal. *pudibunda*, der *Rothschwanz*. Aschgrau mit drey graubraunen Queerstreifen durch die Oberflügel.

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2te Kl. p. 222. t. 38. die gelbe *Bürstenraupe*, und derselben Verwandlung *).

Maders (Kleemanns) Raupenkalender, p. 32. no. 78. Phal. *pudibunda*, der *Kopfhänger* **). p. 111. no. 312. der *Kopfhänger*, *Streckfuß*.

Gle-

*) *Rösel* hat beyde Geschlechter, Männchen und Weibchen, mit borstenförmigen Fühlhörnern abgebildet, da doch nur das Männchen *kammförmige* Fühlhörner hat; diesen kleinen Irrthum aber im 3ten B. p. 270. §. 6. berichtiget.

**) Hierbey am Rande *Rösels* s. 37. f. 1-9. unrichtig angeführt,

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 569. no. 5. Phal. *pudibunda*, der *Rothſchwanz.*

Fiſchers N. G. von Livland, p. 152. no. 355. Phal. *pudibunda;* der *Kopfhänger; ſchamhafter Nachtſchmetterling.*

Syſtemat. Verzeichn. der Schmetterl. der Wien. Geg. p. 55. G. *Bürſtenraupen;* Larvae faſciculatae (Chenilles à broſſes); *Streckfüßigte* *) *Spinner;* Phal. Bomb. *Tendipedes.*

1) Beyde Geſchlechter mit abhangenden Flügeln.

2) Die Männchen mit flachverbreiteten Flügeln; die *Weibchen flügellos.*

No. 1. der erſten Abtheilung:

Wallnußſpinnerraupe (Iuglandis regiae): La Chenille à broſſes du Châtaigner.

Wallnußſpinner: Phal. *pudibunda;* la *patte étendue.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 403. Phal. *pudibunda.*

Bekm. Epit. Syſt. Linn. p. 164. no. 54. Phal. *pudibunda.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 185. no. 7. *Phalaena* media cinerea, alis oblongis, exterioribus quatuor lineis nigricantibus transverſis diſtinctis **).

— — p. 309. no. 3. *Eruca* pulcherrima rarius piloſa, cum 4 in medio dorſo pilorum faſciculis albicantibus

welche die *Faſcelinam* vorſtellt; hingegen p. 111. bey der nämlichen pudibunda die rechte Kupfertafel t. 38. f. 1-6. zitirt.

*) Weil alle Falter dieſer Klaſſe das *Familienzeichen* haben: daſs ſie im Sitzen beyde Vorderfüſſe lang vor ſich herſtrecken, und zwiſchen denſelben den niederhangenden Kopf verbergen.

**) Scapulae, caput, vt et pedes primores, (quos, cum quieſcit, antrorſum recta protendit, iisque oculos et caput occultat,) longa et denſa lanugine veſtiuntur.

tibus cum diluta purpurae tinctura, et *penicillo purpureo* erecto in cauda.

Raj. Hist. Inf. p. 344. no. 9. *Eruca* major pulcherrima pilosa, e viridi flavicans, 4 in medio dorso scopulis e flavo albicantibus, cum purpureo penicillo longiore supra caudam.

Syst. Natur. du Regne Animal, Tom. II. p. 146. no. 19. *Phalene* de la Chenille à brosses, qui se trouve sur le Châtaigner.

Scop. Entom. carn. p. 194. no. 489. Phal. *pudibunda.*

Long. lin. $9\frac{1}{3}$. Lat. $4\frac{1}{2}$.

Antennae rufae; rachi alba; Alae albidae: *anticae* lineis tribus, repandis, umbrinis fasciatae; pagina alae inter fasciam mediam et posticam vmbrina tota; *posticae* subtus macula media, fusca.

Fabric. Syst. entom. p. 570. no. 50. Bomb. *pudibunda.*

Alis deflexis, cinereis; fasciis tribus fuscis, linearibus, undatis.

Larva fasciculata, pilosa, flava, capite luteo, caudae fasciculo longiori rubro, dorsi quatuor albis.

Pupa folliculata, antice nigra, postice brunnea, flavo-maculata.

Schaeff. Icon. t. 44. f. 9. 10. *Foemina.* t. 90. f. 1. 2. 3. (*Wien. Schmett.* p. 151.)

*Müller*i Faun. Frider. p. 40. no. 364. Ph. B. *pudibunda.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1367. Phal. B. *pudibunda.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 113. no. 15.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, fasciis transversis obscurioribus, capite inter pedes porrectos.

La *patte-étendue.*

Long. 1 pouce.

Degeer Inſ. I. Mém. 7. p. 243. t. 16. f. 7 - 12.

Belle Chenille velue jaune, à broſſes et à aigrettes, qui a des bandes transverſales noires et veloutées à la jonction de quelques anneaux, et qu'on trouve en Automne ſur les Poiriers, les Châtaigners et d'autres arbres.

— — p. 697. t. 16. f. 11. 12.

Phalene à antennes à barbes brun-jaunâtres, ſans trompe; gris-blanchâtre à quelques rayes transverſales ondées brunes.

— Tom. II. Part. 1. p. 317. no. 6. *Phalene patte-étendue blanche.*

Phalene à antennes à barbes jaunes ſans trompe; à corcelet huppé, à ailes cendrées blancheatres avec des rayes transverſes ondées brunes et cendrées.

— *Ueberſ.* I. 7 Abh. II Quart. p. 27. t. 16. f. 7-12.

Die ſchöne, rauche, gelbe *Bürſten-* und *Büſchelraupe*, mit ſammtſchwarzen Queerſtreifen in einigen Ringgelenken, die man im Herbſt auf den Birn-Kaſtanien- und andern Bäumen findet.

— IV Quart. p. 120. t. 16. f. 11. 12. Ein weiſslichgrauer *Nachtvogel* mit braungelblichen bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, und einigen wellenförmigen braunen Queerſtreifen.

— II Th. I B. p. 229. no. 6.

Die ohnzüngige *Phaläne*, mit gelben bärtigen Fühlhörnern; einem Rückenkamm, und weiſslich aſchgrauen Flügeln mit braunen und aſchgrauen gewäſſerten Queerſtreifen.

Der *weiſſe Streckfuß.*

β. Phal. *Scopularia.*

Linn. Syſt. Nat. ed. 10. p. 521. no. 144.

Clerk Icon. t. 5. f. 8.

Cathol.

Cathol. A. p. 352. *Chenille annulaire;* Annularia*).
Eruca *annularis Friſch.*
Neuſtria major *Mouffet.*
Eruca ſepiaria gregaria maior pulchre colorata. *Raj.*

55. *Faſcelina*, die *Bürſtenmotte.*

Müller Erl. des L. N. S. V B. I Th. p. 669. no. 55. t. 14. f. 6. der *Büſchelraupenvogel.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 35. no. 672. die *Bürſtenmotte.*
Auf dem Weiſsdorn, etwas ſelten.
— Magaz. der Entomol. II. p. 4. Phal. *Faſcelina.*
In Bündten im Frühjahr gemein, auf dem *Klee* beſonders mehrere beyſammen.
Berlin. Magaz. II. p. 422. no. 41. Phal. *Faſcelina*, die *Bürſtenmotte.*
Aſchfarbig mit vielen feinen braunen Punkten, und einem ſchmalen braunen Queerſtreif durch die Oberflügel.
Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 K. p. 217. t. 37.
Die graue *Bürſtenraupe*, und derſelben Verwandlung.
Maders (Kleem.) Raupenkalender p. 15. no. 18. Phal. *faſcelina*, *Bürſtenmotte.*
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 683. no. 7. Phal. *faſcelina*, das *geſtreifte Band.*
— II. p. 740. no. 28. Ph. *faſcel. das geſtreifte Band.*

*) Die *Ringelraupe*, d. i. eine 16füſſige Raupe, welche ihre Eyer um die höchſten Zweige der Obſtbäume, ſehr nahe bey einander, in einem Kreis oder Ring herumlegt. Dieſe Raupe hat ſehr ſchöne Farben. Sie iſt die Larve des Nachtſchmetterlings, der beym *Linné* Phalaena *Scopularia* heiſst, und eine Gattung der Phal. *pudibunda* iſt.

Beyde, Larve und Phaläne, mir völlig unbekannt. Bloſs im Clerk eine Abbildung der Phaläne. Wer ſie kennet und beſitzt, mache ſie doch im *Naturforſcher* bekannter.

Wien. Schmett. p. 55. G. no. 3. *Kleeblumenſpinnerraupe.* (Trifol. pratenſe.) La *Limaçonne.* Goed. *Kleeblumenſpinner.* Phal. B *faſcelina.*

Onomatol. hiſt. nat. P. I. p. 469. Antennulata *Mouff.* die *Löwenzahnraupe;* die *Butterblumenraupe.*

— P. 6. p. 366. Phal. *faſcelina,* der *Büſchelraupenvogel.*

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 55. Phal. *faſcelina.*

Catholic. A. p. 359. Antennulata *Mouff. Löwenzahnraupe.*

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 147. no. 20. *Phalene du Trefle.*

Goed. belg. I. p. 84. t. 36. Eruca *faſciculata.*

Merian. Europ. t. 18. *Taraxacum.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 186. no. 8.

Phalaena obſolete cinerea, alas corpori velut circumvolvens, pedes primores longa et denſa lanugine hirſutos antrorſum longiſſime porrigens.

— — p. 334. *Phalaena* e cinereo albicans, corpore habitiore; antennis plumoſis rubentibus, primores pedes, cum ſedet, protendens, et alas corpori velut circumvolvens.

— — p. 344. *Eruca* nigra media, longis pilis hirſutis, quinque medio dorſo innaſcentibus pilorum longiorum ſcopulis nigro albo et ex luteo viridi coloribus variis.

Fabric. Syſt. entom. p. 571. no. 51. B. *faſcelina.*

Alis deflexis cinereis; atomis nigris ſtrigisque duabus fulvis, repandis.

Larva piloſa, *faſciculata,* rubro-punctata; faſciculis quinque dorſalibus albis, capitis anique fuſcis.

Pupa folliculata, brunnea, linea dorſali piloſa.

Mülleri

Müllerí Faun. Frider. p. 40. no. 365. Phal. B. *faſcelina.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1368. Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. I. Mém. 7. p. 261. t. 15. f. 12-15.

Chenille noire très-velue, à cinq broſſes demi-noires et demi-blanches ſur le dos, et à trois longues aigrettes noires.

— — p. 697. t. 15. f. 15. Phalene à antennes à barbes, ſans trompe, d'un gris d'achate, à deux rayes noires bordées de jaune et à tache noire bordée de blanc.

— Tom. II. Part. I. p. 318. no. 7. *Phalene* à antennes barbues ſans trompe, à corcelet huppé, d'un gris d'agathe, avec deux rayes noires bordées de jaune et une tache noire bordée de blanc ſur les ailes ſupérieures.

Phalene patte-étendue agathe.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. 7 Abh. p. 40. t. 15. f. 12-15.

Die ſchwarze rauche Raupe, mit fünf halbſchwarzen und halbweiſſen Rückenbürſten, ſammt drey langen ſchwarzen Haarbüſcheln.

— 4 Qu. p. 119. t. 15. f. 15.

Ein achatgrauer *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, mit zwo ſchwarzen gelbbordirten Streifen, und einem ſchwarzen Fleck mit weiſſem Rande.

— II Th. I B. p. 230. no. 7.

Die ohnzüngige Phaläne mit bärtigen Fühlhörnern, einem achatgrauen Rückenkamm, und zwo ſchwarzen gelbgerändelten Streifen, nebſt einem ſchwarzen weiſsgerändelten Fleck, auf den Oberflügeln.

Der *achatfarbige Streckfuß.*

56. *Antiqua*, der *Sonderling* *).

Müller l. c. p. 670. no. 56. der *Sonderling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 35. no. 673. der *Laſtträger.*

— Magaz. der Entomol. II B. p. 4. Phal. *antiqua.*

„Auf dem neunten und zehnten Gelenke haben die Raupen *kleine rothe Knöpfchen*, die ſie „aus- und einziehen können, welches weder „*Reaumur* noch *Röſel* bemerkt haben“**). — Nach der *fünften* und letzten Häutung bekommen ſie alle die *Bürſten*, die einige nach der *vierten* noch nicht haben. (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Mag. II. p. 408. no. 21. Phal. *Antiqua*, der *Laſtträger.*

Das *Weibchen* weiſs, und *ohne Flügel.* Die Flügel des Männchens glänzend braun, mit weiſſen und oraniengelben Zeichnungen.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 225. t. 39. f. 1 - 4.

Die mit rothen Knöpflein gezierte graue Bürſtenraupe, nebſt derſelben Verwandlung.

— — Fig. 4. das *ungeflügelte Weibchen.*

— III B. p. 81. t. 13. das *Männchen* ***).

Maders

*) Das Weibchen dieſes Nachtvogels iſt völlig *flügellos*, und ſieht aus wie ein *Kellerwurm.* Man kennet bis jezt unter den *Spinnern* nur zwo Arten, deren Weibchen *flügellos* ſind: dieſe, und Ph *Gonoſtigma.* Unter den *Spannern* giebt es mehrere.

**) Herr *Kleemann* ſagt ausdrücklich in ſeiner Anmerkung zum *Röſelſchen* Text I. B. p. 227. Zwiſchen dem letzten Paar der rothen Knöpflein auf dem *neunten und zehnten Abſatz* ſtehet ein noch viel mehr hochrother fleiſchiger blaſenartiger Knopf, den die Raupen einziehen und wieder hervortreiben können.

***) Schleppt das Weibchen nicht durch die Luft, da ſolches gleich befruchtet wird, wie es aus der Puppe kömmt, und ſich nicht von der Stelle bewegt, ſondern ſeine Eyer gleich an das Gewebe

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 32. no. 79. Phal. *Antiqua*, der *Laſtträger; Sonderling.*

Swammerd. Bib. der Nat. p. 223. t. 33. f. 3. 6. 8.

Altes Hamb. Magaz. I B. 6 St. p. 167. *Ungeflügelte Schmetterlinge.*

Neue Mannichfalt. II Jahrg. p. 516. 612.

Naturforſcher V St. p. 253. Phal. *Antiqua.* Das Weibchen legt auf 300 Eyer.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 388. no. 4. Phal. *antiqua*, der *Laſtträger.*

— — p. 549. no. 4.

Wien. Schmetterl. p. 55. G. No. 5. *Abrikoſenſpinnerraupe* (Pruni Armeniacae); *Abrikoſenſpinner;* Ph. B. *antiqua.*

Schriften der königl. *norwegiſchen* Geſellſch. der Wiſſenſchaften, IV. p. 281. no. 37. t. 16. f. 14. Phal. *antiqua.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 370. no. 9. Ph. *antiqua.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 315. Phal. *antiqua*, der *Sonderling.*

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 56. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 146. no. 18. *Phalene de la Chenille à broſſes* ſur le Prunier.

Cathol. A. p. 372. Ph. *antiqua.*

Act. Vpſal. 1736. p. 25. no. 74. *Papilio* alis depreſſis cinereo-fuſcis; antennis pectinatis.

Liſt. Goed. p. 185. no. 78. a b. *) Eruca *miranda; Antik peregrinum.*

webe auf einen Haufen legt, und ſtirbt; die jungen Räupchen aber ſich von einem Baum auf den andern zerſtreuen.

*) Es iſt doch ſonderbar, daſs ſchon *Goedart* und *Lifer* Erfahrungen gehabt, daſs aus Schmetterlingseyern, ohne Zukunft des Männchens, junge Räupchen ausgekommen ſeyn ſollen.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 173. no. 24. *Phalaena* cinericea ventricoſa corpore brevi, *alarum expers (Foemina).*

— — p. 200. no. 24. *Phalaena* minor rufa, in utravis ala exteriore macula alba rotunda prope angulum imum interiorem inſignita *(Mas).*

— — p. 344. no. 8. *Eruca* ſublutea piloſa, quatuor in medio dorſo agminulis ſeu penicillis pilorum longiorum luteorum, et longo pilorum nigrorum penicillo in cauda.

Scop. Entom. carn. p. 198. no. 496. Phal. *antiqua.*

Long. lin. 7. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.

Antennae longitudo eſt dimidia latitudinis alae anticae, quibus macula corticina alba linea terminata ad apicem, nec non lunula alba prope poſticum angulum.

Folliculus duplex ut in *pudibunda.*

Fabric. Syſt. Entom. p. 584. no. 98. B. *antiqua.* Nom. *Linn.*

Larva faſciculata; faſciculis dorſalibus quatuor albis, antennalibus caudalique obſcuris.

Pupa folliculata, nigro luteoque variegata.

Müller i Faun. Frider. p. 41. no. 366. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1369. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 119. no. 23.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis rotundatis fuſco-ferrugineis, ſuperioribus macula alba anguli ani; *foemina aptera.*

L' *étoilée.*

Long. 7 lign.

Degeer Inſ. I. Mém. 7. p. 253. t. 17. f. 1-15.

Chenille très-commune, noire à quatre broſſes jaunâtres ſur le dos, et à cinq aigrettes noires en

en forme de pinceaux, qui a des tubercules rouges, et qui mange les feuilles de plusieurs especes d' arbres.

Degeer Inf. I. Mém. 7. p. 697. t. 17. f. 13. 14. 15.

Phalene à antennes à barbes, sans trompe, dont la femelle est grise et sans ailes, et dont le mâle est jaune brun, à deux taches blanches.

— Tom. II. Part. I. p. 292. no. 2.

Phalene à antennes barbues sans trompe, à ailes étendues d'un brun jaunâtre, avec une tache blanche; dont la femelle est grise et sans ailes.— *Phalene paradoxe.*

— *Ueberf.* I B. 2 Qu. 7 Abh. p. 33. t. 17. f. 1-15.

Die sehr gemeine schwarze *Raupe*, mit vier gelblichen Rückenbürsten, fünf schwarzen Haarpinseln und rothen Knöpfen, fast auf allen Bäumen.

— — 4 Qu. p. 120. t. 17. f. 13-15.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern ohne Saugrüssel; das Weibchen grau und ungeflügelt; das Männchen gelbbraun mit zween weissen Flecken.

— II Th. I B. p. 208. no. 2.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Sauger, welche die Flügel breit trägt, die gelbbraun sind und einen weissen Fleck haben; das Weibchen grau und ungeflügelt.

Das *Paradoxum.*

57. *Gonostigma*, der *eckfleckige Spinner.*

Müller l. c. p. 671. no. 57. der *Eckfleck.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 36. no. 674. der *Eckfleck.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 6. Phal. *gonostigma.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 32. no. 80. Phal. *Gonostigma*, der *Eckfleck.*

Rösels

Röſels Inſektenbel. I B. N. V. 2 Kl. p. 229. t. 40. die *ſchön pomeranzengelbgeſtreifte Bürſtenraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 55. G. no. 6. *Zwetſchkenſpinnerraupe* (Pruni domeſticae). La Chenille *à broſſes* du Prunier. *Réaum.* La *Soucieuſe.* Goed. *Zwetſchkenſpinner.* Phal. B. *Gonoſtigma.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 373. Phal. *Gonoſtigma.*

Scop. Entomol. carn. p. 199. no. 497. Phal. *Gonoſtigma.*

Long. lin. 6. *Lat.* $3\frac{2}{3}$.

Ochreacea, alis anticis macula *trigona,* alba — *differt* ab antiqua antenn. rachi ochreacea. Alis ſubtus concoloribus: primoribus ſupra faſcia antica obſoleta obſcuriore, atmoſphaera fuſca circa maculam albam.

Fabric. Syſt. Ent. p. 585. no. 99. B. *Gonoſtigma.*

Alis incumbentibus fuſcis; maculis duabus albis oppoſitis; *foemina aptera.*

Differt manifeſte a praecedente. Alae ochreaceae, maculis duabus albis, altera ad angulum ani, altera oppoſita ad marginem craſſiorem maculae ferrugineae innata.

Larva gregaria, faſciculata, faſciculis octo dorſalibus albis, collaribus duobus analique nigris.

Pupa antice flava, poſtice nigra.

58. *Tremula,* der *Eſpenſpinner.*

Müller l. c. p. 671. no. 58. der *Zahnflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 675. *der Zahnflügel.*

Wien. Schmetterl. p. 49. A. *Scheinſchwärmerraupen: Mondmaklichte Spinner* mit gerundeten Flügeln.

No. 4. *Aeſpenſpinnerraupe* (Populi tremulae); *Aeſpenſpinner.*

Fiſchers

Fiſchers N. G. von Livl. p. 152. no. 356. Ph. *Tremula; Zitterſchmetterling; Zahnflügel.*
Naturforſcher VI. p. 116. t. 5. f. 4.
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 298. no. 1121. *)

59. *Coeruleocephala*, der *Blaukopf* **).

Müller l. c. p. 671. no. 59. der *Blaukopf.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 676. Ph. *Coeruleocephala*, der *Blaukopf.*
— Magaz. der Entomol. II. p. 6. Phal. *coeruleocephala* ***).

Friſch

*) Daſelbſt die Beſchreibung ſehr genau, und mit der im Naturforſcher befindlichen Abbildung übereinſtimmend.

**) Auch an dieſer hat der groſse *Bernoulli* das Vermögen bemerkt, fruchtbare Eyer zu legen, ohne ſich begattet zu haben. S. *Erxlebens* phyſik. Bibl. II B. p. 363.

So wenig wir geneigt ſind, die Erfahrungen eines *Bernoulli* und anderer abzuleugnen; ſo ſehr empfehlen wir bey Wiederholung ſolcher Verſuche Genauigkeit und Vorſicht. Denn dies wäre ſicher der Fall, worinn ſich die Natur von ihren gewöhnlichen, und in dem groſsen unermeſslichen Thierreiche durchgängig beſtätigten Geſetzen am weiteſten entfernte. Man müſste von dergleichen, aus unbefruchteten, oder vaterloſen Eyern ausgekommenen Raupen wieder welche zur Verwandlung zu bringen ſuchen, um zu ſehen, wie weit ſich dann dieſe vermeinte Fruchtbarkeit erſtrecke.

***) „Viele dieſer Raupen, ſagt der Herr Chorherr *Meyer*, die an einem Tage ganz geſund ſchienen, traf ich am folgenden wie verfault an, indem aus jeder eine ungeheure Menge ſehr kleiner Würme oder Larven kamen, nachdem ſie die Raupe bis auf den Balg, und dieſes, wie es ſcheint, in wenigen Stunden, ausgehöhlt hatten. Dies hemmet die ſtarke Vermehrung dieſer gefräſſigen Baumraupe.“

Dieſer Umſtand iſt mir in Anſehung des vorigen Phänomens von den fruchtbaren Eyern dieſer Phaläne ohne Begattung ſehr wichtig. Wie wenn dergleichen *Ichneumonslarven* in den Eyern geſtekt,

Frisch Inf. X. p. 5. no. 3. t. 3.
Die *blaugrünliche Raupe* mit gelben Streifen, und der Papilion davon.

Berlin. Magaz. II. p. 410. no. 22. Phal. *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*
Braun, etwas ins Graue und Bläuliche fallend; die Oberflügel mit drey an einander ſtoſsenden gelblich weiſſen Flecken.

Röſels Inſektenbeluſt. I. N. V. 2 Kl. p. 105. t. 16. die *dicke meergrüne gelbgeſtreifte und ſchwarzpunktirte Raupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 13. no. 12. Ph. *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 785. no. 6. Phalaena *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Inſektologie p. 97. no. 20. Phal. *coeruleocephala.*
Die *Raupe* hat auch das *Fleiſchhorn* unten am erſten Ringe zwiſchen der Unterlippe, und dem erſten Paar Füſsen.

Wiener Schmetterl. p. 59. M. *Halbhaarraupen*, Larvae *ſubpiloſae; groſsſtirnichte Spinner;* Phal. Bomb. *Capitones.*
No. 3. *Mandelnſpinnerraupe* (Amygdali communis); La tête bleue. *Goed. Mandelnſpinner.* Ph. *coeruleocephala.*

Fiſchers N. G. von Livland, p. 152. no. 357. Phal. *coeruleocephala*, *Blaukopf.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 370. no. 10. Phal. *coeruleocephala.*

Onomat.

geſteckt, und etwas vor der Zeit aus dieſen Eyern ausgekommen wären? Hab' ich doch Erfahrungen, daſs ſich in den Eyern der Phal. *caſtrenſis* die kleinen Ichneumons bis zur *Fliege* verwandelt haben. S. *Naturforſch.* 15 St. p. 49.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 326. Phal. *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 59. Phal. *coeruleocephala.*

Fabric. Syſt. entom. p. 572. no. 53. B. *coeruleocephala.*

Alis deflexis griſeis; faſciis duabus ferrugineis, maculaque albida duplicato-didyma.

Larva nuda, coeruleſcens, luteo-lineata, nigro punctata.

Pupa folliculata, brunnea.

Imago thorace antice ferrugineo, poſtice griſeo.

— Reiſe durch Norwegen p. 69. Ph. *coeruleocephala.* Die *Raupen* faſt alle Obſtbäume kahl gefreſſen.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 163. no. 17.

Phalaena alis exterioribus pullis duabus tribusve maculis albis, e duobus circulis compoſitis, contiguis notatis.

— — p. 163. no. 17. *Eruca* rarius piloſa, mali, pyri.

Mülleri Faun. Frider. p. 40. no. 363. Ph. B. *coeruleocephala.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1370. Phal. *coeruleocephala.* Nom. *Linn.*

Syſtem. Nat. du Regn. anim. II. p. 149. no. 27.

Phalene du Poirier, qui eſt le *bleu-Céphale*, *coeruleocephalus.*

Geoffr. Inſ. II. p. 122. no. 27.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis fuſcis, macula duplici albido-flaveſcente geminata.

Le *double-omega.*

Long. 10. lign.

60. *Di-*

60. *Dictaea*, der *brandflüglichte Spinner* *).

Müller l. c. p. 672. no. 60. der *Brandflügel.*

Wien. Schmetterl. p. 62. R. *Buckelraupen*, Larvae *gibbosae; rückenzähnichte Spinner.* Phal. B. *Dorso dentatae.*

1) mit unrichtigen *Hoekern*, vornehmlich auf dem *eilften Ringe.*

No. 1. *Schwarzpappelspinnerraupe.* (Populi nigrae): *Schwarzpappelspinner.* B. *Dictaea.*

Fabric. Syst. Nat. App. p. 831. 55-56. Phal. *Dictaea.* Nom. *Linn.*

Habitat in Europae populo nigra, betula alba.

61. *Ziczac*, der *Zickzackspinner* **).

Müller l. c. p. 672. no. 61. der *Zickzack.* Die *Raupe*, die *Sattel- Drachen- Kameelraupe.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 36. no. 677. das *Zickzack.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 7. Phal. *Ziczac.*

Raupe häutet sich *fünfmal.*

Frisch Inf. III. p. 4. no. 2. 1 Pl. t. 2. von der Raupe mit den *Kameelbuckeln.*

Berlin. Magaz. II. p. 410. no. 23. Phalaena *Ziczac*, das *Zickzack.*

Weislichgrau und gelblich; an einigen Orten braun; die Unterflügel weisgrau.

Leffers Theol. der Inf. p. 263. not. o. die *Kameelraupe*, ὁ Φοβερὸς.

Röfels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 129. t. 20. die *Kameelraupe* mit ihrer Verwandlung.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 740. no. 29. Ph. *Ziczac*, das *Zickzack.*

Wiener

*) *Nicht abgebildet.*

**) Der Feind der Raupe ist der Ichneumon *pugillator* Linn. S. N. ed. 12. p. 936. no. 50.

Wiener Schmetterl. p. 63. R.

3) mit buckelförmigen Erhöhungen auf den Mittelringen.

No. 5. *Flechtenweidenſpinnerraupe* (Salicis pentandrae): *Flechtenweidenſpinner.* Ph. B. *Ziczac.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 361. *Kameelraupe.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 418. Ph. *Ziczac,* der *Kameelraupenvogel.*

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 61. Ph. *Ziczac.*

Schaeff. Icon. t. 69. f. 2. 3.

Fabric. Syſt. Ent. p. 573. no. 55. B. *Ziczac.* — antennis *ſquamatis.*

Larva ſolitaria, nuda, dorſo gibberibus duobus, cauda rufa.

Pupa folliculata, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 40. no. 362. Ph. *Ziczac.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1371. Ph. *Ziczac.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 123. no. 29.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis exterioribus fuſcis, venis plurimis, faſcia circulari, et marginis interioris appendice nigricantibus; inferioris albidis, limbo lineari fuſco.

Le *bois veiné.*

Long. 7. lign.

Degeer Inſ. I. Mém. 3. p. 116. t. 6. f. 1 - 10.

Chenille raſe, à trois tubercules charnus en forme de cornes ſur le dos, qui mange les feuilles de l'Ozier et du Saule, et qu'on a nommée le *Ziczac.*

— — p. 696. t. 6. f. 7. 10.

Phalene à antennes à barbes, ſans trompe; d'un brun pâle, dont les ailes ſupérieures ſont marquées vers leur baſe d'une grande tache obſcure.

Degeer Tom. II. Part. I. p. 309. no. 1.

Phalene à antennes barbues ſans trompe; à corcelet huppé, dont les ailes ſont d'un brun clair à nuances couleur d'agathe, avec une grande plaque ovale nuancée et bordée de brun obſcur ſur les ſupérieures.

Phalene Ziczac à trois tubercules.

— No. 2. Phalene à antennes barbues ſans trompe, à corcelet un peu huppé, d'un brun obſcur, avec des rayes ondées transverſes d'un roux foncé ſur les ailes ſupérieures, et une tache couleur de ſouffre à leur origine.

Phalene Ziczac à cinq tubercules. Tab. 4. f. 17.

Chenille raſe d'un verd jaunâtre *à cinq éminences charnues* en forme de cornes ſur le dos. Tab. 4. f. 13.*)

— Ueberſ. I. 1 Quart. p. 90. t. 6. f. 1-10. die glatte *Weidenraupe* mit drey *Fleiſchhoekern* auf dem Rücken, das *Zickzack* genannt.

— — 4 Quart. p. 118. t. 6. f. 7. 10.

Ein fahlbrauner *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, deſſen Oberflügel am Hinterrande einen groſsen dunklen Fleck haben.

— II Th. 1 B. p. 222. No. 1.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Kammrücken und hellbraunen Flü-

*) Dem Anſchein nach eine bloſse Abänderung von Phal. *Ziczac.*

Flügeln, die eine Schattirung von Achat, und beſonders die Oberflügel ein groſses ſchattirtes, und dunkelbraun gerändeltes Feld haben.

Das *dreyhökrige Zickzack.*

No. 2. t. 4. f. 17.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, und einem kleinen dunkelbraunen Rückenkamm. Die Oberflügel haben dunkelbraune gewäſſerte Queerſtreifen, und bey der Wurzel einen ſchwefelgelben Fleck.

Das *fünfhökrichte Zickzack.*

Die *Raupe*, t. 4. f 13 glatt gelblichgrün, mit *fünf* hörnerförmigen Fleiſchhökern auf dem Rücken.

62. *Dromedarius*, der *Dromedarſpinner.*

Müller l. c. p. 672. no. 62. der *Dromedar.*

Berlin. Magaz. II. p. 416. no. 33.

Phalaena *Dromedaria*, der *Kameelbuckel.*

Die Oberflügel ſchwärzlichgraubraun mit verſchiedenen, theils okergelben graubraunen, theils dunkelgrauen Flecken und Strichen; die Unterflügel weiſsgrau.

Wiener Schmetterl. p. 63. R. no. 7. *Birkenſpinnerraupe* (Betulae albae): *Birkenſpinner;* Ph. B. *Dromedarius.*

Fabric. Syſtem. Entom. App. p. 831. 55 - 56. Nom. *Linn.*

63. *Coſſus*, der *Weidenbohrer* *).

Müller l. c. p. 673. no. 63. der *Holzdieb.*

*) Eins der merkwürdigſten Inſekten. An der Raupe beſondere Eigenſchaften:

1) ſie

Füeßl. schweizer. Inf. p. 36. no. 678. Ph. *Cossus*, der *Holzbohrer*.

Frisch Inf. VII. p. 1. 1 Pl. f. 1.
Von der wurmförmigen Erdraupe und ihrem Papilion.

Berlin. Magaz. II. p. 410. no. 24.
Phal. *Cossus*, der *Weidenbohrer*. Grau und weifs marmorirt; die Unterflügel ganz grau.

Rösels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 113. t. 18.
Die grofse, roth- und fleiſchfarbige *Holzraupe* mit ihrer Verwandlung.

— — p. 120. *Brummvogel.*

Stral.

1) ſie lebt ganz allein von faulem Weidenholze, und hat den widrigſten, penetranteſten Geruch, den man ſich denken kann. S. *Degeer* Ueberſ. I. 1 Quart. p. 31. 32. *Anmerk.*

2) ſie ſpritzt einen ekelhaften Saft von ſich, und beiſst ſtark mit ihren Freſszangen. *Rösel* l. c. p. 117. t. 18. f. 1. a.

3) ſie freſſen ſich unter einander ſelbſt auf, wenn ſie eingeſperrt ſind. *Rösel* l. c. p. 118.

4) ihr innerer Bau ganz bewundernswürdig. Hierüber giebt *Lyonets* eigenes anatomiſches und unnachahmliches Werk von dieſer Raupe die Erklärung. Auſser den Nerven, Luftröhren und andern Gefäſsen

allein für den Kopf	228	*Muskeln.*
für den Körper	1647	— —
für den Magenſchlund, Magen und Gedärme	2186	— —
In allen	4061	*Muskeln.*

S. *Degeer* Ueberſ. I. 1 Qu. p. 10 - 15. *Anmerk.*

5) hat verſchiedene Feinde, als die *Schlupfweſpen* und eine gewiſſe Art *Läuſe*. S. *Börners* Sammlung aus der N. G. etc. I. p. 164. 165. aus *Lyonets* Traité anatom.

6) häutet ſich auf *achtmal*, da ihr Wachsthum langſamer als bey andern Raupen iſt. S. *Stralſ. Mag.* I. p. 236.

7) das Weibchen legt mehr als 1000 Eyer. *Rösel* l. c. p. 120.

Stralſund. Magaz. I. p. 236. Phal. *Coſſus*, *Weidenholzraupe.*

Börners Samml. aus der N. G. etc. I. p. 157. Naturgeſchichte des *Weidenbohrers* (aus *Lyon.* Traité anat.).

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 33. Phal. *Coſſus*, der *Weidenbohrer.*

Wien. Schmetterl. p. 60. *N. Holzraupen*, Larvae *Lignivorae; bleichringigte Spinner;* Ph. B. *Albocinctae.*

1) mit blätterichten Fühlhörnern.

No. 1. *Kopfweidenſpinnerraupe* (Salicis pentandrae etc. *Truncatae*): *Kopfweidenſpinner.* Ph. B. *Coſſus.*

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 73. *Holzraupe; Holzdieb.* Phal. *Coſſus.*

Blumenbachs Handbuch der Nat. p. 371. no. 11. Phal. *Coſſus*, *Weidenraupe.*

Bekmanns phyſ. ökonom. Bibl. VII. p. 293. Phal. *Coſſus* *).

*) Eine ſehr gegründete Anmerkung: „Unmöglich können die Römer die häſslich ſtinkende Raupe dieſer Phaläne als einen Leckerbiſſen gegeſſen haben, ſondern ihre Coſſi müſſen Larven von Käfern oder Holzböcken (Cerambyx) geweſen ſeyn, ſo wie noch in Indien die vom Curculio Palmarum und Cerambyx cervicornis gegeſſen werden. *Plinius* Lib. 17. c. 24. (auf den ſich *Linné* beruft,) ſagt auch deutlich, daſs es Würmer aus *Eichbäumen* geweſen, in welchen man dieſe rothe Raupen nicht findet".

Herr Hofr. *Beireis* hat in einem Progr. de vſu hiſtoriae naturalis bewieſen: daſs die Coſſus der Römer die Larven des *Hirſchkäfers* oder *Feuerſchröters*, Lucanus Cervus *Linn.* geweſen ſind. S. *Leske* Ueberſ. der philoſ. Transact. II. p. 44.

Wenn alſo *Liſter* im *Goedart* p. 108. not. 1. ſagt: Hanc Erucam in Trunco Quercino recens exciſo et in partes ſerra diviſo reperi

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 460. no. 9. Phal. *Coſſus*, der *Holzbohrer.*

— deſſ. Ueberſ. der philoſ. Transact. II. p. 45. Ph. *Coſſus.*

Bekm Epit. S. L. p. 165. no. 63. Phal. *Coſſus.*

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 444. *Coſſus.*

— — P. 6. p. 345. Ph. *Coſſus.*

Liſt. Goed. p. 105. no. 39. f. 39. *Eruca Cancer: Olens hircus.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 150. no. 2.

Phalaena grandis, alis cineraſcentibus, lineolis creberrimis nigricantibus.

— — p. 351. no. 25.

Eruca maxima ſubterranea, raris pilis obſita, ſupina parte tota, excepto capite, rubra, prona flava.

Lyonet ſur Leſſer t. 1. f. 17—22.

— Traité anatomique de la *Chenille*, qui ronge le bois de Saule. à la Haye 4. 1762 *).

Schaeff Icon. t. 61. f. 1. 2.

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 142. no. 4. Le *Coſſus.*

Mouffet Inſ. p. 196. f. 1. *Spondyla* rubra.

Scop. Entom. carn. p. 200. no. 500. Phal. *Coſſus.*

Long. Unc. 1. et lin. 5. *Lat.* $9\frac{1}{2}$.

Thorax antice linea transverſa cerea, poſtice maculis binis nigris lateralibus. *Alae poſticae* murinae, baſi albidae, obſcurioribus anaſtomoſanti-

reperi — ſo iſt es ganz gewiſs nicht dieſe, ſondern eine *Käferlarve* geweſen.

*) Zeugniſſe von dieſem ganz unnachahmlichen Werke ſ. *Blumenbachs* Handb. der Nat. p. 366. *Anmerk. Röſel* l. c. p. 113. *Anmerk. Degeer* Tom. II. Part. I. p. 370. Ouvrage ſurprenant, et un vrai chef-d'œuvre inimitable.

ſantibus lineis reticulatae; *anticae* baſi et medio murinae, alibi albae, utrinque lituris ſtrigisque transverſis nigris lineolisque murinis ramoſisque variegatae.

Fabric. Syſt. Ent. p. 569. no. 48. B. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

Larva ſubpiloſa incarnata, dorſo ſanguineo, capite nigro.

Pupa folliculata, antice brunnea, poſtice flava.

Müllerí Faun. Fridr. p. 40. no. 358. Phal. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1372. Phal. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 102. no. 4.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis albocinereis, ſtriis transverſis nebuloſis nigris; abdomine annulis albis.

Le *Coſſus.*

Long. 15. lign.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 368. no. 1.

Phalene à antennes filiformes feuilletées, ſans trompe, à corcelet huppé, avec une bande noire et un collier blanc, à ailes d'un gris cendré, avec une infinité de veines transverſes noires.

Phalene *Coſſus.*

Chenille raſe luiſante d'un rouge-brun en deſſus, et blanc-jaunâtre en deſſous, avec deux plaques écailleuſes brunes ſur le premier anneau.

— Ueberſ. II Th. I B. p. 268. no. 1.

Eine *Phaläne* mit fadenförmigen geblätterten Fühlhörnern ohne Saugrüſſel, mit ſchwarzgeſtreiftem Rückenkamm und weiſſem Hals-

bande, und aſchgrauen Flügeln mit vielen ſchwarzen Queeradern.

Die *Koſſusphaläne.*

Die *Raupe* glänzend glatt, oben braunroth, unten weiſsgelblich, mit zween hornartigen braunen Flecken auf dem erſten Ringe.

— Etwas von der Oekonomie dieſer *Raupen* und von ihren *Puppen* ib. p. 270. *Anmerk.*

64. *Palpina*, der *Rüſſelſpinner* *).

Müller l. c. p. 673. no. 64. der *Sichelfühler.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 679. Phal. *Palpina*, die *Schnauzmotte.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 85. Phal. *Palpina.*

Berlin. Magaz. II. p. 422. no. 40. Phal. *Palpina*, die *Rüſſelmotte.*

Gelblichgrün, mit etwas dunklerm ſchattirt; an dem innern Rande der Oberflügel drey Spitzen, und am Munde *2 lange Rüſſel.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 743. no. 35. Phal. *Noctua* palpina, die *Rüſſelmotte.*

Wiener Schmetterl. p. 62. G. *Scheinſpannraupen*, Larvae *Geometriformes*; *großzähnichte Spinner;* Ph. B. *Eroſae.*

No. 2. *Weißweidenſpinnerraupe* (Salicis albae): *Weißweidenſpinner:* Ph. B. *Palpina.*

Naturforſcher II. p. 14. t. 1. f. 6. *Fiſchſchwanzmotte*, *Männchen* allein mit dem *Fiſchſchwanz* (D. *Kühn*).

— — VIII. p. 107. no. 40. Phal. *Palpina.*

Das

*) Stellt ſich wie tod an. Giebt kein Gefühl des Lebens von ſich, auch wenn man ſie mit der Nadel aufſpieſst, auſser wenn man ihre *Bartſpitzen* berührt, ſo fängt ſie an zu flattern.

Das *Weibchen* gröſser, grauer, und die Fühlhörner etwas dünner (*von Rottemburg*).

Fabric. Syſt. Entom. p. 575. no. 64. B. *palpina.* Nom. *Linn.*

Larva ſolitaria, nuda, viridis; linea laterali flava.

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 17. t. 4. De *Snuit-Vlinder* *).

Degeer Inſ. I. Mém. II. p. 61. t. 4. f. 7.

— — p. 665. t. 4. f. 7. *Phalene* à antennes à barbes et à trompe; griſe à ailes en toit, dont le corcelet eſt raboteux, et dont les barbillons longs et larges s'avancent en Muſeau.

— Tom. II. Part. I. p. 334. no. 2.

Phalene à antennes barbues à trompe, à corcelet hüppé, à ailes en toit aigu dentelées griſes, dont les barbillons de la tête s'avancent en long muſeau applati.

Phalene à muſeau.

Chenille à ſeize pattes raſe verte, à lignes longitudinales blanches, avec du jaune citron ſur le devant du corps, qui vit ſur le Saule.

— *Ueberſ.* I B. 1 Quart. p. 52. t. 4. f. 7.

— — 4 Quart. p. 117. t. 4. f. 7.

Der graue *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel; dachförmigen Flügeln, hökrichem Bruſtſchilde, und langen, breiten, wie eine Schnauze vorſtehenden Bartſpitzen.

— II Th. 1 B. p. 242. no. 2.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, grauen gezackten, wie ein ſpitziges Dach ſtehenden Flügeln, und langen, wie ein flacher Rüſſel vorſtehenden Bartſpitzen.

*) Die ganze Naturgeſchichte vom Ey an.

Die *Rüſſelphaläne.*

Die *Raupe* ſechzehnfüſsig, grün, glatt, am Vordertheile des Körpers zitrongelb, mit weiſſen längſt laufenden Linien: auf den Sohlweiden.

65. *Arenacea*, der *kapenſiſche Sandflügelſpinner.*

Müller l. c. p. 674. no. 65. der *Sandflügel.*
Catholicon A. p. 462. Phal. *arenacia.*
Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 33. t. 18. f. 1. Ph. *arenacea.*
— du Cap. de B. E.

Les taches noires ſur les ailes ſupérieures, vuës à l'aide du microſcope, paroiſſent comme des écailles dreſſées.

66. *Morio*, der *Mohrenkopfſpinner* *).

Müller l. c. p. 674. no. 66. das *Mohrenköpflein.*
Wien. Schmett. p. 50. C. *Knoſpenraupen*, Larvae *Tuberoſae; nacktflüglichte Spinner*, Phal. B. *Subnudae.*

No. I. *Lülchſpinnerraupe* (Lolii perennis): *Lülchſpinner:* Ph. B. *Morio.*

67. *Purpurea*, der *Purpurbärſpinner.*

Müller l. c. p. 674. no. 67. der *Purpurbär.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 680. der *Purpurbär.*
Wiener Schmetterl. p. 53. E. *Bärenraupen*, Larvae *Urſinae;* ädle *Spinner:* Ph. B. *nobiles.*

3) auf den einfarbigen Oberflügeln ſchwärzliche Fleckchen, Punkte und Striche.

No.

*) *Nicht abgebildet.*

No. 9. *Megerkrautſpinnerraupe* (Galii Molluginis); *Megerkrautſpinner:* B. *purpurea.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 54. no. 148. Ph. *purpurea*, der *gelbe Purpurbär;* der *gelbe S-Bär.*

— — p. 73. no. 207.

— — p. 100. no. 284.

Röſels Inſektenbeluſt. I. N. V. 2 Kl. p. 65. t. 10.

Die ſchnell kriechende hell- und rothgelbe haarige *Raupe* mit weiſsen Flecken.

Naturforſcher VI. p. 75. die ſchnell laufende rare Raupe des gelben *S-Bärs.* Ph. *purpurea.*

Im März und April unter den auf der Erde liegenden Blättern der gemeinen Klette — in ihrem Winterlager. (D. Kühn.)

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 404. Phal. *purpurea*, der *Stachelbeervogel.*

Schaeff. Icon. t. 59. f. 4. 5.

Fabric. Syſt. Ent. p. 580. no. 82. B. *purpurea.* Nom. *Linn.*

Larva hirſuta, griſea, albo-maculata: odorem *Mari veri* ſpargens.

Pupa nuda, brunnea.

Sebae Theſ. IV. t. 59. f. 4. 5.

Geoffr. Inſ. II. p. 105. no. 6.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus flavis, maculis fuſcis; inferioribus rubris, nigro-maculatis.

L' *écaille mouchetée.*

Larg. 23 lign. *Long.* 10 lign.

4. *Gezüngelte Spinner mit glattem Rücken und niedergebogenen Flügeln* (B. ſpirilingues, dorſo laevi, alis deflexis).

68. *Aulica*, die *Hofdame.*

Müller l. c. p. 675. no. 68. t. 22. f. 5. die *Hofdame.* (Die Abbildung eine *Chineſiſche.*)

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 231. p. 226-231. Phal. *aulica* *).

Naturforſcher III. p. 141. t. 1. f. 8.

— — VI. p. 115. t. 5. f. 3.

Wiener Schmetterl. p. 53. E.

2) auf den dunklen Oberflügeln bleiche Makeln (*Guttae*).

No. 6. *Tauſendblattſpinnerraupe* (Achillaeae Millefolii).

La dure-peliſſe. *Goed. Tauſendblattſpinner.* Ph. B. *aulica.*

Catholicon A. p. 651. Ph. *aulica*, die *Hofmotte.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 576. no. 67. B. *aulica.* Nom. *Linn.*

Parva. Alis anticis *maculis quinque*, anteriore longiore.

69. *Lubricipeda*, der *Haſenſpinner* (der *Haſe*)**).

Müller l. c. p. 675. no. 69. der *Glitſchfuß.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 36. no. 981. die *Tigermotte.*

— Magaz. der Entom. II. p. 7. Ph. *Lubricipeda.*

Auf

*) Wo erwieſen wird, daſs die im *Naturforſcher* vom ſel. *Walch* und *Meineke* angebene ſeltene Phaläne keine andere als dieſe *aulica* L. ſey.

**) Weil die Raupe auſserordentlich ſchnell zu laufen pflegt.

Auf den *Zichorienblättern.* Die Raupen pflegen ſich durch die Papierdeckel auf den Gläſern durchzuarbeiten, und die Stelle vorher zu benetzen. (Chorherr *Meyer.*)

Berlin. Magaz. II. p. 412. no. 25. Ph. *lubricipeda alba*, die *Hermelinmotte* *).

Weiſs mit ſchwarzen Punkten.

— — no. 26. Phal. *lubricipeda lutea*, die *Tigermotte.*

Okergelb mit kleinen ſchwarzen Flecken.

Naturforſcher VIII. p. 104. no. 25. 26. Ph. *Lubricipeda alba et lutea* **).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 116. no. 327. Phal. *lubricipeda*, der *Glitſchfuß*, die *Hermelinmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 257. t. 46. die ſchwarz- und ſtreifhaarichte *Raupe* mit dem gelben Rückenſtreif. (Ph. lubr. *alba.*)

— — p. 260. no. 47. die weiſsliche oder hellbraune, haarichte, geknöpfelte und geſtreifte *Raupe.*

(Dies die Phal. lubricipeda *lutea.*)

Friſch Inſ. III. p. 22. no. 11. 2 Pl. t. 8. f. 1-5. Von der *braunhaarichten Neſſel- oder Meldenraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 646. no. 11. Phal. *lubricipeda*, die *Tigermotte* (*lutea*).

Wie-

*) *Hufnagel* hält nach p. 436. L. die folgende no. 26. Ph. *lubricipeda lutea*, die *Tigermotte*, *Röſ.* II. N. V. 2. t. 47. die *Linné* für eine Spielart der erſten anſiehet, für eine beſondere Gattung.

**) Herr von *Rottemb.* iſt der Meynung des *Hufnagels* und *Röſels*, daſs es zweyerley beſondere Arten ſind, indem ſich die weiſsen allezeit mit den weiſsen, die gelben aber mit den gelben gepaart haben. Er hat ſie ferner aus den Eyern gezogen, und unter den weiſsen ſowohl, als gelben, *Männchen und Weibchen* gefunden. Das ſind entſcheidende Beweiſe.

Wiener Schmetterl. p. 54. F. *Haſenraupen*, Larvae *celeripedes*, *gelbfüßige Spinner.* Phal. B. *luteopedes.*

No. 1. *Hollunderſpinnerraupe* (Sambuci nigrae).

La *roulante. Goed.*

Hollunderſpinner. Ph. B. *lubricipeda.*

Glaſer von ſchädlichen Raupen p. 35. *Schnellfüßige Raupe:* Ph. *lubricipeda.*

— Neue verbeſſ. Aufl. 1780 mit *illum. K.* p. 43. Ph. *lubricipeda.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 381. Phal. *lubricipeda.*

Bekm. Epit. Syſt. Linn. p. 165. no. 69. Phal. *lubricipeda.*

Syſtem. Nat. du Regn. anim. II. p. 145. no. 15. *Phalene blanc à points noirs.*

Act. Vpſal. 1736. p. 124. no. 59.

Papilio alis depreſſis albis, punctis nigris, ventre quinque punctorum.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 196. no. 155.

Phalaena media, ex albido ſublutea, alis exterioribus punctis paucis nigris στικτοῖς (*lutea*).

— — p. 195. no. 40. *Phalaena* media pulcherrima, *alba*, alis exterioribus punctis nigris perbelle στικτοῖς.

Réaum. Inſ. II. t. 1. f. 7-9. La *liévre.*

Scop. Entom. carn. p. 208. no. 513. Phal. *lubricipeda.*

Long. lin. 9. *Lat.* 5.

Alba; oculis antennisque nigris, alis deflexis, anticis nigro-punctatis, abdomine ſupra paleaceo, punctorum nigrorum ordinibus quinis.

Fabric. Syſt. Entom. p. 576. no. 68. Bomb. *Lubricipeda.* Nom. *Linn.*

Variat alarum colore et punctorum numero.

Larva

Larva pilosa, fusca, punctis coeruleis lineaque dorsali pallida.

Pupa folliculata, coeruleſcens, stigmatibus rubris.

Geoffr. Inſ. II. p. 118. no. 21.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis, punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum.

La *Phalene - tigre.*

Long. 9 lign.

Müllleri Faun. Fridr. p. 42. no. 374. Ph. *lubricipeda.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1375. Nom. *Linn.*

Variat punctis ſparſis; linea punctorum interrupta transverſa, ac punctis binis, altero remotiore aegre conſpicuo.

Schaeff. Icon. t. 24. f. 8. 9.

— — t. 114. f. 2. 3.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 7. t. 3. f. 2. 3.*)

— de la *nouelle York*, du *Maryland* et de la *Virginie*, où elles engendrent deux fois l'année.

Degeer Inſ. I. Mém. 5. p. 178. t. 11. f. 1-8.

Chenille velue brune, à dix tubercules, qu'on trouve en automne ſur pluſieurs arbres, et qu'on a nommée le *Lievre* ou *Chenille de la Vigne.*

— — p. 696. t. 11. f. 7. 8.

Phalene à antennes à barbes, ſans trompe, à ailes ou blanches, ou d'un jaune clair, à points noirs.

Degeer

*) Dies ſcheinen doch verſchiedene, obgleich ähnliche Arten zu ſeyn: die eine mit weiſsgraulichen, etwas gelblichen, ſchwarzpunktirten Ober- und Unterflügeln; die andere mit ſolchen Ober- aber ganz okergelben Unterflügeln; auf jedem der letztern drey, im Dreyeck ſtehende ſchwarze Punkte.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 304. no. 3.

Phalene à antennes barbues noires ſans trompe, à ailes en toit blanches ou d'un jaune clair, picquées de points noirs, dont le ventre eſt jaune à cinq rangs de points noirs.

Phalene *lievre.*

Chenille très-velue, à tubercules brunes et rouſſes, dont les poils ſont de la même couleur.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. 5te Abh. p. 132. t. 11. f. 1-8.

Die braune rauche *Raupe*, mit zehn Buckeln; im Herbſt auf allerley Bäumen: der *Haſe*, oder die Weinraupe.

— — 4 Quart. p. 118. t. 11. f. 7. 8.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel: entweder mit weiſſen, oder mit hellgelben ſchwarzpunktirten Flügeln.

— — II Th. I B. p. 218. no. 3.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit ſchwarzen bärtigen Fühlhörnern, und dachförmigen, weiſſen oder hellgelben, mit ſchwarzen Punkten geſprenkelten Flügeln; gelbem Körper mit fünf Reihen ſchwarzer Punkte.

Der *Haſe.*

Die *Raupe* haaricht, mit braunen und fuchſichten Knöpfen, deren Haare eben ſolche Farbe haben.

70. *Lota*, der *Schwarzpunkt.*

Müller l. c. p. 675. no. 70. der *Schwarzpunkt.*

Füeßl. Magaz. der Entom. II. p. 9. Phal. *Lota.*

Die ſchwarzgraue *Raupe* mit weiſs- und ſchwarzen Streifen, und weiſslichen Pünktgen.

Wien. Schmetterl. p. 76. L. *Spreckenraupen*, Larvae *Albopunctatae;* geradgeſtrichte *Eulen*, Phalaenae *Noctuae* Rectolineatae.

2) Die

2) Die Raupen bräunlicht.

No. 6. *Waſſerweideneulenraupe* (Salicis pentandrae), *Waſſerweideneule.* Ph. N. *Lota.*

71. *Ruſſula*, der *Rothrand.*

Müller l. c. p. 676. no. 71. der *Rothband.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 682. Phal. *Ruſſula*, der *Rothrand.*

Wien. Schmett. p. 54. E. No. 13. *Apoſtemkrautſpinnerraupe* (Scabioſae arvenſis); *Apoſtemkrautſpinner.* Ph. B. *Ruſſulae.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 228. no. 75.

Phalaena minor, corpore craſſo, e fuſco et rubro diverſicolore; alis exterioribus obſcure rufis ſeu pullis, duobus maculis nigris notatis, interioribus e pullo et rubro variis.

Linn. Syſt. Nat. ed. 10. p. 520. no. 136. Phal. *Vulpinaria.*

— Faun. Suec. ed. 2. no. 1135. Phal. *Sannio.*

Syſt. Natur. du Regn. anim. II. p. 149. no. 28. *Phalene du Gramen ou Chiendent.*

Act. Vpſal. 1736. p. 23. no. 41.

Papilio alis planis fulvis, macula rubente.

Schaeff. Icon. t. 83. f. 4. 5.

Fabric. Syſt. Ent. p. 579. no. 80. B. *Ruſſula.* N. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 129. no. 39.

Phalaena pectinicornis, ſpirilinguis, alis deflexis, pallido-luteis, limbo roſeo, ſuperioribus macula, inferioribus faſcia duplici fuſca.

La *bordure enſanglantée.*

Long. 10 lign.

Scop. Entom. carn. p. 211. no. 520. Phal. *Sannio.*

Alae omnes macula media obſcuriore; anticae ſubtus, poſticae ſupra faſcia fuſca.

4. *Variat.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1389. Phal. *Sannio.* Nom. *Linn.*

β. Phalaena *Ruſſula.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 48. no. 130. Phal. *Ruſſula β.* der *Rothrand.* p. 67. no. 191.

Kleem. Beytr. I. p. 172. t. 20. die kleine überausſchnell laufende, mit braunrothen Haaren, einem gelben Rückenſtreif und ſchwarzen als Kupfer glänzenden Kopfe verſehene Raupe.

Geoffr. II. p. 129. no. 39. N. B.

Il y en a une variété plus petite, qui n'a que ſix lignes de long. Elle eſt beaucoup plus jaune, de couleur de Tabac d' Eſpagne, et reſſemble tout-à-fait à l'autre, mais ſes antennes ſont moins barbues.

72. *Rufina*, der *Rothflügel.*

Müller l. c. p. 676. no. 72. der *Rothflügel.*

Wien. Schmetterl. p. 85. R. *Halsſchildraupen*, Larvae *Scutellatae*, *röthlichbraune Eulen*, Ph. *Noctuae Badiae.*

No. 9. *Loheicheneulenraupe* (Quercus Roboris *Tuberiferae*). *Loheicheneule*, Ph. *Noctua* Rufina.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1142. Phal. *Helvola.*

73. *Graminis*, der *Grasſpinner.*

Müller l. c. p. 676. no. 53. der *Grasmäher.*

Friſch. Inſ. X. p. 24. no. 21. 3 Pl. t. 21. f. 1. 2. 3. Von einer grauen *Erdraupe*, die nur vier Rückenknöpfe und den Seitenſpiegel hat.

Allgem. Magaz. der Natur etc. IX. p. 328. §. 3. *Wieſenlarven; Wieſenwürmer* *).

Ab-

*) Ihretwegen thörichte Gottesdienſte gefeyert: zu Anfang des Som-

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. IV. p. 51.
Abr. *Becks* Beſchr. der *Grasraupen* t. 2. f. A-E.
— — XII. p. 185.
— — XX. p. 48. *Grasraupen.*
Wiener Schmetterl. p. 81. O. *Breitſtreifraupen*, Larvae *Largoſtriatae*, *jaſpisfarbige Eulen.* Phal. *Noctuae* venoſae.

2) Graulicht mit weiſſen Linien.

No. 3. *Futtergraseulenraupe* (Poae pratenſis); *Futtergraseule.* Phal. *Noctua* Graminis.

Naturforſcher VIII. p. 105. no. 27.

Dieſe Ph. *graminis* (*Berl. Magaz.* II. p. 412. no. 27. Ph. *graminis*, der *Grasmäher*) iſt nicht *Linn.* Ph. *gram.* ſondern deſſen Ph. Noct. *Mi.* No. 106.
Fiſchers N. G. von Livland, p. 152. no. 358. der *Grasmäher.*
Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 373. Ph. *graminis*, der *ſchädliche Grasraupenvogel.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. no. 826. Phal. *calamitoſa.*
Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 73. Phal. *graminis.*
— Phyſik. ökon. Bibl. II. p. 313. Phal. *graminis.* Die *Krähen* (Cornix) verzehren die Raupen. S. *Hannov. Magaz.* 1767. St. 39.
Syſt. Nat. du Regn. anim. II. p. 146. no. 17. *Phalene* de la Chenille, que l'on trouve ſur la Tithymale.
Act. Vpſal. 1736. p. 25. n. 75.

Sommers Buſs- und Bettage, um Johannis Dankfeſte, da ſie weg waren. Das war ihre Verwandlungszeit. S. *Neue Mannichfalt.* I Jahrg. p. 303-316. 319-334. vom *Aberglauben* in der Naturgeſchichte. *Martini* Naturlex. I. p. 92.

Papilio alis depreſſis fuſcis, faſcia pallida longitudinali ramoſa, ſubtus puncto nigro notatis.

Cathol. G. p. 235. *Chenille* du *Gramen*, die *Grasraupe;* der *Grasmäher:* Ph. *Graminis.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 228. no. 104.

Phalaena e minoribus majuscula, alis oblongis, exterioribus e cinereo albicantibus, nigris punctis et maculis variis, et linea alba tridente in medio.

Fabric. Syſt. entom. p. 586. no. 106. B. *Graminis.* Nom. *Linn.*

Otto *Fabric.* Faun. Groenland. *) Hafn. et Lipſ. 8. 1780. p. 193. no. 144. Phal. *Graminis.* Nom. *Linn.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 42. no. 375. Phal. *graminis.* ſpirilinguis, alis depreſſis griſeis; *linea ramoſa lunulaque glaucis.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1376. Phal. *graminis.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. II. Part I. p. 340. no. 5. *Phalene* à antennes barbues à trompe, à ailes rabatues d'un gris brun, avec une raye longitudinale branchue blancheâtre, et trois taches jaunâtres ſur les ſupérieures.

Phalene de l' herbe.

Chenille

*) Magna copia 1778 omne gramen conſumſit in ſinu dicto *Angmakſivik* e regione boreali Coloniae Friderichshaab. Omni conſumto, ſe in mare et aquas propinquas plures praecipitarunt. *Groenlandi* illas faſtidientes, dum tentoria illorum intrant metamorphoſeos gratia, pellere conantur incendio graminis, illis nulli uſui.

Eines der herrlichſten Werke zur Naturgeſchichte, worinn das *Wurmgeſchlecht* vorzüglich bereichert iſt.

Chenille raſe d'un gris obſcur, avec une raye jaune de chaque côté du corps et une ligne jaune le long du dos.

Degeer Ueberſ. I. 1 Qu. p. 42. *Anm.* Phal. *graminis.*

— — II Th. 1 B. p. 39. *Anm.* Phal *graminis.*

— — — p. 247. no. 5.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und graubraunen herabhangenden Flügeln mit einer weiſslichen längſtgehenden äſtigen Streife, und drey gelblichen Flecken auf den Oberflügeln.

Die *Grasmotte.*

Die *Raupe* glatt, dunkelgrau, mit einer gelben Streife auf jeder Seite, und einer gelben längſt dem Rücken gehenden Linie.

74. *Luſoria*, die *Spielart.*

Müller l. c. p. 676. no. 74. die *Spielart.*

Wiener Schmetterl. p. 94. Aa. *Schlangenraupen*, Larvae *Serpentinae*, *ſpannerförmige Eulen*; Ph. *Noctuae* Geometriformes.

1) Mit einer ſchwärzlichen unvollkommenen Mondmakel auf den Oberflügeln.

a) Mit einigem Anfange von allen Bauchfüſsen.

No. 2. *Lekritzwickeneulenraupe* (Aſtragali Glycyphylli); *Lekritzwickeneule.* Phal. *Noctua* Luſoria.

75. *Grammica*, der *Streifflügel.*

Müller l. c. p. 677. no. 75. der *Streifflügel.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 683. Phal. *grammica.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 23. no. 84. Ph. *grammica*, der *Streifflügel.*

Berlin. Magaz. II. p. 418. no. 34. Phal. *grammica*, das *Eichhörnchen.*

Die Oberflügel gelb mit ſchwarzen Streifen der Länge nach. Die Unterflügel oraniengelb mit einem breiten ſchwarzen Rande.

Naturforſcher VIII. p. 106. no. 34. Ph. *grammica.* Die *Weibchen ſehr rar.*

Röſels Inſektenbeluſt. IV. p. 150. t. 21. f. a b c d. das *Männchen.*

Die kleine ſchwarzbraune und kurzhaarichte Raupe, mit dem rothgelben Rückenſtreif, und einer weiſſen Einfaſſung an jeder Seite.

Wiener Schmetterl. p. 54. E. no. 12. *Schwingelſpinnerraupe* (Feſtucae duriuſculae); *Schwingelſpinner*, Ph. B. *Grammica.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 169. n. 28.

Phalaena media pulla, corpore et alis valde longis et anguſtis.

— — p. 280. no. 13. *Eruca* coeruleo-viridis glabra, linea alba in medio dorſo a capite ad caudam ſecundum longitudinem decurrente, lutea in utroque latere hinc inde ſupra pedes.

Fabric. Syſt. Ent. p. 579. no. 81. B. *grammica.* Nom. *Linn.*

Larva fuſca, linea dorſali alba, pedibus rufis.

Pupa nuda, brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 115. no. 17.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus faſciis pallido-flavis nigrisque alternis longitudinalibus, inferioribus croceis faſcia marginali nigra.

La *Phalene chouette.*

Long. 5-7 lign.

Schaeff. Icon. t. 92. f. 2.

ß) Pha-

β) Phalaena ſtriata.
Linn. Syſt. Nat. ed. 10. p. 502. no. 31.

76. *Cribrum*, der *Siebflügel.*

Müller l. c. p. 677. no. 76. der *Siebflügel.*
Wien. Schmett. p. 68. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen*, Phal. *Noctuae* Tineiformes.
No. 8. Unbekannte Raupe, *Weiſſe ſchwarzpunktirte Eule.* Ph. *Noctua* Cribrum.
Le *Manteau à points. Geoffr.*
Fiſchers N. G. von Livland, p. 152. no. 359. das *Sieb.*
Fabric. Syſt. Ent. p. 588. no. 112. B. *Cribrum.* Nom.
Linn. Anus flaveſcens.
Geoffr. Inſ. II. p. 190. no. 21.
Taenia alis argenteis, corpori circumvolutis, faſcia duplici transverſa punctorum nigrorum.
Le *Manteau à points.*
Long. 8 lign.
Réaum. I. t. 38. f. 7. 8. 9.

5. *Kammſauger* (*Bombyces* ſpirilingues, dorſo criſtato, alis deflexis).

77. *Celſia*, das *Roßkreuz.*

Müller l. c. p. 677. no. 77. das *Roßkreuz.*
Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 247.
Phal. *Celſia*, *Roßkreuz.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1141. t. 2. f. 1141. (umſtändl. Beſchr.)
Syſt. Nat. du Regn. anim. II. p. 143. no. 8. *Phalaena* pectinicornis, alis ſupra viridibus, faſcia transverſali ſinuato-dentata glauca.

78. *Libatrix*, der *Näſcher* *).

Müller l. c. p. 677. no. 78. der *Näſcher.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 684.
Die *Sturmhaube.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 10. Phal. *Libatrix.* (Einige Merkwürdigkeiten bey der Verwandlung. Chorh. *Meyer.*) **)

Berlin. Magaz. II. p. 414. no. 28. Phal. *Libatrix*, die *Sturmhaube.*
Theils oraniengelb, theils braunroth mit 2 weiſſen Queerſtreifen, und ſtark ausgezakten und ausgeſchwungenen Flügeln.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 31. Phal. *Libatrix*, die *Sturmhaube.*

Wien. Schmetterl. p. 62. Q. No. 1. *Dotterweidenſpinnerraupe* (Salicis vitellinae); *Dotterweidenſpinner.* Ph. B. *Libatrix.*

Sulzers Geſchichte der Inſ. p. 160. t. 21. f. 7. Ph. *Libatrix*, die *Sturmhaube.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 10. *Dotterweidenſpinner.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 78. Phal. *Libatrix.*

Syſt. Nat. du Regn. anim. II. p. 148. no. 24. Phalene *Libatrix.*

Act. Vpſal. 1736. p. 25. no. 63.
Papilio alis depreſſis eroſis, croceo-rufis.

Schaeff. Icon. t. 124. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 209. no. 516. Phal. *Libatrix.*
Long. lin. 9. *Lat.* 5.
Alae *anticae* cervinae, baſi maculis 4 ochreaceis: media longa prismatica: faſciis binis linearibus

*) Wohnet gern in *Kellern* und dunklen Speiſekammern.

**) Hält die *Röſelſche*, IV. t. 20, welche der Staatsr. *Müller* modeſtam nennet, mit dieſer Libatrix für einerley.

aribus pallidioribus: poſtica duplici, punctis duobus albis, margine externo denticulato, ita ut diſtantia apicis a primo dente eadem ſit, quae ab eodem dente ad angulum poſticum.

Fabric. Syſt. Ent. p. 604. no. 62. *Noctua* Libatrix. Nom. *Linn.*

Larva nuda, viridis, flavo-annulata; lineis tribus fuſcis ſtigmatibusque rubris.

Pupa folliculata, nigra.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 183. no. 2.

Phalaena media, domeſtica, alis exterioribus rubro, rufo, cinereo et albicante colore variis, cum transverſa linea albicante, imo margine laciniato.

Poda Muſ. graec. p. 92. t. 2. f. 9. Phal. *Salictaria.*

Müller Faun. Frider. p. 42. no. 377. Ph. *Libatrix.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1377. Phal. *Libatrix.*

— Strigis obliquis tribus, poſtica pallida — cet. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 121. no. 26.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis cinereo-flavoque rufis, margine laceris.

La *Découpure.*

Long. 10 lign.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 332. no. 1. t. 5. f. 5.

Phalene à antennes barbues ſans trompe, à corcelet huppé, à ailes découpées voutées griſes nuancées d'orange, avec deux lignes blancheatres, et deux points blancs.

Phalene friande.

Chenille à 16 pattes, raſe, veloutée, verte, à deux lignes longitudinales noires bordées de blanc. f. 3.

Degeer Inſ. *Ueberſ.* II Th. I B. p. 240. no. 1. t. 5. f. 5.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, mit einem Kamm auf dem Bruſtſchilde, mit ausgezackten, gewölbten, grauen, orangegelbſchattirten, mit zwo weiſslichen Linien, und zween weiſſen Punkten bezeichneten Flügeln.

Der *Näſcher.*

Die *Raupe* ſechzehnfüſsig, glatt, ſammetgrün, mit zwo längſtherunterlaufenden ſchwarzen, weiſsgerändelten Linien. f. 3.

79. *Capucina,* der *Kapuzinerſpinner* *).

Müller l. c. p. 678. no. 79. der *Kapuziner.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 685. der *Kapuziner.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 32. Phal. *Capucina,* die *Kapuzinermotte.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 43. die *Kapuzinermotte.*

Wien. Schmetterl. p. 63. R.

1) Die Raupen unrichtige Höker, vornämlich auf dem eilften Ringe.

No. 4. *Bachweidenſpinnerraupe* (Salicis vitellinae); *Bachweidenſpinner.* Ph. B. *Capucina.*

Fabric. Syſt. Entom. p. 575. no. 65. B. *Capucina.* Nom. *Linn.*

80. *Camelina*, der *Kameelſpinner.*

Müller l. c. p. 678. no. 80. t. 22. f. 6. der *Kronenvogel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 686. der *Flügelzehe.* *Füeßl.*

*) *Nicht abgebildet.*

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 11. Phal. *Camelina.*

Häufig und allemal auf *Erlen.* Die *seltsame Stellung* s. *Réaum.* II. t. 20. f. 10. 11. *Sepp* I. t. 1. f. 2. 7. 10. hat *Röſel* nicht angemerkt. (Chorherr *Meyer.*)

Berlin. Magaz. II. p. 414. no. 29. Phal. *Camelina*, die *Kameelmotte.*

Gelbbraun, mit ſtark ausgezackten Oberflügeln, in deren Mitte ein weiſser Punkt und eine Kappe über dem Kopfe; ingleichen eine Spitze am Rande der Oberflügel.

Röſels Inſektenbel. I. N.V. 2 Kl. p. 164. t. 28.

Die meergrüne, glatte, mit einzelnen Härchen beſetzte, und auf dem hinterſten Abſatze mit zwey rothen Stacheln verſehene *Raupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 389. no. 5. Phal. *Camelina*, die *Kameelmotte.*

Wien. Schmetterl. p. 63. R. no. 3. *Erlenſpinnerraupe* (Betulae Alni); *Erlenſpinner.* Phal. *Camelina.*

La Crête de Coq. *Geoffr.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 335. Phal. *Camelina*, der *Kameelvogel.*

Fabric. Syſt. Entom. p. 575. no. 66. B. *Camelina.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, vireſcens, corniculis duobus caudalibus, ſtigmatibus purpureis.

Pupa folliculata, antice brunnea, poſtice fuſca.

Geoffr. Inſ. II. p. 111. no. 12. *Phalaena* pectinicornis elinguis, pallido-rufa, criſta dorſali nigra.

La *crête de coq.*

Long. 8 lign.

Mül-

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1378. Phal. *Camelina.* Nom. *Linn.*

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 1. t. 1. f. 1-10. *Kroon-Vogeltje.*

81. Oo, das *doppelte O.*

Müller l. c. p. 678. no. 81. die *Nullnull.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 687. das *doppelte O.*

Berlin. Mag. II. p. 414. no. 30. Phal. *O o*, das *doppelte O.*

Weiſsgrau, mit röthlichen Zeichnungen auf den Oberflügeln, welche unter andern zwey *O* vorſtellen.

Maders (Kleemanns) Raupenkalender, p. 17. no. 25. Phal. O o, das *doppelte O.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 311. t. 63.

Die glatte, braunrothe, mit beſondern weiſſen Flecken gezierte, ſchwarzköpfige *Raupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 647. no. 12. Phal. Oo, das *doppelte O.*

Wiener Schmetterl. p. 87. T. *Mordraupen*, Larvae *Larvicidae; gewäſſerte Eulen.* Phal. *Noctuae* undatae.

1) Die Oberflügel gelblicht.

No. 1. *Viereicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Viereicheneule.* Phal. *Noctua* O o.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 390. Phal. O o.

Fabric. Syſt. Ent. p. 575. no. 63. B. *Oo.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, rubra; punctis lineisque albis, dorſali interrupta, capite nigro.

Pupa nuda rubra, ſtigmatibus albis.

Unab-

Unabgebildete Spinner.

(Bombyces.)

1. No. 60. *Dictaea.*
2. No. 66. *Morio.*
3. No. 79. *Capucina.*

Neue Arten von Spinnern *).

Phal. *Bombyces.*

1. Ph. BOMB. *Diaphana*, der *durchſichtige Spinner.*

Seligm. ausl. Vögel, II B. t. 70.

Corpus craſſum; colore glauco, ſtriga longitudinali, quatuorque transverſis flavis, tribusque alternantibus atris. Abdomine binis flavis lunulis lateralibus. Alae *hyalinae*, Tipuliformes, vero ſenſu *alepidopterae.*

2. *Porcellanea*, der *Porzellanſpinner.*

Berlin. Magaz. II. p. 420. no. 38.

Albo-griſea; margine interiore toto, anteriore ſemifuſco.

3. *Veſtigialis*, der *Erdläufer.*

Berlin. Magaz. II. p. 422. no. 42.

Albogriſea; alis *anticis* fuſco-maculatis; *poſticis* albogriſeis concoloribus.

Naturforſcher VIII. p. 107. no. 43.

Ph. *Veſtigialis.* Statura Phal. Chryſorrhoeae (vom Hrn. *von Rottemburg* umſtändlicher beſchrieben).

4. *Pu-*

*) Ich habe bloſs die allgemeine *Klaſſe*: Spinner oder Bombyx, beybehalten, ohne mich auf die beſondern Eintheilungen des *Linné* einzulaſſen.

4. *Putris*, der *Einſiedler.*

Berlin. Magaz. II. p. 424. no. 44.
Obſcure griſea, virideſcens, fuſco-ſparſim maculata.

Naturforſcher VIII. p. 108. Ph. *Putris.*
Nicht *Putris* L. (vom Hn. v. *Rottemb.* umſtändlich beſchrieben).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 651. no. 26. Phal. *Putris*, der *Einſiedler.*

5. *Clavis*, die *Nagelmotte.*

Berlin. Magaz. II. p. 426. no. 47.
Griſea; anticarum macula fuſca *Reni*-ſ. *Claviformi.*

Naturforſcher VIII. p. 109. no. 47. Phal. *Clavis.*
(Hr. *von Rottemb.* macht es wahrſcheinlich, daſs dieſe Clavis eine beſondere Gattung, und nicht das Weibchen von der in dem folgenden von *Hufnagel* angeführten Phal. *Clavus* oder *Exclamationis* Linn. ſey.)

6. *Gibboſa*, der *Buckelſpinner.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 39. no. 355.
Criſtata; alis griſeis nigro-punctatis, ſtriga maculisque flavis; *tergo* tuberculis duobus.

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1374. Ph. *gibboſa.*
In *Pruno ſpinoſo.*

7. *L nigrum*, der *ſchwarze L-Spinner.*

Mülleri Faun. Frid. p. 40. no. 360. Elinguis, criſtata: *alis* candido-pellucidis: primoribus littera *L nigra.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1373. Ph. *L nigrum.*
In *pratis.*

8. *Mo-*

8. *Modeſta*, der *ſanftfarbige Spinner.*

Mülleri Faun. Frid. p. 42. no. 378.
Alis eroſis flavo-rubentibus; ſtrigis obliquis tribus, poſtica pallida, punctisque duobus albis. In *Salice.*
— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1377.*)
Röſels Inſektenbel. IV. p. 141. t. 20. die ſchöne gelblichtgrüne *Raupe* des Weidenbaums.

9. *Similis*, der *Schwan.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 35. no. 662.
Auf den *Schwarzdornen* und Obſtbäumen ziemlich gemein; lebt niemals geſellſchaftlich unter einem Geſpinnſt, wie die Chryſorrhoea und andere.
— Magaz. der Entomol. I. p. 287. Phal. *Similis*, der *Schwan.*
Die Raupen *häuten* ſich öfter als irgend eine bekannte Art. (Chorh. *Meyer.*)
Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 101. no. 287. p. 111. no. 310. Phal. *Similis*, der *Schwan.*
Friſch Inſ. III. t. 1? **).
Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 134. t. 21. die kleine, haarige, ſchwarze, rothgeſtreifte und weiſsgefleckte *Raupe.*

10. *Sphinx*, der *Storch.*

Berlin. Magaz. III. p. 406. no. 75. Schwärzlich grau, flammicht gezeichnet.

Na-

*) Dem Anſchein nach ſeine Meynung geändert, und mit *Libatrix* L. für einerley gehalten.

**) Dies Zitatum hat Hr. *Füeßl.* nur fragweiſe geſetzt, und es trifft auch nicht zu.

Naturforscher IX. p. 133. no. 75. Ph. *Sphinx* — keine Noctua, sondern ein *Bombyx*.

Rösels Insektenbel. III. p. 239. t. 40. f. 1-5. Die auf Eichen und Linden sich aufhaltende blafsgrüne *Raupe*, mit vier gelben, und einer weifsen Linie, an welcher der letzte Abfatz mehr als die übrigen erhöhet ist.

11. *Australasiae*, der *neuholländische groſsbärtige Spinner*.

Fabric. Syst. Ent. p. 562. no. 22. Bomb. *Australasiae*.

Alis reversis *helvolis:* posticis basi subtus ferrugineis.

Palpi magni, valde compressi, obtusissimi.

12. *Stigma*, der *südamerikanische weifspunktirte Spinner*.

Fabric. S. E. p. 563. no. 25. B. *Stigma*.

Alis reversis, testaceis, fusco-irroratis, *puncto centrali niveo*.

13. *Amphimene*, der *südländische braunpunktirte Spinner*.

Fabric. S. E. p. 563. no. 27. B. *Amphimene*. — In *Terra del Fuego*.

Alis subreversis, integris, cinerascentibus; strigis duabus nigris; *anticis puncto medio fulvo*.

14. *Ocularia*, der *südamerikanische Augenspinner*.

Fabric. S. E. p. 564. no. 29. B. *ocularia. Magna*.

Alis subreversis albis: *punctis ocellaribus* nigris numerosis.

15. *Hibi-*

15. *Hibiſci*, der *oſtindianiſche Ibiſch-Ketmiaſpinner.*

Fabric. S. E. p. 564. no. 30. B. *Hibiſci.*

Alis ſubreverſis concoloribus luteis; anticis ſtrigis duabus, poſticis unica.

16. *Ceraſi*, der *engliſche Kirſchenſpinner.*

Fabric. S. E. p. 564. no. 31. B. *Ceraſi.*

Alis reverſis luteis, ſtrigis duabus punctoque medio fuſcis poſticoque albo.

17. *Lagopus*, der *chineſiſche ſtreckfüßige Spinner.*

Fabric. S. E. p. 568. no. 45. B. *Lagopus.*

Alis deflexis flaveſcentibus; atomis ſtrigisque duabus fuſcis; *pedibus anticis porrectis* hirſutiſſimis.

18. *Imperialis*, der *indianiſche Kaiſerſpinner.*

Fabric. S. E. p. 569. no. 46. B. *Imperialis.*

Alis flavis fuſco-maculatis, omnibus macula ſubocellari ferruginea.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 17. t. 9. f. 1. 2.

Il déploye ſes ailes environ *quatre pouces et trois quarts.* — de la *Nouvelle York.* Ils engendrent *deux fois* l'année: en Juin et Septembre.

19. *Craſſicornis*, der *indianiſche dickhornichte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 569. no. 47. B. *Craſſicornis.*

Alis deflexis cinereis: atomis ſtrigisque undatis fuſcis.

Antennis pectinatis, flexuoſis, *baſi craſſiſſimis*, apice tenuioribus.

20. *Dione*, die *amerikaniſche Dione.*

Fabric. S. E. p. 572. no. 54. B. *Dione.*

Alis deflexis albis, nigro-ſtriatis, punctatisque, ſubtus margine purpureo.

21. *Alphaea*, die *neuholländiſche braune Punktſtreife.*

Fabric. S. E. p. 573. no. 57. B. *Alphaea.*

Alis deflexis ferrugineis; puncto medio albo ſtrigaque punctata fuſca.

22. *Flava*, der *indianiſche Gelbling.*

Fabric. S. E. p. 574. no. 59. B. *flava.*

Alis deflexis *flaviſſimis;* apice punctis tribus nigris.

23. *Lutea*, der *neuholländiſche leimfarbige Spinner.*

Fabric. S. E. p. 574. no. 60. B. *Lutea.*

Alis deflexis, flaviſſimis, immaculatis.

24. *Laeta*, der *ſchwediſche Weißling.*

Fabric. S. E. p. 576. no. 69. B. *Laeta.*

Alis deflexis; *anticis niveis*, faſcia lata nigra; antennis ſimplicibus.

25. *Milhauſeri*, der *dresdenſche braungefleckte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 70. B. *Milhauſeri.*

Alis deflexis, canis; *maculis duabus dorſalibus fuſcis;* antennis apice ſetaceis.

Larva viridis, *ſpinis dorſalibus furcatis;* pedibus ſubcaudalibus nullis.

Pupa folliculata, brunnea, antice acuminato-emarginata.

26. *Popularis*, der *deutſche Landmann.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 71. B. *popularis.*

Alis deflexis, fuſcis, albo-ſtriatis; *ſtigmatibus albis, pupilla brunnea.*

27. *Stri-*

27. *Strigula*, der *dresdenſche Streifling.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 72. B. *Strigula.*
Alis deflexis; *anticis* griſeis apice albo-nigroque ſtriatis.

28. *V nigrum*, das *ſächſiſche ſchwarze V.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 73. B. *V nigrum.* In Saxoniae *tilia.*
Alis deflexis, albis, *V nigro* notatis.
Larva faſciculata; faſciculis dorſalibus octo, anticis poſticisque albis, collari hirſutiſſimo.
Pupa viridis, macula thoracis nigra.

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 86. no. 3. Bomb. *V nigrum.*

Naturforſcher II. p. 16. §. 6. no. 1. t. 1. f. 1. (D. *Kühn.*)
Eine *weißgrüne Phaläne* zu Ende des Junius, aus einer weiſsbuſchichten Raupe auf den *Linden.* Sie unterſcheidet ſich beſonders durch *zwey ſchwarze Haken* auf den Oberflügeln, und durch die ſchwarzgefleckten Füſse.
— XII. p. 56. (*Walch*) *Raupe* t. 1. f. 8. *Puppe* t. 1. f. 9. 10.

29. *Tibialis*, der *neuholländiſche gelbſchenklichte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 578. no. 76. B. *tibialis.*
Alis deflexis niveis; *tibiis anticis flaveſcentibus*, nigro-punctatis.

30. *Obſoleta*, der *neuholländiſche verwiſchte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 579. no. 77. B. *obſoleta.*
Alis deflexis, albidis; coſta palpisque ferrugineis.

31. *Corones*, der *neuholländiſche Blutmund.*

Fabric. S. E. p. 579. no. 78. B. *Corones.*
Alis deflexis; *anticis* cinereis, *poſticis* niveis — *ore ſubſanguineo.*

32. *Feſtiva*, der *amerikaniſche Staatsſpinner.*

Fabric. S. E. p. 579. no. 79. B. *Feſtiva.*
Alis deflexis, flaveſcentibus, baſi coeruleo-maculatis, apice nigro-punctatis.

33. *Vidua*, die *engliſche Wittwe.*

Fabric. S. E. p. 580. no. 84. B. *Vidua.*
Alis deflexis fuſcis; *anticis* cinereo-ſubfaſciatis; *poſticis* macula baſeos faſciaque rufis.

34. *Deflorata*, die *amerikaniſche Schwarzſtirn.*

Fabric. S. E. p. 582. no. 89. B. *deflorata.*
Alis deflexis, albis, nigro-maculatis; *poſticis* ſubtus atris, faſciis albis.

35. *Crotalariae*, der *oſtindiſche Klapperſchotenſpinner.*

Fabric. S. E. p. 583. no. 90. B. *Crotalariae.*
Alis incumbentibus; *anticis* purpuraſcentibus, maculis ocellaribus atris; *poſticis* rubris, nigro-maculatis.

36. *Ricini*, der *oſtindiſche Wunderbaumſpinner.*

Fabric. S. E. p. 583. no. 91. B. *Ricini.*
Alis incumbentibus, obſcuris, maculis numeroſis ſubocellaribus, fuſcis, poſticis rubris, nigro-maculatis.

37. *Credula*, der *amerikaniſche Blutfleck.*

Fabric. S. E. p. 584. no. 94. B. *Credula.*

Alis

Alis incumbentibus, corporeque atris, albo-punctatis. — *Macula oblonga ſanguinea* punctis duobus nigris ad baſin alae *anticae* *).

38. *Jeſuita*, der *indianiſche Jeſuit.*

Fabric. S. E. p. 586. no. 104. B. *Jeſuita.*

Alis incumbentibus atris, ſtria fulva.

39. *Veſtita*, das *ſächſiſche Haarkleid.*

Fabric. S. E. p. 586. no. 105. B. *veſtita.*

Alis incumbentibus nigris immaculatis, *abdomine ſubtus villoſo*, albo. In *Saxoniae Corylo.*

Larva griſea, nigro-punctata, degit intra cylindrum e graminibus aridis filo conuexis conſtructum, quem foliis adfigit.

40. *Glorioſae*, der *oſtindiſche Prachtlilienſpinner.*

Fabric. S. E. p. 587. no. 40. B. *Glorioſae.*

Alis incumbentibus atris, rubro-flavoque variegatis; *poſticis* nigris, margine flavo.

41. *Crini*, der *oſtindiſche Liliennarciſſenſpinner.*

Fabric. S. E. p. 587. no. 108. B. *Crini.*

Alis incumbentibus atris, ante marginem ſubferrugineis; poſticis albis.

42. *Roſea*, der *roſenflüglichte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 587. no. 109. B. *roſea.*

*) Hier folgt im *Fabric.* no. 100. B. *Pylotis*, wobey Drury II. t. 6. f. 3. angeführt, und ihr der Name Phal. *Pylotis* beygelegt iſt; allein im *Drury* ſelbſt iſt ſie Phal. *Noctua Aſtrea* genannt: mithin ſcheint es wohl eine Verwechſelung zu ſeyn, da kurz vorher t. 5. f. 3. Phal. *Bomb. Pylotis* ſtehet, den *Fabric.* aber ſchon unter ſeinen Zygaenis p. 554. no. 19. aufgeſtellet hat.

Denn

Alis incumbentibus *roſeis*, ſtrigis tribus fuſcis, ſecunda undata, tertia punctata.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 227. no. 86.

Phalaena minor, alis velut miniaceis, punctis et lineolis nigris in medio notatis.

Geoffr. Inſ. II. p. 121. no. 25.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, roſeis; ſuperioribus punctorum arcuumque nigrorum ordine duplici.

La *Roſette.*

Long. 6 lign.

Forſteri Nov. ſpec. Inſ. p. 75. no. 75. Phal. GEOMETRA *) *Miniata.*

Seticornis, alis rotundatis, *omnibus pallide miniatis*, anticis linea undata ad baſin, characteribus in medio et punctis verſus marginem poſticum nigris.

In *Quercetis Angliae.*

Harris Inſ. t. 30. f. p.

Wiener Schmetterl. p. 68. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen*, Ph. *Noct. tineiformes.*

No. 10. Unbekannte *Raupe; fleiſchfarbene rothgerändelte Eule*, Ph. *Noct. Rubicunda.*

43. *Sulphurea*, der *ſchwefelgelbe Spinner.*

Fabric. Gen. Inſ. c. Mant. p. 279. 60·61. B. *Sulphurea.*

Alis deflexis flaviſſimis, ſtrigis duabus obliquis obſcurioribus.

44. *Gno-*

Denn dieſe Phalaena *Aſtrea* iſt offenbar eine Noctua, obgleich die vom Fabricio gegebene Beſchreibung richtig zutrifft.

*) Da die Schriftſteller wegen dieſer Phaläne ſo uneins ſind, und ſie der eine unter die *Bombyces*, der andere unter die *Noctuas*, der dritte unter die *Geometras* rechnet, ſo ſind wir bey dem Fabric. geblieben.

44. *Gnoma*, der *Haubenſpinner.*

Fabric. Mant. p. 279. 64-65. B. *Gnoma. Hamburgi.*
Alis deflexis ſubdentatis cinereo-albis; *vitta marginali atra* macula alba.

45. *Compreſſa*, der *Weißmond.*

Fabric. Mant. p. 279. 69-70. B. *compreſſa.*
Alis compreſſo-adſcendentibus niveis, macula communi fuſca, centrali griſea; *lunula alba.*
Naturforſch. XIII. p. 27. t. 3. f. 4. a. f. 4. b. Phal. *Geometra modeſta.*
Seticornis, antrorſum alis ſuperioribus dilute cinereis, macula fuſca nigro-punctata, inferioribus cinereis unicoloribus.
(Dieſe Phal. iſt die Phal. *compreſſa* Fabric. Mant. 1. *Walch.*)

46. *Colon*, der *Kolonſpinner.*

Fabric. Mant. p. 281. 95-96. B. *Colon.*
Alis incumbentibus griſeo-fuſcis, punctis duobus nigris diſtantibus.

47. *Annulata*, der *Weißringel.*

Fabric. Mant. p. 281. 106-7. B. *annulata.*
Alis incumbentibus, atris, niveo-maculatis; *tibiis* albo-annulatis.

48. *Fulminea*, die *Braunſchecke.*

Fabric. Mant. p. 282. 106-7. B. *fulminea.*
Alis incumbentibus griſeo-fuſcoque variegatis; thorace antice albo ſtriga nigra.
Naturforſcher XIII. p. 29. t. 3. f. 6. a. b. Phal. *Noctua* nebuloſa.
Antrorſum alis ſuperioribus fuſcis nebuloſe maculatis, inferioribus dilute cinereo-fuſcis, re-

trorſum alis unicoloribus dilute fuſcis leviſſime virideſcentibus, nigro puncto in medio fere notatis.

(Dies Ph. *fulminea* Fabric. Mant. 1. *Walch.*)

49. *Praelata*, der *Prälat.*

Scop. Entom. carn. p. 198. no. 494.

Long. lin. $9\frac{1}{2}$. *Lat.* $4\frac{1}{3}$.

Alba; alis politis; abdominis apice barbato; tibiis fuſcis, albo-annulatis. In *Salice.*

Subelinguis, corpore nigro, ſed albis villis undique tecto. Antennae foeminae ſetaceae, albidae.

Hoc poſui, ut diſtinguatur a *Chryſorrhoea* et *Salicis.*

50. *Pyri*, der *Birnſpinner.*

Scop. Ent. carn. p. 199. no. 498.

Long. lin. $7\frac{1}{2}$. *Lat.* 5.

Cinnamomea; dorſo tomentoſo; alis *anticis* ſupra ſtrigis duabus pallidioribus; *poſticis* ſubtus limbo pallidiore.

In *Pyro* larva reperta et in foliis *Populi albae.*

Larva ſuperne nigra, linea dorſali et laterali glaucis, quibus adjacet linea alia fulva; capite glauco, punctis duobus nigris. Folliculus duplex, albus, tenuis, oblongus.

51. *Eremita*, der *Eremit.*

Scop. Ent. carn. p. 201. no. 501.

Long. lin. $9\frac{1}{2}$. *Lat.* 6.

Alae cinereae; *anticae* atomis faſciisque abruptis fuſcis tribus, dorſo faſciis tribus nigris.

Inveni

Inveni 30 April. in *Sylva Idrienſi*, inſidentem Eccleſiae muro.

52. *Idrienſis*, der *idriſche Waldſpinner.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 113. no. 121.

Alae *anticae* fuſco-flavae, maculis luteis marginalibus 5; *poſticae* luteae maculis nigris 4; ambae ſubtus concolores, flavae nigro-maculatae et faſciatae. Statura *Cajae.*

Diverſa a *Dominula Linn.*

53. *Bicoloria*, der *weiſſe gelbgefleckte Spinner.* — *Unbekannte Raupe.*

Wien. Schmett. p. 49. A. No. 3.

54. *Querna*, *Hageichenſpinner* (Quercus Roboris). *Wiener Schmetterl.* p. 49. A. No. 5.

55. *Dodonaea*, *Kahneichenſpinner* (Quercus Roboris). *Wiener Schmetterl.* p. 49. A. No. 6.

56. *Chaonia*, *Steineichenſpinner* (Quercus Roboris). *Wien. Schmetterl.* p. 49. A. No. 7. *)

57. *Rubea*, *Heckeichenſpinner* (Quercus roboris). *Wien. Schmetterl.* p. 51. C. No. 2. **)

58. *Nivoſa*, *Wintereichenſpinner* (Quercus Roboris). *Wien. Schmetterl.* p. 52. D. No. 1.

*) Dieſe 4 *mondmaklichte Spinner:* Ph. Bomb. *Lunigerae; Scheinſchwärmerraupen,* Larvae *Sphingiformes.*

**) Zu den *nacktflüglichten Spinnern:* Ph. B. *Subnudae; Knoſpenraupen,* L. *Tuberoſae.*

59. *Auriflua*, *Gartenbirnſpinner* (Pyri communis *Sativae*).
Wien. Schmetterl. p. 52. D. No. 4. *)

60. *Maculoſa*, *Klebekrautſpinner* (Galii Apparines).
Wien. Schmetterl. p. 54. E. No. 10. **)

61. *Menthaſtri*, *Roßmünzenſpinner* (Menthae Sylveſtris).
Wien. Schmetterl. p. 54. F. No. 2.

62. *Luctifera*, *Spitzwegerichſpinner* (Plantaginis lanceolatae).
Wien. Schmetterl. p. 54. F. No. 4. ***)

63. *Abietis*, *Tannenſpinner* (Pini Abietis. *Cluſ.* Piceae *Linn.*).
Wien. Schmetterl. p. 55. G. No. 2. †)

64. *Anachoreta*, *Korbweidenſpinner* (Salicis Amygdalinae).
Wien. Schmetterl. p. 56. H. No. 3.

65. *Recluſa*, *Rosmarinweidenſpinner* (Salicis Rosmarinifoliae).
Wien. Schmetterl. p. 56. H. No. 4. ††)

66. *Lobulina*, *Kienbaumſpinner* (Pini Sylveſtris).
Wien. Schmetterl. p. 57. K. No. 6.

67. *Tri-*

*) Dieſe beyden zu den *weiſslichten Spinnern*: Phal. B. *Albidae; Knöpferaupen*, Larvae *Nodoſae.*

**) Zu den *edlen Sp.* Ph. B. *Nobiles; Bärenraupen*, L. *Vrſinae.*

***) Dieſe beyde zu den *gelbfüßigen* Sp. Ph. B. *Luteopedes; Haſenraupen*, L. *Celeripedes.*

†) Zu den *ſtreckfüßigten* Sp. Ph. B. *Tendipedes; Bürſtenraupen*, L. *Faſciculatae.*

††) Dieſe beyde zu den *ſtirnſtreifichten* Sp. Phal. B. *Signatae; Schopfraupen*, L. *criſtatae.*

67. *Trifolii*, *Wieſenkleeſpinner* (Trifolii pratenſis).
Wien. Schmetterl. p. 57. K. No. 4. *)
La Chenille du Gazon *Réaum.* Tom. I. p. 520. t. 2. f. 19.

68. *Rimicola*, *Zerreichenſpinner* (Quercus Cerris).
Wien. Schmetterl. p. 57. L. No. 1.

69. *Franconica*, *Quekeneichenſpinner* (Tritici repentis).
Wien. Schmetterl. p. 57. L. No. 6.

70. *Taraxaci*, *Butterblumſpinner* (Leontodontis Taraxaci).
Wien. Schmetterl. p. 57. L. No. 7.

71. *Pityocampa*, *Fichtenſpinner* (Pini Sylveſtris et piceae).
Wien. Schmetterl. p. 58. L. No. 11. **)
La Chenille du Pin. *Réaum.* (Πιτυοκάμπη *Dioſcor.*)
Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 232. t. 3. f. 1-5. Geſchichte des *Fichtenſpinners* ***).
— *Neues Magaz.* der Ent. I. p. 44. Nachtr. zur Geſchichte des *Fichtenſpinners* (vom D. *Amſtein*).

Réaum.

*) Dieſe beyde zu den *weißmaklichten* Sp. Ph. B. *Centropunctae; Pelzraupen*, L. *Villoſae.*

**) Dieſe 4 zu den *wollichten* Sp. Ph. B. *Tomentoſae; Haarraupen*, L. *Piloſae.*

***) 1. Die Raupen leben geſellſchaftlich in einem Geſpinnſte, kommen nur des Nachts heraus und freſſen, verſpinnen aber am Tage die Oeffnung wieder.

2. Ihre Länge anderthalb Zoll, ſchwarzleibig, mit grauen Haaren abſatzweiſe auf beyden Seiten, und dergleichen gelben, nebſt einer Art Wulſt auf jedem Abſatz oben auf dem Rücken. 16 rothgelbe Füſse.

3. Ge-

Réaum. Mém. pour ſervir à l'hiſt. des Inſ. Tom. II. p. 149. La Chenille *du Pin.* t. 8. f. 1-12.

72. *Oleagina*, *Schlehenſpinner* (Pruni ſpinoſae). *Wien. Schmett.* p. 59. M. No. 2.

73. *Trimacula*, *graulichter Spinner mit drey vereinigten weiſſen Makeln.* *Wien. Schmetterl.* p. 59. M. No. 4. *Unbekannte Raupe* *).

74. *Terebra*, *Salbenbaumſpinner* (Populi nigrae). *Wiener Schmetterl.* p. 60. N. No. 2. **)

75. *Hamma*, *zimmetbräunlicher*, *dunkel- und weißgezeichneter Spinner* (Weibchen). *Wien. Schmetterl.* p. 61. O. No. 2. *Unbekannte Raupe.*

76. *Flina*, *rothbrauner*, *ſilberweiß* — das Weibchen, *braungraulichter blaß-gezeichneter Spinner.* *Wiener Schmetterl.* p. 61. O. No. 3. *Unbekannte Raupe.*

77. *Jo.*

3. Gehen wie die *Prozeſſionsraupen*, eine voran, auf einem mit Seide beſponnenen Wege, vier Zoll tief in die Erde zur Verwandlung.

4. Die Haare verurſachen ein empfindliches Jucken im Geſicht und an den Händen.

6. Nach *Füeßl.* Abbild. geb' ich folgende Beſchreibung: Ph. B. Corpore aurantiaco, ano cinereo; alis *anticis* cinerascentibus, binis fasciis transversis fuscis undulatis; *posticis* pallidioribus, macula nigricante marginali.

*) Dieſe beyde zu den *großſtirnichten* Sp. Ph. B. *Capitones; Halbhaarraupen*, L. *Subpilosae.*

**) Zu den *bleichringichten* Sp. Phal. B. *Albocinctae*; *Holzraupen*, L. *Lignivorae.*

77. *Jodutta*, *hellbrauner* — das Weibchen *graubräunlicher*, *weifsgezeichneter Spinner.*
Wien. Schmetterl. p. 61. O. No. 6. *Unbekannte Raupe.* *)

78. *Caſſinia*, *Graslindenſpinner* (Tiliae Europ.)
Wien. Schmetterl. p. 61. P. No. 1. *Graslindenſpinnerraupe.* La *Caſſini* Valm.

79. *Plumigera*, *Ahornſpinner* (Aceris campeſtris).
Wien. Schmetterl. p. 61. P. No. 2.
Naturforſch III. p. 3. t. 1. f. 2. der *groſse Schnurrbart.* (D. Kühn.)
Füeſsl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. Ph. B. *Plumigera.* **)

80. *Argentina*, *Eichbuſchſpinner* (Quercus Roboris fruteſc.).
Wien. Schmetterl. p. 62. R. No. 2. Tab. I. b. fig. 2.
— — p. 250. §. 5. La *Phalene* à antennes en peigne et à taches argentées; L' *Argentée.*

81. *Tritophus*, *Zitterpappelſpinner* (Populi Tremulae).
Wien. Schmetterl. p. 63. R. No. 6. ***)

82. *Terrifica*, *Truffeichenſpinner* (Quercus Roboris).
Wien. Schmetterl. p. 63. S. No. 1. †)

83. *Si-*

*) Dieſe 3 zu den *ſchmalflüglichten Sp.* Ph. B. *Lanceolatae; Wurzelraupen*, L. *Radicivorae.*

**) Dieſe 2 zu den *haarichten* Sp. Ph. B. *Hiſpidae; Scheineulenraupen*, L. *Noctuiformes.*

***) Dieſe beyde zu den *rückenzähnichten* Sp. Ph. B. *Dorſo-dentatae; Buckelraupen*, L. *Gibboſae.*

†) Dieſer zu den *zackenſtriemichten* Sp. Ph. B. *Flexuoſo-ſtriatae; Gabelraupen*, L. *Furcatae.*

83. *Sicula*, *Magenſpinner* (Betulae albae).
Wien. Schmetterl. p. 64. T. No. 1.

84. *Flexula*, *röthlichgrauer Spinner mit doppelt ausgeſchweiftem Unterrande.*
Wiener Schmetterl. p. 64. T. No. 3. *Unbekannte Raupe.*

85. *Hamula*, *Rothbuchenſpinner* (Fagi Sylvaticae).
Wien. Schmetterl. p. 64. T. No. 4.
Le Cheval marin *Réaum.*

86. *Spinula*, *Schlehendornſpinner* (Pruni ſpinoſae).
Wien. Schmetterl. p. 64. T. No. 6. *)
La Chenille *à queue ſimple* de l'aubépine. *Réaum.*

87. *Teſtudo*, *Zwergeichenſpinner* (Quercus Roboris *pumilae*).
Wien. Schmetterl. p. 65. V. No. 1.

88. *Aſella*, *Alberbuſchſpinner* (Populi nigrae *frutic.*).
Wien. Schmetterl. p. 65. V. No. 2.

89. *Auſtera*, *röthlichgrauer braungezeichneter Spinner.*
Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 310. N. 9. (7·8.) Familie A. Unbek. *Raupe.*

90. *Populifolia*, *Weiſsäſpenſpinner.*
Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 310. No. 5. (1·2.) Familie I.

91. *Carna*, *trübgrauer weiſspunktenſtreifiger Spinner.*
Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 310. No. 7. (3. 4.) Familie O. Unbek. *Raupe.*

92. *Cu-*

*) Dieſe drey zu den *ſpannerförmigen* Sp. Ph. B. *Geometriformes; Spitzraupen*, L. *Cuſpidatae.*

92. *Cucullina*, *brauner*, *abwärts weiſsgerändelter Spinner.*

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 311. No. 8. (4.5.) Familie R. Unbek. *Raupe.*

93. *Caeſarea*, das *Kaiſervögelein.*

Kleem. Beytr. I. p. 246. t. 30. f. 1-5.

Die ſchnelllaufende ſchwarzhaarichte mit einem gelben Rückenſtreif gezierte *Bärenraupe.*

Alis triſtiſſimis nigris, *poſticarum* margine interiore, abdomineque luteis.

Viel ähnliches mit der Phal. *proceſſionea* L. S. *Naturf.* XIII. t. 2. f. 11.

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 49. no. 133. das *Kaiſervögelein*, et no. 193.

94. *Alpina*, das *Alpenvöglein.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 159. Ph. B. Alpina. t. 21. f. 5. *Mas.*

Silberfarb; auf den Vorderflügeln drey, auf den hintern zween undeutliche bräunliche Queerſtreifen. Fig. 6. das *Weibchen:* ſammetſchwarz, vorn an der Bruſt dicke, ſonſt dünne mit grauen Haaren beſetzt; *kaum Spuren der Flügel.*

95. *Viridi-alata*, der *Grünflügel.*

Geoffr. Inſ. II. p. 120. no. 124.

Phalaena pectinicornis, elinguis, antennis et corpore luteis, alis deflexis viridibus.

La *Phalene jaune à ailes vertes.*

Long. 6 lign.

96. *Gagathes*, der *achatfarbige Spinner.*

Geoffr. Inſ. II. p. 124. no. 30.

Pha-

Phalaena pectinicornis elinguis, alis superioribus cinereis fusco-marmoratis, inferioribus cinereis.

La *Phalene agathe.*

Long. 9. *lign.*

97. *Bipunctata*, der *Zweypunkt.*

Geoffr. Inf. II. p. 124. no. 31.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, limbo nigro-punctato, superioribus fascia duplici nigro-lutea, maculaque duplici alba puncto nigro insignita.

Le *double point.*

Long. 8 lign.

98. *Vndulata*, der *gewässerte Spinner.*

Geoffr. Inf. II. p. 130. no. 41.

Phalaena pectinicornis, spirilinguis, alis deflexis nigro-fuscoque undulatis, inferioribus albis.

La *Phalene brune à ailes inférieures blanches.*

Long. 7. Lign.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 337. no. 1. t. 5. f. 8.

Phalene à antennes barbues, à trompe; à corcelet huppé, avec une ligne noire, à ailes rabatues égales, d'un brun griseatre avec trois cercles ovales d'un brun obscur, et dont les ailes inférieures sont blanches.

Phalene brune à ailes inférieures blanches.

— Uebers. II Th. 2 B. p. 244. no. 1. t. 5. f. 8.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern; einem Saugrüssel, einem Rückenkamm mit schwarzer Linie, und gleich niederhangenden braungraulichen Flügeln, mit drey eyrunden dunkelbraunen Zirkeln, aber weissen Unterflügeln.

Die

Die *braune Phaläne mit weiſſen Unterflügeln.*

99. *Damaretta*, die *Damarette.*

Geoffr. Inſ. II. p. 130. no. 42.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis triangularis, alis deflexis nigro-roſeis, faſciis transverſis nigricantibus.

La *Damarette.*

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

100. *Criſtata*, der *Toupéſpinner.*

Geoffr. Inſ. II. p. 131. no. 43.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, corniculis criſtatis, alis deflexis ochroleucis, linea duplici transverſa ſaturatiore.

Le *toupet tanné.*

Long. 5 lign.

101. *Cuneata*, der *neuyorkiſche Keilſpinner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 15. t. 7. f. 3.

— Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Alis flavicantibus; *anticis cuneo*, faſcia longitudinali, margineque interiore *aterrimis*; *poſticis* binis punctis margineque exteriore fuſceſcentibus: corpore quinis lituris transverſis nigris.

102. *Fulminea*, der *ſmyrniſche Blitzſtrahl.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 31. t. 16. f. 3.

Ses ailes près de *quatre pouces et demi.*

Magna. Alis fuſco-rubeſcentibus; *anticis* binis lineis *obliquo-fulmineis.*

103. *Liturata*, der *neuyorkiſche ſchwarzgeſtrichelte Spinner.*

Drury Illuſtr. of. nat. hiſt. Vol. I. p. 36. t. 18. f. 4.
Ses ailes *un pouce et trois huitiemes.*
Alis albicantibus; maculis numeroſis *nigro-liturátis.*

104. *Rubro-collaris*, das *bengaliſche rothe Halsband.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 11. t. 6. f. 4. Phal. Bomb. *Glaucopis.*
Ses ailes *deux pouces et un quart.*
Alis nigro-glauceſcentibus concoloribus; *anticis* binis faſciis transverſis niveis; *collari hilari-rubro.*

105. *Figurata*, der *virginiſche Bilderſpinner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 22. t. 12. f. 4.
Ses ailes presque *un pouce et demi.*
Alis concoloribus atris; *anticis* flavo-*poſticis* hilari-rubro-*figuratis.*

106. *Virginienſis*, das *virginiſche Weißauge.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 23. t. 13. f. 2.
Ses ailes presque *deux pouces*, *et cinq huitiemes.*
Alis concoloribus fuſcis; *anticis punctо ocellari* albo, pupilla glauceſcente.

107. *Egle*, die *neuyorkiſche Schwarzader.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 35. t. 20. f. 3.
Ses ailes *un pouce et ſept huitiemes.*
Alis concoloribus fuſcis, nigro-venoſis.

108. *Marginata*, der *jamaiſche weiſſe Punktrand.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 38. t. 22. f. 2.

Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus furvis; *poſticis* baſi albo-faſciatis, diſco ovali albo, antice acuminato margine exteriore quinis punctis albicantibus; ano ſanguineo.

109. *C nigrum*, das *ſchwarze C.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 338. no. 3. t. 5. f. 10.

Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes rabatues égales griſes nuancées de brun, et marquées d'un C noir.

Phalene C noir.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 245. no. 3. t. 5. f. 10.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und gleich herabhangenden grauen, braunſchattirten, und mit einem ſchwarzen C bezeichneten Flügeln.

Das *ſchwarze C.*

110. *Vmbratica*, der *Schattenſpinner.*

Degeer Inſ. II. Part. I. p. 338. no. 2. t. 5. f. 9.

Phalene à antennes barbues, à trompe, à corcelet huppé, à ailes rabatues, égales d'un brun obſcur noirâtre, avec des points d'un gris clair le long du bord extérieur.

Phalene Sombre.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 245. no. 2. t. 5. f. 9.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und gleich niederhangenden dunkelbraunſchwärzlichen

chen Flügeln, längſt dem Aufsenrande mit hellgrauen Punkten.

Der *Nachtſchatten.*

111. *Cinerea*, der *aſchfarbige Spinner mit weiſſen Flecken.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 339. no. 4. t. 5. f. 11.

Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes en toit d'un cendré blancheâtre avec des nuances et des rayes noirâtres et deux taches ovales blancheâtres bordées de noir.

Phalene cendrée à deux taches blancheâtres.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 246. no. 4. t. 5. f. 11.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauweiſslichen dachförmigen Flügeln mit ſchwärzlichen Streifen, Schattirungen, und zween eyrunden weiſslichen ſchwarzgerändelten Flecken.

Die aſchgraue Phaläne mit zween weißlichen Flecken.

112. *Dimas*, der *oſtindiſche Dimas.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 92. t. 59. Fig. C.

Alis albo-glauceſcentibus, nigro-venoſis; *anticis* ochreo-marginatis, faſciaque transverſa incurvata ferruginea; *poſticis* nigro-bimarginatis.

113. *Dryas*, der *weſtindiſche Dryas.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 110. t. 70. Fig. C.

Alis *anticis* furvis; lineis longitudinalibus fuſcis lituratis; *poſticis* fuſco-pallidioribus, baſi glaucis.

114. *Eridanus*, der *ſurinamiſche Eridanus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 107. t. 68. Fig. G.

Alis concoloribus niveis, nigro-venoſis; abdomine aurantiaco-annulato.

115. *Ebalus*, der *ſurinamiſche Ebalus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 79. t. 50. Fig. G.

Antennis, thorace, abdominisque margine ochreaceis; alis concoloribus rubicundis, atro-punctatis.

116. *Helops*, der *ſurinamiſche Helops.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 113. t. 72. Fig. C. *Foemina.*

Alis fuſcis, aurantiaco-maculatis, *poſticis* ferrugineis; abdomine nigro-annulato.

117. *Ilirias*, der *ſurinamiſche Ilirias.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 15. t. 10. Fig. E.

Alis hilare-viridibus, fuſco-marginatis; *anticis* tribus lineis transverſis nigricantibus apice luteis; *poſticis* binis maculis fuſcis marginalibus: ano-flavo-piloſo.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 311. no. 193. b. Phal. *Ilirias*, die *grüne Eule.*

118. *Lincus*, der *ſurinamiſche Linkus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 79. t. 50. Fig. H.

Alis furvis; *anticis* apice, *poſticis* diſco aurantiacis.

119. *Liris*, der *weſtindiſche Liris.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 98. t. 63. Fig. F.

Alis vireſcentibus nigro-venoſis, areis quatuor caneſcentibus.

120. *Meon*, der *ſurinamiſche Meon.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 113. t. 71. Fig. F.
Alis furvis; *anticis* quatuor lineis totidemque maculis albis; *poſticis* baſi albis, linea flaviſſima marginali incurvata.

121. *Metabus*, der *ſurinamiſche Metabus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 117. t. 74. Fig. D. *Foemina.*
Alis concoloribus brunneis, nigro-venoſis.

122. *Narciſſus*, der *chineſiſche Narziſſus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 116. t. 73. Fig. E F. *Foemina.*
Alis *anticis* furvis, faſcia longitudinali dilute alba, lineola nigra ſerpentina; *poſticis* baſi luteis, margine glauco-fuſcis.

123. *Noëma*, der *ſurinamiſche Noëma.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 27. t. 18. Fig. E.
Alis *anticis* variegato-hieroglyphicis, *C nigro; poſticis* griſeo-albeſcentibus.

124. *Ophis*, der *konſtantinopolitaniſche Ophis.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 20. t. 13. Fig. C.
Antennis flavis; alis *anticis* atris, flavo-hieroglyphicis; *poſticis* ciliatis nigricantibus.

125. *Orſilochus*, der *ſurinamiſche Orſilochus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 72. t. 46. Fig. D.
Alis niveis, maculis numeroſis rubro-fuſcis.

126. *Pandroſa*, die *ſurinamiſche Pandroſa.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 122. t. 77. Fig. D.

Alis

Alis fuſco-teſtaceis; *anticis* faſcia longitudinali alba, nigro-lineata, ſex haemiſphaeriis impoſitis atris, albo-marginatis; *poſticis* lineis transverſis nigris undulatis.

127. *Promula*, die *bataviſche Promula.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 114. t. 72. Fig. D. *Foemina.*

Alis concoloribus furvis; *poſticis* margine interiore luteo.

128. *Rhodope*, die *chineſiſche Rhodope.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 49. t. 30. Fig. E. Statura Papil. *Heliconii.*

Alis omnibus *foliaceis; anticis* furvis nigro-venoſis; *poſticis* cyaneo-faſciatis.

129. *Tiberina*, die *chineſiſche Tiberina.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 52. t. 32. Fig. C D. *Foemina.*

Alis nigro-luteis, antennisque pulchre *deauratis.*

Edw. hiſt. of Birds, t. 226.

130. *Vmber*, der *ſurinamiſche Nachtſchatten.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 24. t. 15. Fig. F.

Fabric. Mantiſſ. p. 281. 99-100. Bomb. *Vmber.*

Alis convolutis atris; fronte abdomineque fulvis.

131. *Aconyta*, der *bengaliſche Akonyta.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 51. t. 131. Fig. A. *Foemina.*

Alis concoloribus brunneo-rubeſcentibus; *anticis* faſciis pallidioribus.

132. *Alſas*, der *ſurinamiſche Alſas.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 26. t. 113. Fig. E. *Foemina.*

Alis *anticis* teſtaceis, lineis fuſcis nigrisque undulatis; *poſticis* albidis, flavo-marginatis.

133. *Aſtur*, der *ſurinamiſche Aſtur.* *)

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 35. t. 120. Fig. B.

Alis *anticis* albis variegato-hieroglyphicis; *poſticis* violaceis.

134. *Crocos*, der *ſurinamiſche Krokos.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 44. t. 126. Fig. E.

Alis *anticis* viridi-micantibus, areis fulvo-rubellis, fuſco-punctatis; *poſticis* abdomineque rubicundis.

135. *Encelada*, der *ſurinamiſche Enzelada.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 130. t. 182. Fig. F.

Alis fuſco-maculatis, faſciis lineisque undulatis nigris; *poſticis* baſi glauceſcentibus, apice rubellis.

136. *Hermia*, der *ſurinamiſche Hermia.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 136. t. 185. Fig. F.

Affinis Phal. *Crocos.*

Alis *anticis* viridi-micantibus atro-punctatis, areis fulvis rubro-punctatis; *poſticis* incarnatis, linea marginali obſcure-rubra, incurvata.

137. *Hipparchia*, die *ſurinamiſche Hipparchia.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 135. t. 185. Fig. D. *Foemina.*

Alis

*) Im Texte eine Phal. *Noctua*; im Indice Bombyx, und ſo bey mehreren.

Alis teſtaceis, flavo-maculatis, atroque punctatis.

138. *Hyphinoë*, die *amboiniſche Hyphinoë*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 91. t. 154. Fig. B. *Foemina*.

Magna. Alis omnibus purpuraſcentibus; *anticis* flavo-maculatis.

139. *Icaſia*, die *ſurinamiſche Ikaſia*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 130. t. 181. Fig. E.

Alis pallide-teſtaceis; *anticis* ocellis fuſcis albo-pupillatis; *numerisque* 8 ſolitariis et continuis.

140. *Lactinea*, die *bataviſche Laktinea*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 58. t. 133. Fig. D.

Alis concoloribus albicantibus; *anticis* margine anteriore rubro; *poſticis* binis in diſco punctis, lineisque in margine nigris interruptis.

141. *Mineus*, der *bataviſche Mineus*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 52. t. 131. Fig. D.

Alis concoloribus ochreaceis; areis cyaneis *aureo-punctatis;* toto corpore aureo-liturato et annulato. *Splendida*.

142. *Peripheta*, der *weſtindiſche Peripheta*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 54. t. 131. Fig. G.

Alis concoloribus fuſco-teſtaceis, falcato-dentatis, *foliis* albicantibus, fuſco-ſtriatis.

143. *Rivuloſa*, der *ſurinamiſche Bachſpinner*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 15. t. 107. Fig. A. *Mas*.

Alis fuſco-caneſcentibus; tribus *anticarum rivulis* longitudinalibus nigris.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. t. 14. f. 5. *Foemina.*

144. *Somniculoſa*, der *ſurinamiſche Schläfer.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 6. t. 100. Fig. A B. *Foemina.*

Magna. Alis concoloribus fuſco-rubellis, albo-ſtriatis.

145. *Tymber*, der *ſurinamiſche Tymber.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 109. t. 167. Fig. D.

Alis concoloribus furvis; *anticis* pallidioribus.

146. *Verago*, der *ſurinamiſche Verago.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 102. t. 162. Fig. D E. *Mas. Vol. IV.* p. 34. t. 306. Fig. D E. *Foemina.*

Alis fuſco-variegatis; *anticis* binis ocellis albis atro-pupillatis.

147. *Alope*, die *ſurinamiſche Alope.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 168. t. 286. Fig. E F. *Foemina.*

Alis furvo-gagatheis, nigro-lineatis.

148. *Alphea*, die *koromandelſche Alphea.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 99. t. 250. Fig. E.

Alis incarnatis; *anticis* triangulo recto atro-fuſco, transverſe albo-faſciato.

149. *Amaſis*, der *ſurinamiſche Amaſis.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 33. t. 206. Fig. B. *Foemina.*

Alis

Alis *anticis* albicantibus, lineis curvis transverſis atris lituratis, macula fere media rubicunda; *poſticis* flavis atro-maculatis.

150. *Amilia*, die *ſurinamiſche Amilia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 130. t. 265. Fig. DE. *Mas et Foemina.*

Alis dentatis fuſco-cineraſcentibus; *anticarum* una *numerus* 18, altera *littera* B.

151. *Bifaſciata*, die *ſurinamiſche Doppelſtreife.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 104. t. 252. Fig. F. *Foemina.*

Alis concoloribus ochreaceis; *anticis* binis faſciis transverſis nigris.

152. *Caprotina*, die *virginiſche Koprotina.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 170. t. 287. Fig. C. *Foem.*

Alis *anticis* albis, *poſticis* luteis, omnibus nigro-maculatis.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. t. 3. f. 3.

153. *Circe*, die *ſurinamiſche Zirze.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 124. t. 263. Fig. D. *Mas.*

— — p. 147. t. 274. Fig. E. *Foem.*

Alis *anticis* viridi-nigricantibus, albo-faſciatis; *poſticis* purpuraſcentibus: *Foemina* alis anticis pallidioribus.

154. *Cocala*, die *ſurinamiſche Kokala.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 145. t. 273. Fig. D. *Mas.*

Alis furvis; *anticis* pallidioribus atro-lineatis, binis apice maculis luteis: *antennis pedibusque poſterioribus* longiſſimis.

155. *Do-*

155. *Dominia*, die *koromandelſche Dominia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 123. t. 263. Fig. A B. *Foemina.*

Alis concoloribus niveis; *anticis* viridi-micantibus nigro-venoſis; *poſticis* binis maculis atris *teſſellatis;* antice longis, poſtice brevioribus faſciis longitudinalibus aterrimis.

156. *Erycata*, die *ſurinamiſche Erykata.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 170. t. 287. Fig. D. *Foemina.*

Alis falcato-dentatis rubeſcentibus, variegatis, lineis transverſis atris; margine nigro-punctato.

157. *Famula*, die *guineiſche Magd.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 61. t. 228. Fig. E. *Mas.*

Alis nigerrimis, baſi albicantibus; *anticis* binis maculis ovatis albis incurvatis.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. t. 11. f. 3.

158. *Hyrtaca*, die *ſurinamiſche Hyrtaka.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 97. t. 249. Fig. F. *Mas.*

Alis concoloribus teſtaceis; *anticis* apice obſcurioribus; binis *cuneis* perforatis atris.

159. *Javana*, die *ſurinamiſche Javana.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 146. t. 274. Fig. C. *Foemina.*

Alis *anticis* diſco furvo-rubris, antice margineque flaveſcentibus, binis punctis albis; *poſticis* obſcurioribus margine ſulphureis.

160. *Ido-*

160. *Idonia*, die *neuyorkiſche Idonia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 150. t. 275. Fig. H. *Mas.*

Alis fuſcis, atro-flavoque variegatis; *poſticis* diſco albo.

161. *Lanata*, der *ſurinamiſche Wollſpinner.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 130. t. 265. Fig. F. *Mas;* Fig. G. *Foemina.*

Alis concoloribus incarnatis, nigro-venoſis. *Merian.* Surin. t. 19.

162. *Membliaria*, die *oſtindiſche Membliaria.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 139. t. 269. Fig. CD. *Foemina.*

Alis pallide-teſtaceis, margine albo-lineato.

163. *Micilia*, die *ſurinamiſche Mizilia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 62. t. 228. Fig. G.

Alis *anticis* nigerrimis, albo-glaucoque faſciatis; *poſticis* coeruleis albo-faſciatis.

164. *Mummia*, die *ſurinamiſche Mummia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 61. t. 228. Fig. C. *Mas.*

Alis concoloribus furvis, margine atro-punctatis; *poſticis* baſi albis.

165. *Nauſica*, die *ſurinamiſche Nauſika.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 97. t. 249. Fig. DE. *Mas.*

Alis *anticis* teſtaceis, faſciis pallidioribus; *poſticis* caneſcentibus, atris figuris: faſciis, clavis, cuneisque notatis.

166. *Re-*

166. *Regina*, die *furinamiſche Königinn.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 142. t. 272. Fig. A. *Mas.*

Alis *niveo-argenteis*, ciliatis.

167. *Sanguinolenta*, der *furinamiſche Blutſpinner.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 102. t. 252. Fig. A. *Mas.*

Alis concoloribus *ſanguinolentis; anticis* binis maculis albis.

168. *Tomyris*, der *furinamiſche Tomyris.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 123. t. 262. Fig. F G.

Alis concoloribus furvis, punctis numeroſis albis, cyaneisque in areis nigris.

169. *Venus*, die *kapenſiſche Venus.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 167. t. 286. Fig. C D. *Splendidiſſima.*

Alis *anticis* ochreaceis maculis oblongis ovatisque *argentatis*, nigro-marginatis; *poſticis* rubicundis, baſi pallidioribus.

170. *Vitrea*, der *furinamiſche Glasſpinner.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 151. t. 276. Fig. C.

Alis concoloribus albeſcentibus, medio-fulvis, atro-ſtriatis, corpore toto ochreaceo.

171. *Equina*, der *isländiſche Pferdeſpinner.*

Olaffens Reiſe durch Island I. p. 320. III. *Lepid.* no. a.

Phalaena (*maxima*) colore obſcure-ſericeo palleſcente; toto corpore plumoſo, ore *ſpirilingui.*

Hroße Fidrildr; ſetzt ſich auf die Pferde.

172. *Mo-*

172. *Molina*, die *ſurinamiſche Molina.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 25. t. 302. Fig. EF.

Alis concoloribus ferrugineis; *anticis* luteo-ſtriatis; *poſticis* baſi rubeſcentibus, macula media nigricante.

173. *Neſea*, die *ſurinamiſche Neſea.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 31. t. 305. Fig. C.

Alis *anticis* purpuraſcentibus, *littera P* inſignitis; *poſticis* pallide luteis; *pedes anteriores* porrecti, antice rubri.

174. *Bellatrix*, die *ſurinamiſche Bellatrix.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 32. t. 305. Fig. F.

Alis ſubfalcatis, omnibus ciliatis; *anticis* olivaceo-flavo-nigricantibus; in medio congeries punctorum alborum; baſi quinis punctis luteis; *poſticis* baſi admodum piloſis.

175. *Amynta*, die *ſurinamiſche Amynta.*

Cramer Pap. exot. III. p. 100. t. 251. Fig. E. *Foem.*

— — IV. p. 33. t. 306. Fig. C. *Mas.*

Alis *anticis* baſi flavis, faſcia transverſa rubra, poſtice incarnatis, margine aurantiaco; atro-maculatis: *tectiformibus.*

176. *Agreſta*, die *ſurinamiſche Agreſta.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 32. t. 306. Fig. A.

Alis cinnamomeis albo-maculatis.

177. *Nuda*, der *ſurinamiſche Kahlflügel.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 33. t. 306. Fig. B.

Alis nudis cineraſcentibus flavo-nigroque ſtriatis.

178. *Do-*

178. *Dolabrata*, die *ſurinamiſche Dolabrata.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 34. t. 306. Fig. F.
Alis concoloribus luteis, *anticis* fuſco-lituratis.

179. *Ornata*, die *ſurinamiſche Schöne.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 34. t. 306. Fig. G.
Alis *anticis* albidis, binis lineis undulatis fuſcis, una interrupta; *poſticis* luteſcentibus.

180. *Netrix*, die *ſurinamiſche Netrix.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 35. t. 307. Fig. B.
Alis albidis, faſciis transverſis flavis.

181. *Flavata*, *der javaniſche Gelbling.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. C.
Alis omnibus flavis, *anticis* baſi atro-lituratis; *poſticis* pallidioribus.

182. *Pilumnia*, die — *Pilumnia.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. D.
Alis flaveſcentibus; *anticis* punctis nigris obſoletis, lineisque nigris nigro-punctatis.

183. *Altrix*, die *ſurinamiſche Altrix.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. E.
Alis *anticis* fuſceſcentibus, nigro-lineatis.

184. *Punctata*, der *ſurinamiſche Schwarzpunkt.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 37. t. 307. Fig. F.
Alis *anticis* olivaceis, nigro-punctatis; *poſticis* purpuraſcentibus, diſco flavo.

185. *Fuſca*, der *ſurinamiſche Bräunling.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 37. t. 307. Fig. G.
Alis

Alis *anticis* fuſcis, punctis tribus flavis; *poſticis* incarnatis, baſi aurantiacis.

186. *Simois*, die *ſurinamiſche Simois.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 39. t. 308. Fig. F.

Alis fuſcis, nigro-venoſis; *anticis* triangulo furvo; omnibus margine flavo, ciliato.

187. *Tharis*, die *ſurinamiſche Tharis.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 38. t. 308. Fig. D.

Alis *anticis* furvis, variegatis, nigroque punctatis; *poſticis* concoloribus fuſcis.

188. *Euëria*, der *Wollträger.*

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte I St. p. 26. t. 2. f. 3. *Larva.* f. 6. Mas. f. 7. Foem.

Ph. B. elinguis; alis reverſis pallide corticinis; ſuperioribus baſi ſtrigaque poſtica flavis puncto albo.

(Eine *Ringelraupe;* auch in *den Eyern Ichneumons.*)

189. *Vidua*, die *junge Witwe.*

Knochs Beytr. zur Inſektengeſch. I St. p. 48. no. 9. t. 3. f. 3.

Elinguis, alis albo-cineraſcentibus nigro-variis, faſcia ſublutea inaequali.

III. NACHTEULEN: *Noctuae.*

1. *Ohne ſichtbaren Saugrüſſel* (Elingues).

82. *Strix*, die *ſüdamerikaniſche Eule.* *)

Müllers L. N. S. 5 B. 1 Th. p. 679. no. 82. die *Trauereule.*

Fabric. S. E. p. 591. no. 2. NOCTUA *Strix.* Nom. *Linn.*

Sebae Theſ. IV. t. 39. f. 12. 14.

— — t. 57. f. 7. 9.

Cramer Pap. exot. II. p. 77. t. 145. Fig. A. Ph. *Strix — d'Amboine.* **)

83. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

Müller l. c. p. 679. no. 83. der *Blauſieb.*

Berlin. Magaz. III. p. 290. no. 36.

Phal. *pirina*, der *Lindenbohrer.* Weiſs, mit vielen ſtahlblauen Flecken.

Naturforſcher IX. p. 114. no. 36. Ph. *Pirina.* (von *Rottemb.*)

— — XII. p. 73. no. 4. Ph. N. *Aeſculi.* t. 2. f. 7. *Weibchen* (*Capieux*).

Beſchäf-

*) Die vom Linn. hierbey zitirte *Merian.* Sur. t. 20. gehört nicht hieher, ſondern zu *Cramers Agrippina:* Pap. exot. I. p. 136. t. 87. A. t. 88. A.

Linné ſagt mit Recht von ihr: *Maxima* omnium notarum Noctuarum.

**) Nach Cramer müſste ſie eigentlich zu den *Bombycibus* gerechnet werden.

Der Körper und Hinterleib *ſpitzſpindelförmig*, wie bey den *Schwärmern.*

Beſchäftig. der Berl. Geſellſch. naturf. Fr. III. p. 30. §. 1. Phal. *Aeſculi*, das *Blauſieb.* t. I. f. 1. *Männchen*; f. 2. *Weibchen.* *)

Die *Puppe* im veſteſten *Büchenholz.* (D. *Kühn.*)

Fiſchers N. G. v. Livl. p. 152. no. 360. Ph. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 688.

Ph. Aeſculi, die *Punkteule.*

Bey *Genf.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 391. no. 10. Phal. *pirina*, der *Lindenbohrer.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 1. no. 2.

Ph. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 276. t. 48. f. 5. 6.

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige ſchöne hochgelbe *Holzraupe* in den Apfelbäumen. **)

Wiener Schmetterl. p. 59. N. *Holzraupen*, *bleichringichte Spinner* ***).

No. 3. *Pferdekaſtanienſpinnerraupe* (Aeſculi Hippocaſtani); *Pferdekaſtanienſpinner.* Ph. *Aeſculi.* (Noctua Linn.)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 306. no. 1150. Phal. N. *Pyrina.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 83. Ph. *Aeſculi.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 31. f. 8. 9.

Fabric. S. E. p. 590. no. 5. HEPIALUS *Aeſculi.*

*) Von der *Capieuxſchen* in der Gröſse, Fühlhörnern, und ganzem Bau ſehr verſchieden. Die erſtere hat zwo ganz kurze haarförmige Fühlſpitzen.

**) Die Raupe wird gröſser, als ſie *Röſel* abgebildet hat.

***) Mit Rechte unter die *Bombyces* geſetzt.

Niveus, alis punctis numerosis coeruleo-nigris; thorace fenis.

Larva flava, nigro punctata, capite caudaque nigris.

84. *Humuli*, die *Hopfeneule.*

Müller l. c. p. 679. no. 84. die *Hopfeneule.*

Füeßl. schweizer. Inf. p. 36. no. 689. Phal. *Humuli*, *Hopfeneule.*

Bey uns etwas selten.

Wien. Schmetterl. p. 61. O. *Wurzelraupen*; *schmalflüglichte Spinner.*

No. 1. *Hopfenspinnerraupe* (Humuli Lupuli); *Hopfenspinner.* Ph. *Humuli.*

Sulzers Gesch. p. 160. t. 22. f. 1. die *Hopfeneule*; Ph. *Humuli.*

Rothgelb; die Vorderflügel mit hellbraunen Wolken; unten braun behaart, die Hinterflügel halb federlos, schwänzlich. Kurze Fühlhörner. Bey dem *Männchen* alle Flügel oben weifs, perlenfarb, ohne Flecken, unten gelblichbraun.

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 104. Phal. nocturna *Humuli.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 11. Phal. *Humuli*, *Hopfeneule.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 12. Ph. *Humuli.*

Raj. Hist. Inf. p. 157. no. 3.

Phalaena media, alis longis, in *foemina* flavis, cum lineis rubentibus, in mare albis.

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 84.

Ph. *Humuli.* Nom. *Linn.*

Onomat. hist. natur. P. 6. p. 377.

Ph. *Humuli*, der *Hopfenvogel.*

Cathol. H. p. 308. Ph. *Humuli.*

Fa-

Fabric. S. E. p. 589. no. 1. HEPIALUS *Humuli.*
Alis flavis, fulvo-ſtriatis; *maris* niveis.
Habitat in Lupuli radicibus, *Eryſiphen* cauſſans.
Ova innumera, minima, nigra.
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1380. Ph. N. *Humuli.* Nom. *Linn.*
Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 15. p. 487. t. 7. f. 1-6.
Chenille raſe, blanche, à tête d'un brun jaunâtre, qui ronge et mange les racines du *Houblon.*
— — p. 698. t. 7. f. 5. 6.
Phalene à antennes très-courtes, dont le *mâle* eſt blanc, et la femelle d'un jaune d'ocre.
— Tom. II. Part. I. p. 365. no. 1.
Phalene à antennes filiformes très-courtes, ſans trompe, dont le *mâle* eſt blanc, et la *femelle* d'un jaune d'ocre.
Phalene du Houblon.
— *Ueberſ.* I. 3 Qu. 15te Abh. p. 66. t. 7. f. 1-6.
Die glatte und weiſse *Raupe*, mit gelblichbraunem Kopfe an den *Hopfenwurzeln.*
— — 4 Quart. p. 121. t. 7. f. 5. 6.
Ein *Nachtvogel* mit ſehr kurzen Fühlhörnern; das *Männchen* weiſs; das *Weibchen* okergelb.
— II Th. I B. p. 266. no. 1.
Eine *Phaläne* mit fadenförmigen überaus kurzen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel; das *Männchen* weiſs, das *Weibchen okergelb.*
Die *Hopfeneule.*

85. *Hecta*, das *Punctband.*
Müller l. c. p. 679. no. 85. das *Punktband.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 690.

Phal. *Hecta*, das *Punktband.*

Bey *Genf.*

Wien. Schmetterl. p. 61. O. No. 4. *Unbekannte Raupe.*

Oraniengelber silberglänzend—das *Weibchen*, grauer düstergestreifter Spinner. Ph. *Hecta* *).

Cathol. H. p. 94. Phal. *Hecta.*

Fabric. Syst. Ent. p. 589. no. 2. HEPIALUS *Hectus.* Nom. *Linn.*

Vespere in aëre fluctitat motu pendulo, at solitarius.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1381. Ph. *Hecta.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 15. p. 495. t. 7. f. 12.

Papillon nocturne à antennes très-courtes, dont les ailes supérieures sont d'un jaune couleur d'ocre, tirant sur le roux, à taches d'un blanc argenté. (Mâle.)

— — p. 698. t. 7. f. 12.

Phalene à antennes très-courtes, d'un jaune roussâtre, à taches blanches et argentées.

— Tom. II. Part. I. p. 366. no. 2.

Phalene à antennes filiformes très-courtes, sans trompe, d'un jaune roussâtre, avec des taches blanches argentées sur les ailes supérieures.

Phalene à pattes en masse.

— Tom. VII. p. 596. no. 4. t. 44. f. 14. *Foemina*, s. Ph. *Vitis Idaeae* L. no. 88.

Phalene sans trompe; à antennes filiformes très-courtes, à ailes d'un jaune roussâtre avec des taches blanches dans le *mâle*, et brunes à rayes fauves dans la *femelle.*

Pha-

*) Diese Hecta, sagen die Wiener: sey das *Männchen* von Ph. *Vitis Idaeae* Linn. no. 88; diese *letztere* also das *Weibchen.*

Phalene à pattes en maſſe.

Phalaena (*Clavipes*) elinguis; antennis filiformibus breviſſimis, alis *mari* rufo-fulvis, maculis niveis; *foeminae* fuſcis, faſciis fulvis.

Degeer Ueberſ. I B. 3 Qu. p. 71. t. 7. f. 12.

Ein *Nachtfalter* mit ſehr kurzen Fühlhörnern, und okergelben, etwas fuchsröthlichen, ſilberweiſsgefleckten Oberflügeln (*Männchen*).

— — 4 Quart. p. 121. t. 7. f. 12.

Ein gelbröthlicher *Nachtvogel*, mit kurzen Fühlhörnern und ſilberweiſſen Flecken.

— — II Th. I. B. p. 266. no. 2.

Eine gelb-braunröthliche *Phaläne* mit weiſſen Silberflecken auf den Oberflügeln, und ſehr kurzen fadenförmigen Fühlhörnern ohne Saugrüſſel.

Die *keulfüßige Phaläne.*

86. *Lupulina*, die *bogenflüglichte Eule.*

Müller l. c. p. 680. no. 86. der *Bogenflügel.*

Wiener Schmetterl. p. 61. O. No. 5. *Unbekannte Raupe.*

Okergelber, düſter- und ſilberweiſs; das *Weibchen* aſchgrauer dunkelgeſtrichter *Spinner.* Ph. *Lupulina.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 589. no. 2. HEPIALUS *lupulinus.*

Alis cinereis; ſtriga albidiore.

87. *Sylvina*, die *Waldeule.* *).

Müller l. c. p. 680. no. 87. die *Waldeule.*

Füeßl. Magaz. der Entom. II. p. 11. Phal. *Sylvina.* (Chorh. *Meyer.*)

*) *Nicht abgebildet.*

Die buntgeſtreifte *Raupe* mit gelbbraunen Knöpfgen — Nahrung *Eichenlaub.*

— Die Verwandlungshülſe, die Gröſse abgerechnet, gleicht der von der Raupe der Ph. *Quercus*, worinn die Raupe 10 Tage unverwandelt liegt. Der Schmetterling bleibt 5 Wochen in der Puppe.

88. *Vitis Idaeae*, der *Stumpfſauger:* das *Weibchen* von Ph. *Hecta* no. 85.

Müller l. c. p. 680. no. 88. der *Stumpfſauger.*
Degeer Inſ. Tom. VII. p. 596. t. 44. f. 14.

2. EULEN *mit ſichtbarem Saugrüſſel und glattem Rücken, ohne Kamm* (Spirilingues, dorſo laeves absque criſta).

89. *Lectrix*, die *chineſiſche Scheckeule.*

Müller l. c. p. 680. no. 89. die *Scheckeule.*
Fabric. Syſt. Ent. p. 584. no. 95. BOMBYX *Lectrix.* Nom. *Linn.*
Cramer Pap. exot. II. p. 145. t. 192. Fig. C. Phal. *Lectrix* — de la *Chine* (*Foemina*).
Houttuin Hiſt. Nat. I Part. Tom. XI. p. 598. t. 92. f. 5.

90. *Dominula*, das *Frauchen.*

Müller l. c. p. 681. no. 90. die *Jungfer.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 692. Ph. *Dominula*, die *Jungfer.*
Bey uns *ſelten.*
Berlin. Magaz. III. p. 204. no. 2. Phal. *Dominula*, der *Specht.*

Die

Die *Oberflügel* schwarzblaulichgrau mit weissen und gelben Flecken; die *Unterflügel* roth mit schwarzen Flecken.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 10. no. 3. p. 20. no. 36. Phal. *Dominula*, die *Jungfer*, der *Specht.*

Röfels Insektenbel. III. p. 267. t. 47. die auf den Wollweiden und Eschen sich aufhaltende, mit dreyfacher gelber Bordirung ausgezierte schwarze *Raupe.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 342. Ph. N. *Dominula*, das *Frauchen;* der *Specht.*

Das schwarze glatte *Nachteulchen* mit blau-, gelb und weissgefleckten Oberflügeln, und rothfleckigen Unterflügeln.

— — II. p. 744. no. 36. Ph. N. *Dominula*, der *Specht.*

Wien. Schmetterl. p. 53. E. No. 8. *Hundszungenspinnerraupe* (Cynoglossi oleraceae); *Hundszungenspinner;* Ph. *Dominula.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 355. Ph. *Dominula.*

Bekm. Ep. S. L. p. 165. no. 90. Ph. *Dominula.* Nom. *Linn.*

Scop. Ent. carn. p. 204. no. 506. Ph. *Dominula.*

Long. lin. 11 - vnc. 1. *Lat.* lin. 6-7.

Alae ut supra, ita subtus coloratae; *anticae* nigrae cum translucente virore; maculis 10, plerisque albis; *posticae* scarlatinae, binis maculis apiceque nigris.

Larva nigra, verrucis haemisphaericis nitidis pilosis aspera; pilis canescentibus, dorso lateribusque albo-flavoque punctatis.

Pupa lucida, fusca. *)

*) Des *Scop.* Phal. *Idrienfis*: Ann. 5. hist. nat. p. 113. no. 121. von dieser *Dominula* verschieden.

Poda Muſ. graec. p. 89.
Schaeff. Icon. t. 77. f. 3. 4.
Fabric. Syſt. Ent. p. 583. no. 93. BOMB. *Dominula.* Nom. *Linn.*

Larva piloſa, atra; lineis tribus flavis, atro-maculatis.

Pupa brunnea intra folliculum communem.

91. *Hera*, der *ruſſiſche Bär.* *)

Müller l. c. p. 681. no. 91. die *ſpaniſche Fahne.* **)
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 693. die *Hausfrau.*
Bey *Zürch* ſelten, bey *Genf* gemeiner.
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 27. no. 62. Phal. *Hera*, der *ruſſiſche Bär;* die *ſpaniſche Fahne.*
Röſels Inſektenbel. IV. p. 194. t. 28. f. 3.
Ein zur 2 Kl. gehöriger vortrefflicher *Papilion*, mit hochrothen ſchwarzgefleckten *Unterflügeln;* die *Oberflügel* braun geſchillert mit weiſslichgelben Queerſtreifen; der Hinterleib oraniengelb. (*Weibchen.*)
Kleemanns Beytr. I. p. 345. t. 41. f. 1. *Raupe;* f. 2. *Geſpinnſte;* Fig. 3. *Puppe;* F. 4. 5. *Schmetterling.*
Die ſchwarzköpfige, hellgelbbordirte, und mit einem oraniengelben Rückenſtreif, nebſt dergleichen ſteifhaarigen Knöpfen gezierte *Raupe.*
Wien. Schmetterl. p. 52. E. *Edle Spinner.*
No. 3. *Beinwellſpinnerraupe* (Symphiti tuberoſi); *Beinwellſpinner.* Ph. *Hera.*

Hot-

*) *Hera*, *Matronula*, *Dominula und Fuliginoſa* ſetzen die *Wiener Entomol.* p. 52. unter die *Spinner*, weil ihre Raupen dahin gehören. Es ſind ſolche *Winterſchläfer und Vielfräſse* (Polyphagae.)

**) Unmöglich Ph. *Plantaginis* L. no. 42. wie der V. meynt.

Hotlaar Inſ. t. 8. f. 3. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Hera.*

Cathol. H. p. 122. Ph. *Hera.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 91. Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 29. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 203. no. 505. Phal. *Plantaginis.*

Long. Vnc. 1. lin. $\frac{1}{2}$. *Lat.* $6\frac{3}{4}$.

Alae *anticae* fuſcae cum obſcuro quodam translucente virore; margine inferiore litura, faſciaque bifida, Y referente, cerei coloris; *poſticae* ſcarlatinae, ſupra maculis 4, ſubtus unica, nigris.

Poda Muſ. graec. *Quadripunctaria.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 583. no. 92. BOMBYX *Hera.*

Alis incumbentibus, vireſcenti-nigris; rivulis flavis; *poſticis* rubicundis, maculis tribus nigris.

Geoffr. Inſ. II. p. 145. no. 74.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; ſuperioribus atris rivulis flavis; inferioribus rubris maculis nigris.

La *Phalene chinée.*

Long. 11 lign.

92. *Matronula*, der *augsburger Bär.*

Müller l. c. p. 681. no. 92. die *Dame.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 694. die *Matrone* — etwas ſelten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 118. no. 334. Phal. *Matronula*, die *Dame;* der *augsburger Bär.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 235. t. 39. f. 1. 2.

— — IV. t. 4. f. 4. die *braunhaarige Bärenraupe.*

Wien.

Wien. Schmetterl. p. 53. E. No. 5. *Beyfußſpinnerraupe* (Artemiſiae vulgaris). *Beyfußſpinner.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 12. *Beyfußeule.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 383. Ph. *Matronula.*

Fabric. S. E. p. 584. no. 97. BOMBYX *Matronula.* Alis *anticis* fuſcis; exterius flavo-maculatis; *poſticis* flavis, nigro-maculatis.

93. *Ancilla*, die *Magd.* *)

Müller l. c. p. 682. no. 93. die *Kammerjungfer.*

Wien. Schmetterl. p. 69. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen;* Ph. Noctuae *Tineiformes.* No. 14. *Wändeflechteneulenraupe* (Lichenis parietini); *Wändeflechteneule*, Ph. *Ancilla.*

Catholicon A. p. 326. Ph. *Ancilla.*

94. *Parthenias*, das *Jungfernkind.* **)

Müller l. c. p. 682. no. 94. das *Jungfernkind.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 695. Ph. *Parthenias.* Bey uns *ſehr ſelten.*

Wien. Schmetterl. p. 91. X. *Franzenraupen, Larvae cilitatae; geſchmückte Eulen*, Phal. Noct. *Feſtivae.* 3) mit gelben Unterflügeln, faſt ungezähnt. No. 9. *Hangelbirkeneulenraupe* (Betulae albae); *Hangelbirkeneule.* Ph. N. *Parthenias.*

95. *Fuliginoſa*, der *Rußflügel.*

Müller l. c. p. 682. no. 95. der *Rußflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 696. Ph. *Fuliginoſa*, der *Zartflügel.*

Berl.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Berlin. Magaz. III. p. 206. no. 4. Ph. *Fuliginosa*, die *Frühlingsmotte.*

Die *Oberflügel* koffeebraun; die *Unterflügel* roth mit einigen schwarzen Flecken.

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 116. no. 326. Ph. *Fuliginosa*, der *Rußflügel.*

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 244. t. 43. Eine steifhaarige braune *Raupe.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 747. no. 50. Phal. GEOMETRA *Fuliginosa.* Die *Frühlingsmotte.* *)

Wien. Schmetterl. p. 54. E. No. 11. *Ampferspinnerraupe* (Rumicis acuti); *Ampferspinner;* Phal. BOMB. *Fuliginosa.*

Onomat. hist nat. P. 6. p. 369. Ph. *Fuliginosa.*

Raj. Hist. Ins. p. 228. no. 13.

Phalaena minor, alis obscure-rufis seu pullis duabus maculis nigris notatis.

Scop. Entom. carn. p. 206. no. 508.

Long. Lin. $7\frac{1}{2}$. *Lat.* $3\frac{3}{4}$.

Alae *anticae* obsure murinae, punctis 2 fuscis, mediis, approximatis; *posticae* cinnaberinae, punctis binis, mediis, maculisque marginalibus nigris.

Fabric. S. E. p. 588. no. III. BOMB. *Fuliginosa.*

Alis incumbentibus, rubro-fuliginosis, puncto gemino nigro; abdomine sanguineo, dorso nigro.

Larva pilosa, ferruginea, capite pedibusque anticis atris.

Pupa folliculata, atra, postice flavo-fasciata.

Fa-

*) So wird sie hier als ein *Spannmesser* angesehen, weil man vermuthlich die *haarrichte Raupe* nicht gesehen oder gekannt hat.

Fabric. Reiſe durch Norw. p. 334.
Noctua *Fuliginoſa.* *)

Müller Faun. Fridr. p. 43. no. 381. Phal. N. *Fuliginoſa.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1382. Ph. N. *Fuliginoſa.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 37. f. 7. 8.

96. *Fulvia*, die *indianiſche löwenfarbige Eule.*

Müller l. c. p. 682. no. 96. die *Löwenhaut.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 29. NOCTUA *Fulvia.* Nom. *Linn.*

Cramer Pap. exot. III. p. 101. t. 251. Fig. F. Ph. N. *Fulvia* (Mas) — à *Suriname.*

Sebae Theſ. IV. t. 31. f. 11. 12. t. 43. f. 27. 28.

97. *Batis*, das *Braunauge.*

Müller, l. c. p. 682. no. 97. das *Braunauge.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 697. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 204. no. 3. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte.*

Die *Oberflügel* braun mit fünf weiſſen ins Fleiſchfarbige vertriebenen Flecken.

Wie-

*) Nach Propſt *Ströms* Erfahrungen kömmt die Larve derſelben in manchen Jahren häufig des Winters auf dem *Schnee* zum Vorſchein, und alsdann folgten kalte naſſe Jahre, und ein hieraus entſtehender Miſswachs.

Das erſte geſchiehet auch in unſern Gegenden, daſs die Larve im Winter, wenn warme Sonnenblicke kommen, als ein *Winterſchläfer*, erſcheint, und wenn wieder Kälte erfolgt, auch wieder beykriecht.

Wien. Schmetterl. p. 71. F. *Rinderaupen*, Larvae *Corticinae. Fleckige Eulen;* Phal. N. *maculatae.*

3) Die *Raupen mit einer ſtumpfen Erhöhung.*

No. 7. *Brombeereulenraupe* (Rubi fruticoſi); *Brombeereule;* Ph. N. *Batis.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 118. no. 335. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte*, das *Braunauge.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 181. t. 26. f. A B C.

Die zur 2 Kl. der N. V. gehörige hökrichte, braune *Raupe* mit dem getheilten Kopfe, und einem paar in die Höhe ſtehender Zapfen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 836. no. 1. Ph. *Batis*, der *Brombeervogel.*

— — p. 1019. no. 4. Ph. *Batis*, die *glatte Brombeermotte mit braunen weißpunktirten Oberflügeln, und weiſſen Unterflügeln.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 320. Ph. *Batis*, der *Hindbeervogel.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 28. NOCTUA *Batis.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, ferruginea, antice poſticeque gibba.

Pupa poſtice attenuata, fuſca.

98. *Algira*, die *algiriſche Eule.* *)

Müller l. c. p. 683. no. 98. der *Graurand.*

99. *Trapezina*, der *Tiſchfleck.*

Müller l. c. p. 683. no. 99. der *Tiſchfleck.*

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 12. Phal. *Trapezina* —

Ihre Larven freſſen gern andere Larven oder *Raupen.* (Chorh. *Meyer.*)

Ber-

*) *Nicht abgebildet.*

Berlin. Magaz. III. p. 296. no. 44. Ph. *Rhombica*, das *verſchobene Viereck.*

Röthlichgrau, mit einem groſsen verſchobenen *Viereck*, in deſſen Mitte ein ſchwarzer Punkt.

Naturforſcher IX. p. 118. no. 44. Phal. *Rhombica* (von *Rottemb.*).

Wien. Schmetterl. p. 88. T. *Mordraupen*, Larvae *Larvicidae; gewäſſerte Eulen;* Phal. Noct. *Vndatae.*

No. 13. *Ahorneulenraupe* (Aceris campeſtris); *Ahorneule*, N. *Trapezina.*

Fabric. S. E. p. 600. no. 41. *Noctua Trapezina.* Nom. *Linn.*

100. *Ocularis*, das *italiäniſche Weiſsauge.**)

Müller l. c. p. 683. no. 100. das *Weiſsauge.*

Füeſsl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 698. Phal. *ocularis*, das *Weiſsauge.*

Die *Raupe* auf den Pappelbäumen; nicht *häufig.*

101. *Sanguinolenta*, der *Blutkörper.* **)

Müller l. c. p. 683. no. 100. der *Blutkörper.*

102. *Lucernea*, der *Lichtflieger.*

Müller l. c. p. 683. no. 101. der *Lichtflieger.*

Wien. Schmetterl. p. 71. ***)

Ph. N. *Lucernaria.*

Fiſchers

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) Zu den *Wellenſtrichraupen*, Larvae *Vnda-toſtriatae, glänzende Eulen*; Ph. N. *familiares.* Die V. aber ſind noch ungewiſs, ob ſie die rechte haben, da die ihrige nur *zwo* oder *fünf* düſtere Linien hat.

Fiſchers N. G. von Livl. p. 153. no. 361. Ph. *Lucernea*, der *Lichtflieger.*

Den *Bienenſtöcken* ſehr nachtheilig.

Fabric. (Othon.) Faun. Grönland. p. 194. no. 145. Ph. *Lucernea.* Nom. *Linn. Gröul.* Lios-Fluga. Habitat in *domibus*, minus frequens.

103. *Narbonea*, die *portugieſiſche Doppelſtreife.* *)

Müller l. c. p. 684. no. 103. der *Portugieſe.*

Fabric. S. E. p. 595. no. 31. NOCTUA *Narbonea.* Nom. *Linn.*

Strigae duae lineares in medio alae. Ante marginem poſticum punctum fuſcum, annulo dimidiato luteo cinctum.

104. *Pellex*, der *Queerfleck.*

Müller l. c. p. 684. no. 104. der *Queerfleck.*

Cramer Pap. exot. I. p. 23. t. 15. **) Fig. E. Phal. *Arne* — à *Suriname.*

105. *Glyphica*, der *Bilderflügel.*

Müller l. c. p. 684. no. 105. der *Bilderflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 699. Ph. *glyphica.*

In den *Wieſen* nicht ſelten.

Berlin. Magaz. III. p. 206. no. 5. Ph. *glyphica*, die *Schnellmotte.*

Hellbraun mit dunkelbraunen Flecken; die Unterflügel oraniengelb mit braunen Adern, und zwo braunen Queerſtreifen.

Klee-

*) *Nicht abgebildet.*

**) Wenig verſchieden. Bey den *Linnéiſchen* haben die Unterflügel in der Mitte einen weiſsen Anſtrich; dieſe aber an den Aufsenwinkeln derſelben einen weiſsen Fleck.

Kleemanns Beytr. I. p. 206. t. 25.
Die bräunlichgelbe, braungeſtreifte, mit 14 Füſsen beſetzte glatte *Spannenraupe.* *)

— Raupenkal. p. 25. no. 56. Ph. *glyphica*, der *Bilderflügel.*

— — p. 92. no. 265.

Wien. Schmetterl. p. 94. A. a. *Schlangenraupen*, Larvae *Serpentinae; ſpannerförmige Eulen*, Ph. N. *Geometriformes.*
2) mit braungelben, düſterneblichten Unterflügeln.
No. 5. *Wieſenkleeeulenraupe* (Trifolii pratenſis); *Wieſenkleeeule*, Ph. N. *glyphica.*

Schaeff. Icon. t. 163. f. 4. 5.

Syſtem. Natur. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 38. *Phalene*, qu'on trouve dans les *paturages.*
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, ſupra fuſcis, pone ſubtusque flaveſcentibus.

Fabric. S. E. p. 598. no. 31. NOCTUA *glyphica.*
Alis deflexis, cinereo-fuſcoque variegatis, ſubtus luteis, fuſco-faſciatis.

Geoffr. Inſ. II. p. 136. no. 55.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, ſupra fuſcis, pone ſubtusque flaveſcentibus.
La *doublure jaune.* *Long.* 6. lign.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1385. Ph. *Glyphica.* Nom. *Linn.*

Degeer

*) Die ganze Beſchreibung, inſonderheit die okergelben Unterflügel, kommen mit der Linnéiſchen überein. Die Raupen der Klaſſe, wozu dieſe Eulen gehören, ſind auch, wie die Wiener ſagen, *Schlangenraupen*, und die Eulen *Spannerförmige*, Geometriformes. *Füeßlin* hat den Kleemann ſelbſt bey dieſer Glyphica zitirt, und *letzterer* hat ſich ſelbſt im Raupenkal. p. 25. no. 56. dabey angeführt.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 286. *)
Réaumur Inſ. II. Mém. 14. p. 603. ed. 4.

106. *Mi*, das *ſchwarze M.* **)

Müller l. c. p. 684. no. 106. *das M.*
Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 700. Phal. *Mi, das M.*
Bey uns nicht ſelten in den *Wieſen.*
Berlin. Magaz. II. p. 412. no. 27. Phal. *Graminis*, der *Grasvogel.*
Braun, mit hellen weiſslich gelben Flecken.
Naturforſcher VIII. p. 105. no. 27. Ph. *Graminis.* (von *Rottemb.*)
Wien. Schmetterl. p. 94. A a. No. 4. *Sichelkleeeulenraupe* (Medicaginis falcatae); *Sichelkleeeule*, Ph. N. *Mi.*

107. *Pallens*, der *Bleicher.*

Müller l. c. p. 684. no. 107. der *Bleicher.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 701. Ph. *pallens.* Bey uns *ſelten.*
Maders (Kleem.) Raupenkalend. p. 91. no. 261. die glatte, hellblaſſe, ſchlechtbräunliche — *Raupe.*
Röſels Inſektenbel. III. p. 431. t. 71. f. e. 11. f. e. 12. Die auf dem Sauerampfer lebende glatte und fleiſchfarbige *Raupe*, mit grünen und ſchwarzen unterbrochenen Linien.
Kleemanns Beytr. I. p. 197. t. 24. die glatte, hellblaſſe, ſchlechtbräunliche, mit einem graubrau-

 nen

*) Die Raupen bleiben ohne die mindeſte Nahrung 9 Monat im Geſpinnſte, ehe ſie ſich verpuppen: vom September bis zum Junius des folgenden Jahres. Zu Ende des Julius erſcheint der Vogel.

**) *Nicht abgebildet.*

nen ſchwarz bezeichneten Kopfe, braungrauen Rücken und Seitenlinien verſehene *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 85. Q. *Vielſtrichraupen*, Larvae *Arctoſtriatae; tagliebende Eulen*, Ph. N. *Heliophilae.*

2) Ohne Queerſtriche.

No. 10. *Butterblumeneulenraupe* (Leontodontis Tarax.) *Butterblumeule*, Ph. N. *Pallens.* *)

Naturforſcher IX. p. 117. no. 42.

Phal. *l. album; Comma; Pallens*, einander ſehr ähnlich. (von *Rottemb.*) **)

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1387. Phal. *Pallens.* Nom. *Linn.*

108. *Nivea*, die *Schneeeule.* ***)

Müller l. c. p. 685. no. 108. die *weiſſe Eule.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 39. NOCTUA *nivea.* Nom. *Linn.*

Mül-

*) Mit derjenigen, die *Kleemann* vom *Sauerampfer* (Rumex acetoſa) t. 24. erhalten, *einerley*, obſchon die Farbe der unſrigen merklich und ſtandhaft unterſchieden iſt.

**) Die *genaue* Beſchreibung der Ph. *Pallens* verdient hergeſetzt zu werden:

„Die braunen Adern der Oberflügel ſehr fein und blaſs. Statt des ſchwarzen Strichs an der Einlenkung nur ein länglicher ſchwarzer Schatten; der weiſſe Strich fehlt gänzlich. Nicht weit vom äuſsern Rande vier *kleine ſchwarze Punkte*, welche ein ziemlich groſses reguläres Viereck ausmachen, das gegen die Flügel folgende Stellung . . hat. Die beyden oberſten Punkte ſehr klein, kaum ſichtbar, die beyden unterſten ſehr deutlich.“

Nach dieſer Beſchreibung wird es zweifelhaft, ob die *Kleemanniſche* Eule t. 24. die wahre *Pallens* L. ſey.

***) *Nicht abgebildet.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1383. Ph. *nivea*. Nom. *Linn.*

109. *Leporina*, die *Wolleule*.

Müller l. c. p. 685. no. 109. der *Aderpunkt*.

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 702. Phal. *Leporina*, der *Aderpunkt*.

Etwas ſelten auf *Birken*.

— Magaz. der Entomol. II. p. 16. t. 1. f. 1. Raupe; f. 2. Puppe; f. 3. *Schmetterling*. (Füeſsl.) *).

Berl. Magaz. III. p. 208. no. 7. Ph. *Leporina*, die *Wollmotte*.

Ganz weiſs, mit verſchiedenen, kurz abgeſetzten irregulären Strichen.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 555. no. 7. Ph. *Leporina*, die *Wollmotte;* das *ganz weiſſe glatte Nachteulchen*.

Naturforſcher XIII. p. 225. no. 2. die *rare gelbe Pudelraupe* — alle Herbſte auf den *Weiden*. (D. *Kühn.*)

Wien. Schmetterl. p. 67. B. *Scheinſpinnerraupen*, Larvae *Bombyciformes; düſtere Eulen*, Ph. N. *Nubilae*.

3) Raupen ſehr lange Haare *ohne Knöpfe*.

No. 8. *Erleneulenraupe* (Betulae Alni); *Erleneule*, Ph. *Leporina*.

*) Hat daſelbſt, wie auch der Chorherr Meyer, die ganze Verwandlungsgeſchichte dieſer merkwürdigen Phaläne geliefert. Von den Raupen ſagt *Füeßlin*:

„Keiner hat die ſonderbare und ſtandhafte Richtung der *langen Haare* dieſer Raupe bemerkt und angezeigt. Sie laufen nämlich in einem Kreiſe um den Leib der Raupe herum, ſo daſs die der linken Seite vom Kopf bis zum Schwanz mit ihrer Spitze nach dem Hintern, die der rechten Seite aber nach dem Kopfe zu gebogen und gerichtet ſind, t. 1. f. 1.“

Liſt. Goed. p. 199. no. 85. f. 85. *)

Degeer Inſ. I. Mém. 6. p. 210. t. 12. f. 11-17.

Chenille extrémement velue, d'un jaune de citron ou verdâtre, dont les poils ſont très-longs, et qui vit ſur le *Saule* et ſur *l'Aune.*

— — p. 699. t. 12. f. 17.

Phalene à antennes en filets, très-blanche à points et taches noires.

— Tom. II. Part. I. p. 411. no. 3. Phal. *Leporina.*

Phalene à antennes filiformes à trompe, à ailes rabatues en toit evaſé blanches avec quelques points et taches noires.

Phalene flocon de laine.

— *Ueberſ.* I. 2 Quart. 6 Abh. p. 4. t. 12. f. 11-17.

Die ſehr rauche, langhaarichte, zitron- oder grünlichgelbe *Weiden- und Erlenraupe.*

— — 4 Qu. p. 122. t. 12. f. 17.

Ein ſehr weiſser *Nachtvogel* mit ſchwarzen Punkten und Flecken, und fadenförmigen Fühlhörnern.

— — II Th. I B. p. 297. no. 3.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern; einem Saugrüſſel, mit flachniederhangenden weiſſen Flügeln, die einige ſchwarze Punkte und Flecke haben.

Die *Wollflocke.*

110. *Ornatrix*, die *amerikaniſche geſchmückte Eule.*

Müller l. c. p. 685. no. 110. das *Feſtkleid.*

Fabric.

*) *Goedart* iſt der erſte, der dieſe Raupe beſchrieben und abgebildet hat. *Eruca* haec Alnorum alitur foliis; totum ejus corpus hirſutum, et ſetis quaſi exiguis ac piloſis obſitum eſt.

Fabric. S. E. p. 586. no. 103. BOMB. *Ornatrix.* Nom. *Linn.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. I. p. 51. t. 24. f. 2. — de la *Jamaïque.* — Ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Cramer Pap. exot. II. p. 107. t. 166. Fig. CD. *Foemina.* Fig. F. *Mas* — dans *l'Amérique ſeptentrionale et méridionale.*

Sebae Theſ. IV. t. 39. f. 19. 20.

III. *Jacobaeae*, die *Jakobseule.*

Müller l. c. p. 685. no. 111. die *Jakobäerin.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 703. Ph. *Jacobaeae*, die *Jakobsmotte.* Die Raupe auf dem *Jakobenkraut.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 20. Phal. *Jacobaeae.*

Die jungen *Raupen* mit mehr weiſslichen, zum Theil ſehr langen Haaren beſetzt, als die Erwachſenen (Chorh. *Meyer*).

Berlin. Magaz. III. p. 206. no. 6. Ph. *Jacobaeae*, die *Jakobsmotte.*

Dunkelgrau mit einem rothen Streif am Vorder- und Hinterrande. Die Unterflügel ganz karminroth.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 330. Phal. *Jacobaeae*, *Jakobsmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 268. t. 49. *das ſchöne Jakobsräuplein.*

Linné Reiſe durch Oeland p. 133. Ph. *Jacobaeae.*

Wien. Schmetterl. p. 67. C. *Spindelraupen.* Larvae *Fuſiformes*; *ſchabenartige Eulen*, Ph. N. *Tineiformes.*

No. 12. *Jakobsblumeulenraupe* (Senecionis Jacobaeae); *Jakobsblumeule*, Ph. *Jacobaeae.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 111. Phal. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 378. Ph. *Jacobaeae*, der *Jakobsraupenvogel.*

Catholl. J. p. 12. Ph. *Jacobaeae*, *Jakobsblumeule.*

Syſtem. Natur. du Regn. Anim. II. p. 155. no. 59. *Phalène du Senecon.*

Charlet. Onom. p. 83. *Eruca Jacobaea.*

Petiv. Gazoph. p. 52. t. 33. f. 6.

Phalaena ombrica, linea maculisque ſanguineis.

Derham Phyſico-Theol. l. 8. c. 6. no. 6. *Papilio Jacobea.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 168. no. 26.

Phalaena media, alis exterioribus, colore nigro et ſanguineo variis, extimo duntaxat margine nigro.

— — p. 169. no. 26. *Eruca* glabra ex nigro et flavo annulatim variegata.

Scop. Entom. carn. p. 207. no. 511. Ph. *Jacobeae.* *Long.* lin. 8. *Lat.* $4\frac{3}{4}$.

Alae *anticae* canae; linea maculisque binis cinnaberinis. *Poſticae* cinnaberinae, fimbria fuſceſcente, terminali.

Statura *Sphingis Phegeae.*

Fabric. S. E. p. 588. no. 113. BOMBYX *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

Larva ſubpiloſa, atra, flavo-annulata.

Pupa tenuiſſime folliculata, teſtacea.

Müllerí Faun. Fridr. p. 43. no. 380. Ph. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1384. Ph. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 146. no. 75.

Pha-

Phalaena feticornis ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis, linea punctisque duobus rubris, inferioribus rubris.

La *Phalene Carmin du Senecon.*

Long. 8. lign.

Biblioth. reg. Pariſ. p. 36. f. *omnes.*

112. *Heliconia*, die *Helikonierin.* *)

Müller l. c. p. 685. die *Helikonierin.*

Cathol. H. p. 102. Phal. N. *Heliconia.*

Linn. Muſ. L. V. p. 385. no. 20. Ph. *Heliconia.*

Corpus magnitudine Ph. *Jacobaeae.*

Thorax flavus, a tergo maculatus.

Abdomen flavum trifariam (dorſo et lateribus) fuſco-maculatum.

Antennae et *pedes* fuſci.

Alae primores utrinque ſubfuſcae.

Linea alba, longitudinalis, verſus apicem craſſior, a baſi ad medium alae.

— *poſticae* albae a baſi ad medium, fuſcae a medio ad apicem.

113. *Rubricollis*, der *Purpurhals.*

Müller l. c. p. 685. no. 113. der *Purpurhals.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 704. Phal. *Rubricollis*, der *Rothhals.*

Berlin. Magaz. III. p. 208. no. 8. Ph. *Rubricollis*, der *Rothhals.*

Ganz ſchwarz, mit *einer rothen Halsbinde*, und einer gelben Spitze an dem Hinterleibe.

Wien. Schmetterl. p 67. C. No. 11. *Aftermooseulenraupe* (Jungermanniae complanatae); *Aftermooseule*, Ph. *Rubricollis.*

*) *Nicht abgebildet.*

Schaeff. Icon. t. 59. f. 8. 9.

Fabric. S. E. p. 587. no. 110. BOMBYX *Rubricollis.*
Alis incumbentibus, atra: *collari ſanguineo;* abdomine flavo.
Habitat in Europae *Sylvis.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 42. no. 379. Ph. *Rubricollis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1388. Ph. *Rubricollis.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 148. no. 79. t. 12. f. 6.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis nigricantibus; *collari purpureo*, abdomine flavo.
La *Veuve.*
Long. 8 lign.

114. *Quadra*, der *Vierpunkt.* *)

Müller l. c. p. 686. no. 114. das *Viereck.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 705. der *Vierpunkt.* Phal. *Quadra.*
Bey uns etwas ſelten. Bey *Bern* ſehr häufig auf den Roſskaſtanienbäumen.

Berlin. Magaz. III. p. 208. no. 9. Ph. *Quadra*, die *Stahlmotte.* — p. 420. B.
Das *Weibchen* ſtrohgelb mit zwey ſtahlblauen Flecken; das *Männchen* graugelb mit einem blauen Vorderrande.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 13. no. 13. Phal. *Quadra*, das *Viereck;* der *Würfelvogel;* der *Strohhut.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 110. t. 17. *Weibchen.*
Die graue, gelb- und ſchwarzgeſtreifte haarige *Raupe*, mit rothen Knöpfgen.

Gle-

*) *Linné* hat das *Weibchen* beſchrieben.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 502. no. 3. — p. 647. no. 14. Phal. *Quadra*, die *Stahlmotte.*

Wiener Schmetterl. p. 68. C. No. 1. *Pflaumeneulenraupe* (Pruni domeſticae); *Pflaumeneule*, Phal. *Quadra.*

Gladbachs Schmetterl. p. 50. t. 22. f. 5. 6. Ph. *Quadrata foemina;* der *Würfelvogel;* das *Viereck* (Weibchen). *)

Naturforſcher III. p. 20. no. 3. das *Männchen* gegen das W. ſehr klein, von blaſsgelbgraulicher Farbe, die nach dem Kopfe und dem Aufsenrande der Oberflügel zu ins Schwärzliche oder *Stahlblaue* fällt — hat auch keinen ſchwarzen Würfelfleck auf den Flügeln (D. *Kühn*).

— IX. p. 111. no. 9. Ph. *Quadra.* (von *Rottemb.*)

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 405. Ph. *Quadra.*

Scop. Entom. carn. p. 210. no. 519. Phal. *Quadra.*

Long. lin. 11½. *Lat.* 4½.

Alae unicolores, anticae lanceolatae, rotundatae, maculis binis cyaneis (*Foemina*).

Variat 1) alis *ſtramineis*, antennis pedibusque cyaneis.

2) — *cereis.*

3) — *albis.*

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 114. no. 123. Ph. *Quadra.* In *Hungaria* variat margine alarum poſticarum

*) *Gladbach* behauptet ohne Grund, *Röſel* l. c. habe das *Männchen*, er aber das *Weibchen* beſchrieben und abgebildet. Die Sache iſt gerade umgekehrt. Einige Naturforſcher behaupten auch, Ph. *complana* L. ſey das *Männchen* von Quadra. *Linné* ſagt aber von der Complana: der Aufsenrand ſey weiſs.

carum interiore, *macula alae ejusdem*, et *margine exteriore ſubtus*, RUBRIS.

Fabric. S. E. p. 595. no. 19. NOCTUA *Quadra.*

— anticis punctis duobus cyaneis.

Larva piloſa: dorſo punctis rubris maculaque nigro, lateribus lineis nigris.

Pupa folliculata, atra.

Schaeff. Icon. t. 29. f. 9. 10.

Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 382. Phal. *Quadra.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1389. Phal. *Quadra.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 154. no. 89.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis flaveſcentibus, ſuperioribus ſingulis punctis duobus fuſcis.

La *Phalene jaune à quatre points.*

Long. 6. lign.

115. *Complana*, der *Flachflügel.* *)

Müller l. c. p. 686. no. 115. der *Flachflügel.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 706. Phal. *Complana*, der *Flachflügel.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 647. no. 15. Phal. *Complana*, die *Randmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 210. no. 10. Ph. *Complana*, die *Randmotte.*

Gelbgrau mit einem *goldgelben Vorderrande*, und dergleichen Unterflügeln.

Wien. Schmetterl. p. 68. C. No. 4. *Pappelbaumeulenraupe* (Populi albae); *Pappelbaumeule.* Ph. *Complana.*

Fabric.

*) Einige halten dies für das *Männchen* von Ph. *Quadra.*

Fabric. S. E. p. 594. no. 18. NOCTUA *Complana.*
Alis depreſſis, plumbeis, margine exteriori pallidis —
Varietatem vidi alis *anticis* totis pallidis.
Geoffr. Inſ. II. p. 191. no. 22.
Tinea alis albis, corpori circumvolutis; capite collarique flavis.
Le *Manteau à tête jaune.*
Long. 7 lign. *Larg.* $1\frac{1}{3}$ lign.
Réaum. Inſ. I. t. 17. f. 13. 14.

116. *Interrupta*, die *afrikaniſche unterbrochene Schwarzlinie.*

Müller l. c. p. 686. no. 116. der *Fleiſchflügel.*
Sulzers Geſch. p. 161. t. 22. f. 3. Ph. *interrupta*, die *Unterbrochene.*
Cathol. I. p. 284. Ph. *interrupta.*
Cramer Pap. exot. II. p. 136. t. 185. Fig. E. Ph. *Interrupta.* — *Coromandel.*

3. *Eulen* mit Saugrüſſel und *Kammrücken* (*Kammſauger*).

117. *Materna*, das *indianiſche Waiſenkind.*

Müller l. c. p. 686. no. 117. das *Waiſenkind.*
Drury Illuſtr. of nat. hiſt. II. p. 24. t. 13. f. 4. Ph. *Materna* — de *Bengal.*
— Ses ailes presque quatre pouces.
Cramer Pap. exot. II. p. 118. t. 174. Fig. B. Ph. *Materna* — à *Suriname.*

118. *Sponſa*, die *Braut.*

Müller l. c. p. 687. no. 118. die *Braut.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 707. Ph. *Sponſa*, die *Braut*.

Bey uns *etwas ſelten*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 23. no. 47. Ph. *Sponſa*, die *Braut*, das *Wieskind*.

Röſels Inſektenbel. IV. p. 137. t. 19. *)

Eine zur zweyten Kl. der N. V. gehörige weiſsgrau und braungefleckte, und mit fleiſchernen Spitzen und Warzen ausgezierte *Raupe*, auf dem Eichenlaube.

Wien. Schmetterl. p. 90. X. *geſchmückte Eulen*.

2) mit rothen Unterflügeln.

No. 5. *Rotheicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Rotheicheneule*, Ph. *Sponſa*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 13. Phal. *Sponſa*, *Rotheicheneule*.

Hollar Inſ. t. 8. f. 6. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Sponſa*.

Naturforſcher IX. p. 112. wo der Hr. v. *Rottemb.* auch noch glaubt: *Röſel* I. t. 15. Ph. 2. habe die wahre *Pactam* L.

— *Sponſa* L. *Röſel* IV. t. 19. wird oft mit *Nupta* verwechſelt.

Fabric. S. E. p. 602. no. 51. NOCTUA *Sponſa*. Nom. *Linn.*

Larva nodoſa, dorſo verrucoſo, capite coeruleſcente, corpore variegato.

Pupa folliculata, coeruleſcens.

Geoffr. Inſ. II. p. 150. no. 82.

Pha-

*) Sponſa und Nupta werden häufig verwechſelt; daher hat auch *Scop.* no. 509. bey ſeiner Pacta, welches eigentlich Nupta L. iſt, *Röſels* IV. t. 19. angeführt.

Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis; *anticis* cinereo-fuſcoque nebuloſis; *inferioribus* rubris, faſcia duplici transverſa, nigra.

La *Likenée rouge.*

Long. 18 lign.

Biblioth. Reg. Pariſ. p. 11. no. 1. 2. 3.

Leche nov. Inſ. ſpec. p. 35. no. 73.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis cinerea; alis inferioribus faſcia purpurea nigraque alterna. f. 10. A. B.

119. *Nupta*, die *junge Frau.* *)

Müller l. c. p. 687. no. 119. die *junge Frau.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 708. Ph. *Pacta*, die *Verlobte.* **)

Bey uns etwas ſelten, *auf Weiden und Linden.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 21.

Phal.

*) Dieſe und die folgende *Pacta* ſind faſt von allen Schriftſtellern verwechſelt, und alle Zitata, welche der erſten gehören, der letzten gegeben worden. Hat doch *Linné* ſelbſt *Röſels* I. N. V. 2 Kl. t. 15. bey beyden angeführt. Die meiſten haben ſich darinn geirrt, daſs ſie die *Röſelſche* Phaläne für die wahre *Pactam* Linn. angeſehen haben, da doch dieſe letztere in Deutſchland entweder gar nicht, oder äuſserſt ſelten anzutreffen iſt. Bey *Petersburg* und in dortigen Gegenden ſoll ſie häufiger ſeyn. Sie iſt der Nupta in allem ſehr ähnlich, hat aber doch einen vom *Linné* ſelbſt richtig angegebenen Unterſcheidungskarakter. Die *Nupta* hat allezeit abdomen canum, ſubtus album, wie beym *Röſel*, *Schäffer*, *Sepp*, und andern, die ſie abgebildet haben; die *Pacta* aber *abdomen ſupra rubrum.* Wer dieſes Merkmal an ſeinem Exemplar findet, der kann ſich rühmen, die wahre *Pactam* L. zu beſitzen. Dieſe iſt auch ein gut Theil *kleiner* als die Nupta, und Herr *Schaller* in Halle ſoll ſie beſitzen.

**) Keine andere, als *Nupta* L. den beygefügten Zitatis zu Folge.

Phal. *Pacta* (Röſels I. N. V. 2. t. 15. Chorh. *Meyer*). (Ebenfalls Nupta.)

Berlin. Magaz. III. p. 210. no. 12. Ph. *Pacta*, die *Schlangenmotte.*

Die *Oberflügel* hellgrau, mit dunkelgrauen Zeichnungen. Die *Unterflügel* roth mit breitem ſchwarzen Rande.

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 12. no. 11. Ph. *Nupta*, die *junge Frau.*

Röſels Inſektenbel. I. p. 97. t. 15. die groſse ſchlanke erdfarbige *Zapfenraupe.*

Altes Hamb. Magaz. XIIX. p. 116. beygef. K. T. f. 1. 2. 3. Beſchr. der *Pappelweidenraupe und ihres Nachtvogels* (*Schulze*).

Der *Hinterleib* mit aſch- und dunkelpurpurfarbnen; der ganze Unterleib aber mit *ganz weiſſen* wollichten Haaren bedeckt *).

Hollar Inſ. t. 4. f. 3. 4. Ph. *Nupta.* (*Naturf.* IX. p. 222.)

Naturforſcher IX. p. 112. no. 10. Phal. *Pacta.***)

Wien. Schmetterl. p. 90. No. 4. *Bachweideneulenraupe* (Salicis vitellinae); *Bachweideneule*, Ph. *Nupta.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 153. no. 362. Ph. *Nupta*, die *Verlobte.*

Allgem. deutſche Biblioth. XXVI. p. 11.

Nach

*) Alſo keine von der *Röſelſchen* verſchiedene Gattung, wie der V. meint, ſondern nach Linn. Karakter: Abdomine cano, ſubtus albo, oder die wahre *Nupta.*

**) Hierbey ſagt Hr. v. *Rottemb.* ganz richtig: daſs *Hufnagel* unter ſeiner Pacta die *Linnéiſche Nupta* beſchrieben habe; zugleich verſichert er: daſs die wahre *Pacta* L. auſserordentlich ſelten ſey, und er ſelbige noch nie geſehen habe; es ſey aber die *Röſelſche* I. N. V. 2. t. 15. worinn ſich dieſer groſse Kenner geirrt hat.

Nach *Bernoullis* Bemerkungen ſoll das Weibchen derſelben Eyer legen, aus welchen ohne Befruchtungen *junge Raupen* kommen *).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 648. no. 16. Phal. *Pacta*, die *Schlangenmotte* (Hufnag. alſo *Nupta*).

Raj. Hiſt. Inſ. p. 152. no. 4.

Phalaena magna pulcherrima, alis longis, exterioribus cinereo et nigro, interioribus nigro et rubro ſeu phoeniceo coloribus variis.

Scop. Entom. carn. p. 206. no. 509.

Phalaena *Pacta.* **)

Long. Unc. 1. et lin. 6. *Lat.* 10½.

Alae crenatae; *anticae* cineraſcentes, faſciis undatis fuſcis; *poſticae* cinnaberinae, faſciis duabus nigricantibus. — *Corpus cinereum.*

Fabric. S. E. p. 602. no. 52. NOCTUA *Nupta.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 151. f. 1. 2.

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 33. t. 7. het *Roode Weeskind.*

Cramer Pap. exot. I. p. 53. t. 33. Fig. BC. Ph. *Ilia* ***)

— de la *Jamaïque.*

Merian. Europ. p. m. 71. t. 139.

La Chenille s'eſt nourrie de *Saule*, jusqu'au vingt deuxieme de Juillet; — le troiſieme d' Août il en ſortit un beau Papillon nocturne *gris et rouge.* †)

120. *Pa-*

*) Ihre Raupe iſt den Schlupfweſpen aber ſehr unterworfen. S. *Röſels* I. N. V. 2. p. 99. Note **).

**) Alſo auch keine andere, als die *Nupta.*

***) Die Kramerſche hat viel ähnliches mit der Nupta, obgleich dabey *Pacta* L. zitirt iſt. Das Abdomen iſt völlig *cinereum*, alſo nicht die wahre *Pacta* L.

†) Abermal *Nupta* L.

120. *Pacta*, die *Verlohte.* *)

Müller l. c. p. 687. no. 120. die *Verlohte.*

Wien. Schmetterl. p. 90. No. 3. *Baumweideneulenraupe* (Salicis albae).

La *Chenille lichenée. Réaum. Baumweideneule*, Ph. *Pacta.*

L' *Orpheline rouge. Seba* **).

— — p. 78. (*)

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 13. Phal. *Pacta.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 392. Ph. *Pacta.*

Fabric. S. E. p. 602. no. 53. NOCTUA *Pacta.* Nom. *Linn.*

Müller i Faun. Fridr. p. 43. no. 384. Ph. *Pacta.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1392. Ph. *Pacta.* Nom. *Linn.*

121. *Pronuba*, die *Lichteule.* ***)

Müller l. c. p. 687. no. 121. die *Hausmutter.*

Füeßl.

*) S. meine Anmerk. bey *Nupta.*

Geſetzt, daſs die *Linnéiſchen* beyden Zitata mit Abbildungen: *Alb.* Inſ. 80. *Wilk* Pap. 17. t. 2. b. 1. die wahre *Pactam* L. bezeichneten, ſo wäre ſie denn doch noch von keinem *vaterländiſchen Schriftſteller abgebildet.*

**) Ich vermuthe ganz ſicher, daſs die *Chenille lichenée* des *Réaumur*, und l' *Orpheline rouge* des *Seba* keine andere, als *Nupta* L. ſey, welche *Sepp* auch das *Roode Weeskind* nennt.

***) Fliegt beſonders des Abends gern nach dem Lichte. Der *Flügelſtaub* iſt unter dem Mikroſkop ſehr ſehenswürdig. Sie iſt der Phal. *Domiduca Hufnagels* ſehr ähnlich; ſ. *Berl. Mag.* III. p. 404. no. 81, wie auch deſſen *Orbona* no. 57. nur iſt dieſe letztere viel kleiner. S. *Naturf.* IX. p. 125.

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 709. Ph. *Pronuba*, die *Brautjungfer.*

Die Raupe wohnt gern in *Gärten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 21. Phal. *Pronuba.* Raupe auf dem *Lattich.* (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Magaz. III. p. 210. no. 11. Ph. *Pronuba*, der *Läufer.*

Die *Oberflügel* dunkelbraun, bisweilen grau, mit einem nierenförmigen ſchwarzen Flecke; die *Unterflügel* gelb mit ſchwarzem Rande.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 11. no. 7. Ph. *Pronuba*, die *Hausmutter*; der Läufer.

Friſch Inſ. X. p. 17. no. 15. 3 Pl. t. 15.

Von der koffeebraunen *Erdraupe* mit ſchwarzen Strichen neben auf ſieben Abſätzen.

Röſels Inſektenbel. IV. p. 217. t. 32. die zu der N.V. 2 Kl. gehörige grünlichgelbe *Raupe*, mit abgeſetzten ſchwarzen Strichen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 746. no. 11. Ph. *Pronuba* der *Läufer.*

Wien. Schmetterl. p. 79. M. *Seitenſtreifraupen*, Larvae *Albilateres; ſchwarzgezeichnete Eulen*, Ph. N. *Atroſignatae.*

3) mit *ſchwarzen Punkten* am Aufſenwinkel, und gelben ſchwarzgerändeten *Unterflügeln.*

No. 20. *Sauerampfereulenraupe* (Rumicis acetoſae).

La Chenille de l'Oſeille. *Réaum. Sauerampfereule.* Ph. *Pronuba.*

La *Proſerpine. Seba.*

Der *Dronth. Geſellſch.* Schr. IV. p. 282. no. 38. Ph. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 121. Phal. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 156. no. 60. *Phalene* du Senecon, de l'Oreille d'Ours etc.

Act. Vpſal. 1736. p. 124. no. 60.

Papilio alis depreſſis griſeis, obſcure maculatis, inferioribus flavis, margine nigro.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 237. no. 18.

Phalaena maior, alis praelongis, *exterioribus* vel rufis, vel ex cinereo-nigricantibus; *interioribus* fulvis cum faſcia lata nigra prope imum marginem.

Schaeff. Icon. t. 196. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 210. no. 518. Phal. *Pronuba. Long.* lin. 11. *Lat.* 5.

Alae *anticae* pallide-cervinae, macula rotunda, media, fuſca, punctisque binis didymis atris prope apicem; *poſticae* paleaceae, faſcia nigra ſubmarginali.

Poda Muſ. graec. p. 90.

Fabric. S. E. p. 603. no. 55. NOCTUA *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Larva vireſcens, lineis dorſalibus duabus nigris, interruptis.

Pupa nuda, rubra.

Imago alarum anticarum colore valde variat.

Müllleri Faun. Fridr. p. 43. no. 385. Ph. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1393. Ph. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 146. no. 76.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis incumbentibus, *exterioribus* caeſiis nebuloſis; *interioribus* luteis, faſcia atra marginali.

La *Phalene-hibou. Long.* 1 pouce.

Merr. Pin. p. 198. no. 5.

Pha-

Phalaena maior cum exterioribus alis fuſcis, internis aureis, nigra linea fimbriatis.

Biblioth. Reg. Pariſ. p. 37. f. *omnes.*

Degeer Inſ. I. Mém. 3. p. 109. t. 5. f. 17. 18.

Chenille raſe, aſſez groſſe, brune, avec deux petits traits noirs ſur chaque anneau, et à trois rayes jaunâtres, qui vit de pluſieurs eſpeces de plantes.

— II. Part. I. p. 399. no. 1.

Phalene à antennes filiformes à trompe, à ailes croiſées brunes ou griſes, dont les inférieures ſont jaunes bordées d'une bande noire; *la grande eſpece.*

Grande Phalene-hibou.

— *Ueberſ.* I. 3 Abh. I Qu. p. 85. t. 5. f. 17. 18.

Die glatte, braune, ziemlich dicke und auf allerley Kräutern lebende *Raupe*, mit zwo kleinen ſchwarzen Linien auf jedem Ringe, und drey gelblichen Streifen.

— — p. 87. not. †. Phal. *Pronuba*, der *Läufer*; die *Hausmutter.*

— II Th. I B. p. 288. no. 1.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, braunen oder grauen gekreuzten Flügeln, und gelben, mit einer ſchwarzen Binde eingefaſsten Unterflügeln. *)

Die *große Nachteule.*

122. *Paranympha*, die *Brautjungfer.*

Müller l. c. p. 687. no. 122. die *Brautjungfer.*

*) Noch eine Merkwürdigkeit von den *Raupen.* Sie kommen nie bey Tage, ſondern nur des *Nachts* hervor, und freſſen die Kräuter ab. Man kann ſie leicht bey der Laterne finden. Eine Regel für die Gärtner. Sie überwintern auch in der Erde.

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 710. Phal. *Paranympha*, die *Brautführerinn.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 21. Phal. *Paranympha.*

Die groſse ſchlanke, graue *Raupe*, mit einem kleinen fleiſchernen Hörnchen auf dem achten Abſatze. — Auf einem *Zwetſchgenbaume.* (Chorh. *Meyer.*)

— — p. 270. t. 3. f. A B. *Raupe* und *Puppe*, (Füeſsl.) auf einem *Weißdornſtrauch.*

Berlin. Magaz. II. p. 406 no. 82. Phalaena *Manturna*, die *Spitzmotte.*

Hellgrau, mit Dunkelgrau gezeichnet, ſo zum Theil in auslaufenden Spitzen beſtehet. Die *Unterflügel* oraniengelb mit zwo ſchwarzen Binden.

Naturforſcher IX. p. 136. no. 82. Ph. *Manturna*, iſt Ph. *Paranympha* L. (von *Rottemb.*)

— XIV. p. 88. t. 4. f. 8. 9. Beſchreibung der *Raupe und Puppe* der Ph. *Paranympha* (Capieux).

Röſels Inſektenbel. IV. p. 132. t. 18. f. 1 2.

Ein zur N. V. 2 Kl. gehöriger *Nachtpapilion*, mit oraniengelben und ſchwarzbezeichneten *Unterflügeln.*

Wien. Schmetterl. p. 91. X. *Geſchmückte Eulen.*

3) mit gelben Unterflügeln, faſt ungezähnt.

No. 7. *Unbekannte Raupe. Zackenfleckichte Eule*, Ph. *Paranympha.*

Gladbachs Schmett. p. 70. §. 2. das *gelbe Ordensband.*

Scop. Entomol. carn. p. 206. no. 510. Phal. *Fulminea.*

Long. lin. $11\frac{1}{2}$. *Lat.* $6\frac{1}{2}$.

Alae

Alae *anticae* pallide cervinae, fascia macula lunata media, lineaque transversa fulminis ad instar propagata, nigris; *posticae* paleaceae, fasciis duabus fuscis.

Fabric. S. E. p. 603. no. 56. NOCTUA *Paranympha.* Crista ta, alis planis; *anticis* fuscis, strigis angulatis, albis nigrisque; *posticis* flavis, fasciis duabus arcuatis, atris.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 49. t. 23. f. 6. — de la *nouvelle York.* — Ses ailes *deux pouces* *).

123. *Fimbria*, die *besäumte Eule.*

Müller l. c. p. 688. no 123. der *Saumfleck.*

Füeßl. schweizer. Inf. p. 37. no. 711. Phal. *Fimbria*, der *Saumfleck.*

Naturforscher IX. p. 90. t. 1. f. 3. Von einer *gefräßigen Erdraupe.*

— Mit *olivengrünen* Oberflügeln, und viel *breitere dunkle indigblaue* Binde der *Unterflügel.*

Schriften der Berlin. Gesellsch. Naturf. Freunde I. p. 297. t. 8. f. 1-3.

Etwas von der Naturgeschichte der Ph. *Fimbria Linn.* (*Bergsträßer.*).

Phalaena Noctua *Parthenii*, alis deflexis, *anticis* griseo-fusco-viridique undatis, binisque in disco maculis, altera reniformi; *posticis* aurantiacis, fascia nigra submarginali et latiore.

Schreber nov. spec. Inf. p. 13. no. 10. f. 9. Phalaena (*Fimbriata*) feticornis spirilinguis, alis superioribus virente-carneis, inferioribus fulvis, fascia nigra marginali.

Halae *in der Heide* in betula.

*) Ganz der Habitus der *Paranympha* mit allen Karakteren, sogar den beyden Ohrflecken auf den Oberflügeln; nur die Farben derselben dunkelschwärzlich, purpurfarbig.

Wien. Schmetterl. p. 78. M. No. 18. *Schlüſſelblumeu-lenraupe* (Primulae Veris); *Schlüſſelblumeule*, Ph. *Fimbria.*

Fabric. S. E. p. 603. no. 57. NOCTUA *Fimbria.* Nom. *Linn.*

124. *Maura*, der *mauritaniſche Zahnflügel.*

Müller l. c. p. 688. no. 124. der *Zahnflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 722. Phal. *Maura.* Bey uns etwas *ſelten.*

Wien. Schmetterl. p. 90. X.
1) mit ſchwärzlichen Unterflügeln.
No. 1. *Unbekannte Raupe; dunkelolivenbraune Eule*, Phal. *Maura.*

Naturforſcher VI. p. 112. t. 5. f. 1. Lemur, das *Geſpenſt* (Meineke) *).

Gladbachs Schmetterl. p. 25. t. 12. f. 3. 4. das *ſchöne große ſchwarze Kind;***) der *Bachvogel;* der *Schiffvogel;* das *Geſpenſt.*
Gern an den *Waſſerbächen* im *Junio und Julio.*

Schaeff. Icon. t. 1. f. 5. 6.

Fabric. S. E. p. 604. no. 61. NOCTUA *Maura.*
Criſtata, alis incumbentibus, *dentatis*, cinereo nigroque variis, ſubtus margine albo.
In *Anglia frequens.*

125. *Fra-*

*) Hr. *Meineke* ſagt unter andern p. 114. Ph. *Nupta* kenne er nicht. Es habe zwar *Linné* dabey auf *Röſels* IV. t. 15. verwieſen; der Augenſchein aber lehre, daſs ſie daſelbſt nicht abgebildet ſey. Hr. M. hat ſich hier durch einen Druckfehler im *Linné* irre machen laſſen. Denn es muſs heiſſen: *Röſel* I. Ph. 2. t. 15. Und das iſt nach der *Linnéiſchen* Beſchreibung Ph. *Nupta* auſser allem Streit.

**) Zum Unterſchied des *kleinen ſchwarzen Kindes, Röſel* I. N. V. 2 Kl. t. 56. *Typica* L.

125. *Fraxini*, das *blaue Ordensband.*

Müller l. c. p. 688. no. 125. das *blaue Band.*

Füeßlins ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 713. das *blaue Band. Selten.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 190. t. 28. f. 1. (*Weibchen.*)
Der zur 2 Kl. N. V. gehörige, auſserordentlich groſse *Papilion*, mit grau gewäſſerten *Oberflügeln*, und hellviolettblauen und ſchwarzen *Unterflügeln.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 342. Ph. *Fraxini*, die *eigentliche Eſchenraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 90. No. 2. *Eſchenraupeneule* (Fraxini excelſioris); *Eſcheneule*, Ph. N. *Fraxini.* Auch auf den *ſchwarzen Pappelbäumen.*
L' *orpheline bleue. Seba.*

Naturforſch. XIV. p. 54. t. 2. f. 4. *Raupe.* (D. *Kühn.*)

Gladbachs Schmetterl. p. 69. t. 31. f. 1-5. Ph. *Fraxini* (*Männchen*).
Das *blaue Ordensband* mit ſeiner *Raupe*, *Geſpinnſt und Puppe.*
Eine *Waldraupe.*

Harriſ. t. 31. fig. d. e.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 369. Ph. *Fraxini.**)

Fabric. S. Ent. p. 602. no. 54. NOCTUA *Fraxini.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 151. no. 83.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, ſuperioribus cinereo fuſcoque undulatis, inferioribus nigris, faſcia transverſa coerulea.
La *Likenée bleue.*
Long. 2 pouces.

*) Es iſt falſch, wenn hierbey auf die Abbildung im 18ten B. des alten *Hamb. Magaz.* verwieſen wird. Denn dies iſt *Nupta* L. wie ſchon die *Raupe mit dem Rückenzapfen* beweiſet.

126. *Chryſitis*, die *Goldeule.**)

Müller l. c. p. 688. no. 126. der *Kupferflügel.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 714. die *Goldeule.* Ph. *Chryſitis.*

Etwas *ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 212. no. 13. Phal. *Chryſitis*, der Meſſingglanz.

Iſt auf den *Oberflügeln* ſo glänzend wie Meſſing, mit einer breiten gelbbraunen gewäſſerten Binde.

Wiener Schmetterl. p. 92. Z. *Halbſpannraupen*, Larvae *Semigeometrae; reiche Eulen*, Phal. N. *Metallicae.*

1) von mittlerer Gröſse.

No. 2. *Hanfneſſeleulenraupe* (Galeopſidis Tetrahit.); *Hanfneſſeleule.* Ph. N. *Chryſitis.*

Naturforſcher VI. p. 79. t. 3. f. 5. *Raupe;* f. 6. *Vogel.*

Von der *Raupe des Meſſingvogels.* (D. *Kühn.*)

— — IX. p. 112. no. 13. Ph. *Chryſitis.*

Die *Raupe* hat nur *zwey Paar Bauchfüße*, und gleicht ſehr der *Raupe* von Ph. *Gamma* (von *Rottemb.*).

— — X. p. 93. Ph. *Chryſitis.*

Die *Raupe* ſelten auf Neſſeln; häufiger unter den Blättern der *groſſen Kletten* (von *Scheven*).

Gladbachs Schmett. p. 9. t. 3. f. 5. 6. 7. f. 5. *Männchen;* f. 6. *Weibchen.*

Ph. *Chryſitis*, der *Meſſingglanz;* der *Meſſingvogel.*

Leske

*) *Röſel* hat dieſe Phaläne gar nicht. Daher iſt das Zitatum im *Linné: Röſel* I. Ph. 2. t. 31. oder 32. falſch. Denn erſtere iſt *Atriplicis*, die 2te *oleracea* L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 14. die *Goldeule.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 182. no. 45.

Phalaena media; alis exterioribus duplici arcu transverſo, *viridi - aurato*, ſerici inſtar ſplendente, inſignibus.

— — p. 183.

Eruca Geometra maiuscula, coloribus coeruleo-viridi et albicante varia.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 157. no. 65. *Phalene de la Menthe.*

Scop. Ent. carn. p. 210. no. 517. Ph. *Chryſitis.*

Long. $6\frac{1}{3}$. *Lat.* $4\frac{1}{2}$. lin.

Alae murinae; anticis faſciis binis *orichalceis.*

Fabric. S.E. p. 606. no. 69. NOCTUA *Chryſitis.*

Criſtata; alis deflexis, *orichalceis*, margine faſciaque griſeis.

Larva ſolitaria, gibboſa, viridis albo-ſtriata.

Pupa fuſca.

Müllerí Faun. Fridr. p. 43. no. 386. Phal. *Chryſitis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1394. Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 101. f. 2. 3.

Sepp Nederl. Inſ. V. p. 7. t. 1. f. 7—12.

De *Goud-Vlinder;* het *Koper-Kappelletje.*

Geoffr. Inſ. II. p. 149. no. 81.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis ferrugineo-fuſcis, faſcia duplici transverſa viridi-aurea.

Le *verd-doré.*

Long. 8. lign.

Degeer

Degeer Inſ. II. Part. I. p. 428. no. 2. *)

Phalene à antennes ſiliformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun clair griſeâtre, traverſées par *deux bandes dorées verdâtres.*

Phalene à bandes dorées.

— *Ueberſ.* II Th. 1 B. p. 311. no. 2.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und hellbraunen graulichen niederhangenden Flügeln, und *zwo goldgrünlichen Queerbinden.*

Die *Phaläne mit Goldbinden.*

127. *Gamma*, die *Gammaeule.*

Müller l. c. p. 688. no. 127. der *goldne Buchſtabe.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 715. das *griechiſche Gamma.*

Bey uns *ſehr häufig.*

Friſch Inſ. V. p. 37. no. 15. 2 Pl. t. 15.

Von dem *grünen Ausſpanner* mit den 6 weiſſen Rückenfäden und dem weiſſen Saum an der Seite, und mit den ſchwarzen Backenſtreifen.

Berlin. Magaz. III. p. 212. no. 14. Ph. *Gamma*, das *Ipſilon.*

Glänzend ſchwarzgrau, gelblich marmorirt mit einem *griechiſchen Gamma* oder *lateiniſchen Ipſilon.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 20. t. 5. Die dicke grasgrüne und weiſsgeſtreifte *Spannenraupe.*

— — p. 24. der *Piſtolenvogel;* der *Gammavogel.*

Na-

*) Der V. hat ſich darinn geirret, daſs er dabey *Geoffr.* II. p. 159. no. 97. Le *volant doré* zitirt hat; denn das iſt nicht *Chryſitis*, ſondern *Atriplicis* L.

Naturforſcher VI. p. 79. die *Raupe* ſehr gleich der Raupe der Ph. *Chryſitis.*

Wien. Schmetterl. p. 93. No. 5. *Zuckererbſeneulenraupe* (Piſi ſativi).

La Chenille de Legumes. *Réaum.*

Zuckererbſeneule. Ph. N. *Gamma.*

Neueſte Mannichfalt. IV. p. 334.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 371. Ph. *Gamma*, das *weiſſe griechiſche Gamma.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 127. Ph. *Gamma.* Nom. *Linn.*

Syſtem. Natur. du Regn. Anim. II. p. 156. no. 63. Le *Lamda*; le *Gamma doré.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 163. no. 16.

Phalaena e mediis minuſcula, alis exterioribus cinereo et nigricante colore variis, media parte linea alba, y litteram aliquatenus referente, notatis.

Scop. Ent. carn. p. 212. no. 523. Ph. *Gamma.*

Long. lin. 9. *Lat.* 5.

Alae anticae *Gamma graeco* albo inſcriptae.

Larva virens villoſula: lineis 2 dorſalibus pallidioribus. Pedibus pectoralibus 6; abdominalibus 4; caudalibus 2. *Subgeometra.*

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 125. Phal. *Gamma.*

Vel *Sphinx*, vel media ſane inter *Sphinges* et *Phalaenas*; fugit enim Nectar ex floribus *expanſis alis*, nec illis inſidet.

Fabric. Syſt. Ent. p. 607. no. 72. NOCTUA *Gamma.* Nom. *Linn.*

Larva geometra, dodecapoda, viridis; ſtriis dorſalibus albis, laterali flava, capite fuſco.

Pupa folliculata, brunnea.

Schaeff.

Schaeff. Icon. t. 84. f. 5.

Sepp Nederl. Inſ. V. p. 1. t. 1. f. 1 6. De *Gamma-Vlinder.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 44. no. 388. Phal. *Gamma.* Nom *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1395. Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 156. no. 92.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; exterioribus *Lambda graeco* inſcriptis.

Le *Lambda.* λ.

Long. 9 lign.

Act. Vpſ. 1763. p. 25. no. 68.

Papilio alis depreſſis, littera y aurea inſcriptis.

Biblioth. Reg. Pariſ. p. 31. f. *omnes.*

128. *Circumflexa*, der *Krummſtrich.* *)

Müller l. c. p. 689. no. 128. der *Krummſtrich.*

Wiener Schmetterl. p. 93. No. 4.

Schafgarbenkrauteulenraupe (Achillaeae Millefolii); *Schafgarbenkrauteule*, Phal. *Circumflexa.*

129. *Interrogationis*, das *Fragezeichen.*

Müller, l. c. p. 689. no. 129. das *Fragezeichen.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 716. Ph. *Interrogationis*, das *Fragezeichen.*

Bey uns *ſehr ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 212. no. 15. Ph. *Interrogationis*, das *Fragezeichen.*

Iſt dem *Gamma* ähnlich, nur daſs der ſilberfarbige Fleck ein Fragezeichen vorſtellt.

Wien.

*) *Nicht abgebildet.*

Wien. Schmetterl. p. 93. No. 3.
Brennneſſeleulenraupe (Vrticae urentis); *Brennneſſeleule*, Ph. N. *Interrogationis*.
Cathol. I. p. 283. Ph. *Interrogationis*.
Fabric. S. E. p. 607. no. 73. NOCTUA *Interrogationis*. Nom. *Linn.*

130. *Jota*, die *Jotaeule*.

Müller l. c. p. 689. no. 130. das lange J.
Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 717. Phal. *Jota*, das *griechiſche Jota*.
Naturforſcher X. p. 94. t. 2. f. 5. 6. Ph. *Jota*. (von *Scheven*.)
Cathol. J. p. 324. Ph. *Jota*.
Fabric. S. E. p. 608. no. 76. NOCTUA *Jota*. Nom. *Linn.*
Larva dodecapoda, nuda, viridis, albo-maculata.
Cramer Pap. exot. II. p. 106. t. 165. Fig. C. Ph. *Jota* — en *Virginie*. *)

131. *Feſtucae*, die *Schwingeleule*.

Müller l. c. p. 689. no. 131. t. 22. f. 7. der *Sumpfſchwingel*.
Berlin. Magaz. III. p. 214. no. 16. Phal. *Feſtucae*, der *Goldglanz*.
Goldglänzend, gelblichbraun mit drey ſilberglänzenden Flecken auf jedem Oberflügel.
Wien. Schmetterl. p. 92. No. 1. *Schwingeleulenraupe* (Feſtucae fluitantis); *Schwingeleule*, Phal. *Feſtucae*.

Klee-

*) Das Jota iſt gröſser, und wie ein weiſser Haken; die Flügel buntſcheckiger; ſonſt viel ähnliches mit dem *Linnéiſchen* J.

Kleemanns Beytr. I. p. 251. t. 30. Fig. A.

Der zur 3ten Kl. gehörige prächtige zimmetbraune, mit Gold und Silber gezierte Papilion.

Fabric. S. E. p. 607. no. 71. NOCTUA *Feſtucae.* Nom. *Linn.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 44. no. 387. Phal. *Feſtucae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1397. Ph. *Feſtucae.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 429. no. 3. *Phalene dorée à taches argentées.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues mêlées de brun et de jaune doré avec trois taches argentées.

— *Ueberſ.* II Th. IB. p. 312. no. 2. Ph. *Feſtucae*, die *Goldphaläne mit Silberflecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden, goldgelben, braunmelirten Flügeln, mit drey Silberflecken.

132. *Meticuloſa*, die *Scheueule.*

Müller l. c. p. 689. no. 132. der *Achatflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 718. Ph. *Meticuloſa*, die *Scheueule.*

Bey uns *etwas ſelten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 23. Ph. *Meticuloſa.*

Raupe verwandelt ſich ohne einiges Gewebe (Chorh. *Meyer*).

Berlin. Magaz. III. p. 214. no. 17. Ph. *Meticuloſa*, das *einfache Dreyeck.*

Die *Oberflügel* theils grünlich, theils röthlich, theils okergelb, mit einem dreyeckigen kupfer-

kupferfarbenen Fleck; die *Unterflügel* weifs und röthlich glänzend.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 9. no. 1. Ph. *Meticulosa*, der *Achatflügel.*

Röfels Inſektenbel. IV. p. 65. t. 9.

Die von verſchiedenen Pflanzen ſich nährende, glatte und grüne *Raupe*, mit braunem Kopf, weifser unterbrochener Rückenlinie, gelben Punkten, und gleichfarbiger Seitenlinie.

Naturforſch. IV. p. 127. wo Hr. *Kleem.* anmerkt, dafs die dem ſ. *Röfel* übergeſchickte Abbildung der *Raupe* fehlerhaft geweſen ſey.

Wiener Schmetterl. p. 83. P. *Schrägſtrichraupen*, Larvae *Obliquoſtriatae*; *dreyeckmacklichte Eulen*, Ph. N. *Trigonophorae.*

No. 1. *Mangoldeulenraupe* (Betae vulgaris); *Mangoldeule*, Ph. *meticulosa.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 14. Ph. *Meticulosa.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 383. Ph. *Meticulosa.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 132. Phal. *Meticulosa.* Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 143. no. 7. Le *Timide*, ou *Craintif*, Ph. *meticulosa.*

Goed. Belg. I. p. 109. t. 56. *Gall.* Tom. II. t. 56. La *Craintive.*

Liſt. Goed. p. 118. no. 44. t. 44.

Ob ſingularem timiditatem hanc Erucam *Meticulosam* nominavi.

Scop. Ent. carn. p. 207. no. 512. Ph. *meticulosa.*

Long. lin. 11. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.

Alae ſubdentatae; *anticae* triangulo intra triangulum; utriusque baſi craſſiori margini impoſita.

Fabric. S. E. p. 608. no. 78. NOCTUA *meticulosa.*

Crista, alis deflexis, eroso-dentatis, pallidis; *anticis* basi incarnata, *triangulo fusco.*

Larva nuda, viridis; linea dorsali interrupta lateralibusque albis.

Pupa folliculata, fusca, postice rubra.

Müllerí Faun. Fridr. p. 43. no. 383. Ph. *meticulosa.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1398. Ph. *meticulosa.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 151. no. 84.

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis deflexis, margine erosis, cinereo-fuscis, superioribus triangulo marginali fuscescente incarnatum includente; thorace gibbo.

La *meticuleuse.*

Long. 10. lign.

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 3. p. 102. t. 5. f. 12-14.

Chenille rase assez grande, d'un beau verd avec trois raies longitudinales blanches, qui mange les feuilles de différentes plantes cultivées dans les jardins.

— — p. 698. t. 5. f. 14.

Phalene à antennes en filets, d'un gris blanchêatre, à double tache triangulaire d'un verd obscur.

— Tom. II. Part. I. p. 427. no. 1. Ph. *meticulosa;* Phalene *meticuleuse.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé; à ailes rabatues découpées grises à nuances d'un brun verdâtre, et traversées par une grande tache triangulaire verdâtre, qui renferme un triangle couleur de chair.

— *Ueberf.* I. 3 Abh. 1 Qu. p. 80. t. 5. f. 12 14.

Die

Die ziemlich grofse, glatte und grüne *Raupe*, mit drey weifsen läng-gehenden Rückenlinien, auf verfchiedenen Pflanzen.

Degeer Ueberf. 4 Qu. p. 121. t. 5. f. 14.

Ein grauweifslicher *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und einem doppelten dreyeckigen dunkelgrünen Flecke.

— II Th. I B. p. 310. no. 1. Ph. *meticulofa*, die *Furchtfame.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüffel, Rückenkamm, und grauen niederhangenden, braungrünlich fchattirten, ausgezackten Flügeln, mit einem grofsen weifsen grünlichen dreyeckigen Queerfleck, der ein fleifchfarbiges Dreyeck in fich fchliefst.

133. *Abfinthii*, die *Wermutheule.*

Müller l. c. p. 690. no. 133. der *gevierte Punkt.*

Füeßlins fchweizer. Inf. p. 38. no. 719. Ph. *Abfinthii*, die *Wermutheule.*

Berlin. Magaz. III B. p. 416. no. 100. Ph. *Punctigera*, der *punktirte Mönch.*

Afchgrau, mit vielen kleinen braunen Flecken, Strichen und Punkten, und einem weifsgraulichen Fleck, woran in jedem zwey kleine braune Vierecke ftehen.

Naturforfcher IX. p 142. no. 100. Ph. *Punctigera*, ift die Ph. *Abfynthii* L. (von *Rottemb.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 77. no. 220. Phal. *Abfynthii*, der *gevierte Punkt.*

Frifch Inf. VII. p. 19. 2 Pl. t. 12. Von der *Wermuthraupe* und ihrem Papilion.

Röfels Infektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 303. t. 61. die *buntgefleckte Wermuthraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 73. I. *Tygerraupen*, Larvae *Variegatae; kappenhalſigte Eulen*, Ph. N. *Cucullatae.*

1) Raupen, weiſs mit Rothgrün.

No. 1. *Wermutheulenraupe* (Artemiſiae Abſynthii); *Wermutheule*, Ph. *Abſynthii.*

Goed. La *Graviſante.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 153. no. 363. *Gevierter Punkt*, Ph. *Abſynthii.*

Cathol. G. p. 261. *Graviſante.*

Fabric. S. E. p. 610. no. 86. NOCTUA *Abſinthii.*

Criſtata, alis deflexis, canis, faſciis punctisque in tetragonum poſitis, nigris.

Larva viridis, maculis flavis rufisque lineata.

Pupa folliculata, brunnea, antice viridis.

Müllers Faun. Fridr. p. 44. no. 394. Ph. *Abſynthii.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1399. Ph. *Abſynthii.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 158. no. 95.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis albido-cinereis, lineis longis nigris.

L'*iota.*

Long. 9. lign.

134. *Alni*, die *Rudereule.* *)

Müller l.c. p. 690. no. 134. das *Doppelfeld.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 720. Ph. *Alni*, das *Kolbenhorn.*

Bey uns ſelten auf den *Linden.*

Die

*) Dieſe haben die *Wiener Entomologen* gar nicht. *Degeer* hat zuerſt ihre Raupe bekannt gemacht.

Die *Raupe* ſchwarz mit gelben Rückenſchilden, und langen ſchwarzen *Haaren*, die am Ende ein *Kölbchen* haben.

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 43.

Die *Raupe* wenigen bekannt (Chorh. *Meyer*). t. 1. f. 5. *Raupe* (Füeſsl.) f. 6. der Kopf etwas vergröſsert; f. 7. der fünfte Abſatz etwas vergröſsert; f. 8. die *Phaläne.*

Naturforſcher XII. p. 58. t. 1. f. 14. 15. 16. *Raupe, Puppe, Vogel;* Ph. *Alni*, das *Kolbenhorn*; der *Ruderfalter* *) (*Capieux*).

— XIV. p. 91. Nachtrag von *Capieux* t. 4. f. 11. Ph. *Alni* noch einmal, *vorzüglich ſchön.*

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 8. p. 280. t. 11. f. 25-28. **)

Chenille noire, à treize grandes taches ovales jaunes ſur le dos, qui eſt garnie de *poils ſinguliers en forme d'avirons*, et qui mange les feuilles de *l'Aune.*

— — p. 699. t. 11. f. 28.

Phalene à antennes en filets, d'un cendre noirâtre, à deux grandes taches blanchâtres ſur chaque aile ſupérieure.

— Tom. II. Part. I. p. 412. no. 6.

Phalene à avirons.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un cendré noirâtre, avec deux taches d'un blanc ſale, et quelques traits longitudinaux noirs, dont les ailes inférieures ſont blanches.

*) An *Füeßl.* abgebilderer *Raupe* ſtehen die ruderartigen Haare natürlicher.

**) Fig. 26. ein ſehr vergröſsertes *ruderförmiges Haar* mit Längsſtreifen.

Degeer Ueberſ. I. 8 Abhandl. 2 Qu. p. 54. t. 11. f. 25 - 28.

Die ſchwarze *Erlenraupe* mit dreyzehn groſſen, gelben, ovalen Rückenflecken, und ganz ſonderbaren *ruderförmigen Haaren.*

— — 4 Qu. p. 122. t. 11. f. 28.

Ein aſchgrauſchwärzlicher *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und zween groſſen weiſslichen Flecken auf jedem Oberflügel.

— II Th. I B. p. 299. no. 6. der *Ruderfalter.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, aſchgrauſchwärzlichen niederhangenden Flügeln, mit zween weiſsgraulichen Flecken, und einigen ſchwärzlichen längſt herunterlaufenden Strichen und weiſſen Unterflügeln.

135. *Pſi*, das *griechiſche Pſi.*

Müller l. c. p. 690. no. 135. das *griechiſche* Ψ.

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 721. Phal. *Pſi*, das *griechiſche Pſi.*

Nicht ſelten auf Eichen, *Apfelbäumen* und *Weiden.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 23. Ph. *Pſi.*

— Raupen ſterben von Würmern bald vor, bald nach der Verwandlung.

— freſſen den abgelegten Balg.

— *Röſels* Raupe t. 8. auf den *Weißdornen.*

— verwandeln ſich in Hülſen von Seide und Holzſpänchen.

— Röſel hält ſie beyde für *verſchiedene Arten.* (Chorh. *Meyer.*)

Friſch Inſ. II. p. 13. 1 Pl. t. 2. Von der *Rückzapfenraupe.*

Ber-

Berlin. Magaz. III. p. 214. no. 18. Phal. *Pfi*, die *Pfeilmotte.*

Weifslich aſchgrau, mit ſchwarzen Zeichnungen, darunter ein griechiſches *Pfi* ſich ausnimmt.

Naturf. IX. p. 112. no. 18. Ph. *Pfi.* Hr. von *Rottemb.* iſt noch ungewiſs, ob die von *Röſeln* I. N. V. 2. t. 7. 8. abgebildete Phalänen zwo wirklich verſchiedene Arten, oder nur dem *Geſchlecht* nach verſchieden ſind — t. 7. häufiger; t. 8. ſeltener.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 30. no. 69. p. 54. no. 147. Ph. *Pfi*, die *Pfeilmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 49. t. 7. die groſſe *Zapfenraupe* mit dem breiten gelben Rückenſtreif.

— p. 54. die groſsen ſchwarzen Augen der Phaläne funkeln bey Nachtzeit an dunkeln Orten wie *glüende Kohlen.* (Kleem.)

— p. 54. t. 8. die kleinere buntfarbige Zapfenraupe. *)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 554. no. 4. Phal. *Pfi*, die *Pfeilmotte.*

Wien. Schmetterl. p. 67. B. *düſtre Eulen.*

1) Die Raupen mit einem Auswuchs auf dem Rücken.

No. 2. *Schleheneulenraupe* (Pruni ſpinoſae); *Schleheneule*, Ph. *Pfi.*

Fiſchers N. G. v. Livl. p. 153. no. 364. das *griechiſche Pfi*, Ph. *Pfi.*

*) Aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt die *Röſelſche* Phaläne t. 8. als die kleinere und ſchöner gezeichnete, das *Männchen* zu t. 7. Die Puppe t. 8. hat am Schwanze drey zarte Spitzchen, die t. 7. nicht.

Liſt. Goed. p. 209. no. 92. f. 92.
Eruca formoſa et admirabilis.

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 135. Phal. *Pſi.* Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 69. Phal. *Pſi.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 350. no. 23.
Eruca rarius piloſa, *cornu* in medio dorſo erecto.
— *Aurelia* ſpadicea, theca incluſa.
— *Papilio* fuſco-albo-nigroque coloribus varia. Magna *ſtria* nigra ab oculis per alarum medium deorſum vergit; inferius tanquam duae cruces nigrae. *Interiores* alae coloris candicantis.

Fabric. S. E. p. 614. no. 104. NOCTUA *Pſi.*
Criſtata, alis deflexis cinereis; *anticis* lineola baſeos characteribus nigris.
Larva piloſa; dorſo flavo, lateribus nigris, rubro-maculatis; thorace cornu erecto nigro.
Pupa folliculata, brunnea.

Müller Faun. Fridr. p. 44. no. 393. Phal. *Pſi.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1400. Phal. *Pſi.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 155. no. 91.
Phalaena feticornis, ſpirilinguis, alis deflexis canis, maculis *Pſiformibus* nigris.
Le *Pſi*, Ψ.
Long. 9 lign.

Bibl. Reg. Pariſ. p. 33. f. *omnes.*

136. *Chi*, das *griechiſche Chi.*

Müller l. c. p. 690. no. 136. das *griechiſche Chi.*

Füeßl.

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 722. Ph. *Chi*, das *griechiſche Chi.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 280. no. 19. Ph. *Chi*, das *griechiſche Chi.*

Weiſslich, mit ſchwarzgrauen Zeichnungen, darunter ein griechiſches *Chi.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 73. no. 208. Phal. *Chi.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 87. t. 13. die blaſsgrüne glatte *Raupe* mit weiſſen Streifen.

Wien. Schmetterl. p. 72. H. *grauſcheckige Eulen.*

No. 3. *Agleyeulenraupe* (Aquilegiae vulgaris); *Agleyeule*, Ph. N. *Chi.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 339. Ph. *Chi.*

Fabric. S. E. p. 615. no. 105. NOCTUA *Chi.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, viridis; lineis lateralibus duabus albis.

Pupa folliculata, fuſca.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1401. Phal. *Chi* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 162. no. 103.

Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis cinereis, ſuperioribus faſcia decuſſata fuſca, puncto nigro, lineisque transverſis albidis.

Lix. — *Long.* 6. lign.

137. *Aceris*, die *Ahorneule.*

Müller l. c. p. 691. no. 137. der *Eyring.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 723. Ph. *Aceris*, die *Gelbzotte.*

Bey Genf auf den *Roßkaſtanien* häufig.

Friſch Inſ. I. p. 24. 2 Pl. t. 5. von der *gelbzottigen Kaſtanienraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 84. no. 242. Phal. *Aceris*, die *Gelbzotte;* der *Eyring;* der *Ahornvogel.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 40. t. 4. f. 5. Eine beſondere *Raupe.*

Die rothe und gelbe *Bürſtenraupe* mit dem braunen Kopf und rautenförmigen ſchwarzen Rückenzierrathen.

Kleemanns Beytr. I. p. 149. t. 17. f. 1-5.

Die hochgelbe langhaarige, mit 9 Paar, theils gelb-theils rothen pyramidenförmigen Bürſten verſehene *Raupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 374. Ph. *Aceris*, die *Ahornraupe;* der *Widder.*

Wiener Schmetterl. p. 67. B. *düſtere Eulen.*

3) *Raupen* ſehr lange Haare ohne Köpfe.

No. 7. *Roßkaſtanieneulenraupe* (Aeſculi Hippocaſtani).

La Chenille du Marronier d'Inde. *Réaum. Roßkaſtanieneule*, Ph. *Aceris.*

Aldrovand. de Inſ. Lib. II. t. 3. f. 15. 16. p. 269. ed. Bonon. 1602. fol. die *Raupe;* der *Stern.*

Schaeff. Inſ. t. 66. f. 8. 9.

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 524. Ph. *Aceris.* *)

Long. lin. 7. *Lat.* 3½.

Alae *anticae* caneſcentes, lineis transverſis, dentatis, annuloque ocellari nigris.

Müllerí Faun. Fridr. p. 44. no. 392. Ph. *Aceris.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1402. Phal. *Aceris*, Nom. *Linn.*

Geoffr.

*) Hierbey hat *Scop. Röſels* I. Ph. 2. t. 29. unrichtig angeführt; denn das iſt Ph. *Perſicaria* L. no. 142.

Geoffr. Inf. II. p. 156. no. 93. *)

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; *ſuperioribus* cinereo-fuſcoque nebuloſis, lineis undulatis et *Omicro* nigris; inferioribus cinereis.

L' *Omicron nebuleux.*

Long. 11 lign.

138. *Aprilina*, die *Aprileule.* **)

Müller l. c. p. 691. no. 138. der *Pfeilpunkt.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 724. Ph. *Aprilina*, der *Seladon.* ***)

— Magaz. der Entomol. II. p. 24. Phal. *Aprilina.*

Die graue mit weiſſen und ſammtſchwarzen Strichen gezierte *Raupe*, auf einem *Eichenblatte* (Chorh. *Meyer*).

(Die 3 Arten näher beſtimmt p. 25. *Füeßl.*)

Berlin. Magaz. III. p. 422. not. c. Eine gröſsere Art: Aprilina *maior.* (Dies die *Linnéiſche* Aprilina.)

Röſels Inſektenbel. III. p. 238. t. 39. f. 4.

Der blaſsblaulichgrüne, weiſs- und ſchwarzſcheckige *Nachtpapilion* der 2ten Kl. (ohne *Raupe*).

Wien. Schmetterl. p. 70. E. *Scheckichte Eulen.* No. 5. *Eichbaumeulenraupe* (Quercus Roboris); *Eichbaumeule*, Ph. *Aprilina.*

Gladbachs Schmetterl. p. 22. die *große Diana.*

Raj.

*) Hierbey iſt *Röſels* I Ph. 2. t. 13. unrichtig angeführt: das iſt Ph. *Chi* L. no. 136.

**) Dieſe wird oft mit *Ludifica* L. no. 143. verwechſelt. Es giebt 3 Arten derſelben: Aprilina die *größte.*

***) Beyde Zitata falſch. Das erſte iſt Ludifica, das zweyte die *kleinſte Art.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 158. no. 4.

Phalaena media pulcherrima, alis oblongis; *exterioribus* dilute coeruleo-viridibus, maculis et lineolis nigris perbelle depictis.

Fabric. S. E. p. 614. no. 100. NOCTUA *Aprilina.* Nom. *Linn.*

Larva cinereo-brunneoque variegata; linea dorſali alba, interrupta ſegmentoque ſingulo puncto albo.

Müllerí Faun. Fridr. p. 44. no. 391. Phal. *Aprilina.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1404. Phal. *Aprilina.* Nom. *Linn.*

139. *Virens*, die *weißgrüne Eule.* *)

Müller l. c. p. 691. no. 139. der *weiſſe Mond.*

Berlin. Magaz. III. p. 300. no. 51. Phal. *Tridens*, der *Dreyzack.*

Ganz grün, mit einem weiſſen ſchmalen Vorderrande, und einem weiſſen, mit drey etwas unmerklichen Spitzen verſehenen Fleck in der Mitte der Flügel.

Naturforſcher IX. p. 120. no. 51. Ph. *Tridens*, der weiſſe Fleck mit 3 Spitzen ſtellt eigentlich einen *halben Mond* vor, in dem das *Mittelſpitzchen* beynahe unmerklich iſt. (von *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 746. no. 47. Ph. *Tridens*, der *Dreyzack.*

Wiener Schmetterl. p. 85. Q. *Tagliebende Eulen.* No. 8. *Unbekannte Raupe; weißgrüne Eule*, Ph. *Virens.*

140. *Turca*, der *Türke.*

Müller l. c. p. 691. no. 140. der *Türke.*

Ber-

*) *Nicht abgebildet.*

Berlin. Magaz. III. p. 304. no. 55. Phal. *Volupia*, der *Rauchfuß.*

Blaſsroth, mit einem weiſſen Fleck und zwo grauen Queerſtreifen auf den Oberflügeln.

Naturforſcher IX. p. 123. no. 55. Ph. *Volupia.*

Die *Raupe* rothbraun, anderthalb Zoll lang, ziemlich dick. (von *Rottemb.*)

Wien. Schmetterl. p. 84. No. 2. *Binſengraseulenraupe* (lunci piloſi); *Binſengraseule*, Phal. *Turca.*

Der Dronth. Geſellſch. Schr. IV. p. 282. no. 39. t. 16. f. 15.

Phalaena N. (*Lunula*), ſpirilinguis criſtata, alis deflexis, atro-purpureis, nebuloſis, *lineola arcuata flava.*

Müllers Faun. Fridr. p. 46. no. 406. Phal. *Turca.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1406. Phal. *Turca.* Nom. *Linn.*

141. *Nictitans*, die *Weißniere.**)

Müller l. c. p. 691. no. 141. die *Weißniere.*

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. XXXI. p. 312. t. 10. f. 1. 2. 3.

Beſchreibung der *Frühlingsrockenraupe.* (*Osbeck.*) **)

Raupe ſteckt bey Tage in der Erde, und bey Nacht beiſst ſie die Rockenhalmen dicht über der Erde ab.

Linn.

*) Dieſe vermiſſe ich wieder bey den *Wiener Entomologen.*

**) Es heiſst daſelbſt p. 314 in der Note: *Linné* habe ſelbſt verſichert, es ſey die wahre Ph. *Nictitans.* S. unter den Neuen No. 132. Ph. *Secalis.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 321. no. 1215. Phal. N. *oculea.*

Habitat in *Lucis.*

Fabric. S. E. p. 616. no. 112. N. *Oculea.*

Criſtata; alis *deflexis* ferrugineo-fuſcoque variis; *ſtigmate reniformi*, pallido.

An?

142. *Perſicariae*, die *Flöhkrauteule.*

Müller l. c. p. 692. no. 142. der *Sägerand.*

Füeßl. ſchweizer. Inſekt. p. 38. no. 725. Phal. *Perſicariae.*

Etwas *ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 308. no. 61. Ph. *Sambuci*, die *Fliedermotte.*

Schwarz, mit einigen hellern undeutlichern Zeichnungen, und einem weiſſen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Naturforſcher IX. p. 128. no. 61. Ph. *Sambuci* (von *Rottemb.*).

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 174. t. 30. die glatte mattgrüne geſchuppte *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 71. F. *fleckichte Eulen.*

3) Raupen mit einer ſtumpfen Erhöhung.

No. 8. *Flöhkrauteulenraupe* (Polygoni Perſicariae); *Flöhkrauteule*, Ph. *Perſicariae.*

Fabric. S. E. p. 615. no. 106. NOCTUA *Perſicariae.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, viridis; linea dorſali alba; ſecundo ſegmento macula quadrata atra, cauda conica.

Pupa brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 157. no. 94.

Pha-

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, ſuperioribus fuſcis, lineis undulatis, et *Omicro* albis; inferioribus cinereis.

L' *Omicron géographique.*

Long. 7. lign.

143. α. *Ludifica*, das *Naturſpiel.*

Müller, l. c. p. 692. no. 143. das *Naturſpiel.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 726. Ph. *Ludifica.*

Bey uns *ſelten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 24. Ph. *Ludifica.*

Berlin. Magaz. III. p. 280. no. 20. Phal. *Aprilina*, der *Seladon.*

Meergrün mit weiſſen Streifen, und irregulären ſchwarzen Zeichnungen, wie chineſiſche Buchſtaben.

— p. 555. mit *Kupfer.* f. 1. *Raupe;* f. 2. *Puppe;* f. 3. *Vogel.*

Beſchreibung einer ſehr bunten *Raupe* auf den Eichen, und der *Phaläne;* Ph. *Aprilina minor* (*Hufnagel*).

Naturforſcher IX. p. 113. no. 20. Ph. *Aprilina* iſt Linn. *Ludifica* (von *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 649. no. 19. Ph. *Aprilina maior**), der *kleine Seladon*, et no. 20. Ph. *Aprilina*, der *Seladon.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 161. t. 22. f. 8. Ph. *Ludifica*, das *Naturſpiel.*

Die *Vorderflügel* iſabellfarb, gezähnt, mit vielen ſchwarzen Zügen; die *hintern* ſchwarzgrau

*) Hieraus ſind zwo beſondere Arten gemacht, da es doch nur eine, nämlich *Ludifica* L. iſt. Statt minor ſtehet durch einen Druckfehler maior, wie die deutſche Benennung, der *kleine* Seladon, beweiſet.

grau und weifs. Die Schenkel der Vorderfüfse fehr dicke, alle grau; das übrige der Füfse weifs und fchwarz.

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 311. zur Famil. E. no. 6. (4. 5.) *unbekannte Raupe* *); *grünweifslichte fchwarzgezeichnete Eule*, Ph. *Ludifica.*

Fabric. Syft. Ent. p. 614. no. 101. NOCTUA *Ludifica.* Nom. *Linn.*

Müllers Faun. Fridr. p. 44. no. 390. Ph. *Ludifica.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1405. Ph. *Ludifica.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. I. Mém. 3. p. 113. t. 5. f. 19-24.

Chenille verte, à trois lignes longitudinales jaunâtres, dont le corps eft garni de quelques peu de poils longs et noirs.

— — p. 699. t. 5. f. 22. 23.

Phalene à antennes en filets, d'un brun presque noir à nuances blanchâtres, et à tache ovale d'un verd brun, entourée de blanc et de noir.

— *Ueberf.* I. 1 Qu. p. 88. t. 5. f. 19-24. **)

Eine grüne mit einigen langen fchwarzen Haaren bewachfene *Raupe*, mit drey langen gelblichen Streifen.

— — 4 Qu. p. 122. t. 5. f. 22. 23.

Ein brauner, beynahe fchwarzer *Nachtvogel* mit weifslichen Schattirungen, fadenförmigen Fühlhörnern, und einem eyförmigen braungrünen Fleck, mit weifs- und fchwarzem Rande.

Degeer

*) Die Raupe ift vom *Hufnagel* l. c. abgebildet; alfo nicht mehr unbekannt.

**) Ich nehme das hier zurück, was ich damals in der Anmerk. fagte, es fey *Aprilina* L. S. *Füeßl.* Entomol. Magaz. II. p. 25.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 434. no. 6. *Phalene d' Avril.*

Phalene à antennes filiformes; à trompe et à corcelet huppé; à ailes rabatues d'un brun presque noir à nuances blanchâtres et brun-verdâtres avec une tache ovale d'un verd-brun à cercle blanc et noir.

— *Ueberſ.* II Th. 1 B. p. 317. no. 6. die *Aprilphaläne.* *)

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden braunen, beynahe ſchwarzen, weiſslich und braungrünlich ſchattirten Flügeln, mit einem eyförmigen grünbraunen Fleck, in einem weiſs- und ſchwarzen Zirkel.

β. *Minor*, die *kleinſte Art der Aprileule.* **)

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 26. *Schäffers und Sepps* Eule, — ſcheint mir noch eine *dritte beſondere Art* zu ſeyn. (Füeſsl.)

Gladbachs neue Schmetterl. p. 22. t. 11. f. 1. 2. die *kleine Diana.*

Schaeff. Icon. t. 92. f. 3.

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 41. t. 9. f. 1-8. Vom *Ey bis zur Phaläne.*

De Vlinder de *Orion.*

144. *Af-*

*) Nachher hab ich eingeſehen, daſs die Hufnagelſche Aprilina die eigentliche *Ludifica* L. ſey, und *Sepp* die dritte kleinſte Art abgebildet habe.

**) Wenn die *Runica* der Wiener p. 70. F. No. 1. nicht aus einer glatten Raupe käme, ſo würde ich ſie für dieſe halten. An *Fabric.* Lichenis? S. unter den neuen Noct. no. 309.

144. *Affinis*, der *Italiäniſche Anverwandte.**)

Müller l. c. p. 692. no. 144. der *Anverwandte.*

Wien. Schmetterl. p. 88. T. *Mordraupen; gewäſſerte Eulen.*

4) *Rothbraun.*

No. 11. *Aeſpenraupeneule* (Populi Tremulae); *Aeſpeneule.* Ph. *Affinis.*

Fabric. S. E. p. 609. no. 83. NOCTUA *Affinis.* Nom. *Linn.*

145. *Triptera*, der *portugieſiſche Dreyfleck.***)

Müller l. c. p. 692. no. 145. der *Flügelfleck.*

Fabric. S. E. p. 609. no. 84. NOCTUA *Triptera.* Nom. *Linn.*

146. *Diffinis*, der *portugieſiſche Landsmann.****)

Müller l. c. p. 692. no. 146. der *Landsmann.*

Wiener Schmetterl. p. 88. T.

No. 10. *Feldulmeneuleuroupe* (Vlmi campeſtris); *Feldulmeneule*, Ph. *Diffinis.*

Geoffr. Inſ. II. p. 164. no. 108.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, albis roſeo-purpureoque variegatis, ſuperioribus macula duplici marginali alba.

Le *Nacarat.*

Long. 6 lign.

147. *Occulta*, der *kurze Unterflügel.*

Müller l. c. p. 693. no. 147. der *Deckflügel.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 318. no. 1203. Phal. *Occulta.*

Inter Phalaenas *ruſticas* maxima.

Clerk

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

Clerk Icon. t. 1. f. 6.

148. *Perſpicillaris*, die *Brilleneule.*

Müller l. c. p. 693. no. 148. die *Brille.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 727. Ph. *Perſpicillaris*, die *Brille.*

Nicht ſelten auf den *Pappelbäumen.*

Wien. Schmetterl. p. 76. K. *Rieſelraupen*, Larvae *albopſarſae; holzfarbige Eulen*, Ph. N. *Lignicolores.*

No. 11. *Konradskrauteulenraupe* (Hyperici hirſuti); *Konradskrauteule*, Ph. *Perſpicillaris.*

Clerk Icon. t. 2. f. 3. Ph. *Polyodon.*

149. *Conſpicillaris*, der *Brillenbogen.*

Müller l. c. p. 693. no. 149. t. 22. f. 8. der *Brillenbogen.*

Wiener Schmetterl. p. 75. K. No. 5. *Wirbelkrauteulenraupe* (Aſtragali Onobrych.); *Wirbelkrauteule*, Ph. *Conſpicillaris.*

150. *Vmbratica*, die *Kappeneule.*

Müller l. c. p. 693. no. 150. der *Kappenträger.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 728. Ph. *Vmbratica*, der *Kappenträger.*

Nicht ſelten in den Gärten unter *Sallat* und anderem Gemüſe.

Berlin. Magaz. III. p. 280. no. 21. Ph. *Vmbratica*, der *weiſſe Mönch.*

Weiſsgrau, mit ſchmalen langen und ſpitzigen Flügeln, und einer Mönchskappe.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 56. no. 153. et p. 74. no. 211. Ph. *Vmbratica*, der *Kappenträger*; der *graue Mönch.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 153. t. 25. die glatte, ſchwarzbraune und mit pomeranzengelben Flecken geſprenkelte *Raupe.*

Wiener Schmetterl. p. 74. I. *kappenhalſigte Eule.*

3) Braun mit Röthlichgelb die *Raupen.*

No. 8. *Haſenkohleulenraupe* (Sonchi oleracei *laevis*); *Haſenkohleule*, Ph. *Vmbratica.*

Fabric. S. E. p. 618. no. 118. NOCTUA *Vmbratica.*

Larva nuda, nigricans, trifariam rubro-punctata.

Pupa brunnea.

Müllerí Faun. Fridr. p. 45. no. 395. Ph. *Vmbratica.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1408. Phal. *Vmbratica.* Nom. *Linn.*

151. *Exſoleta*, die *Aſpekteneule.*

Müller l. c. p. 693. no. 151. das *Moderholz.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 729. Ph. *Exſoleta*, das *Moderholz.*

Auf der Melde; *Erbſenfeldern* etwas ſelten.

— Magaz. der Entomol. II. p. p. 27. Phal. *Exſoleta.*

Die Nahrung der *Raupe* gemeines *Gras* (Chorh. *Meyer*).

Friſch Inſ. V. p. 30. no. 11. 1 Pl. t. 11. Von der grünen *Meldenraupe* mit ſchwarz eingefaſten weiſſen Spiegelpunkten auf jedem Gelenke auf dem Rücken — die *Aſpektenraupe.*

Berlin. Magaz. III. p. 282. no. 22. Phal. *Exſoleta*, die *Aſpektenmotte.*

Mauſefarbig, ſchwarzgrau gezeichnet, und ſchattirt.

Maders

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 31. no. 78. p. 56. no. 152. Phal. *Exfoleta*, *Aſpektenmotte; Moderholz.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 145. t. 24. die groſse, glatte, grüne und auf unterſchiedliche Arten gezeichnete *Meldenraupe.*

Martini allgem. Geſch. der Nat. III. p. 398. t. 104. Ph. *Exfoleta*, die *Aſpektenmotte; Moderholz.*

Wien. Schmetterl. p. 75. K. No. 1. *Scharteculenraupe* (Serratulae tinct. et arv.); *Scharteeule*, Ph. *exfoleta.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 360. Ph. *Exfoleta.*

Fabric. S. E. p. 617. no. 116. NOCTUA *exfoleta.*

Criſtata, alis lanceolatis, convolutis, fuſco-cinereoque nebuloſis, punctis quatuor marginalibus albis.

Larva nuda, viridis, punctata: linea laterali albida.

Pupa nuda, brunnea.

Müllери Faun. Fridr. p. 45. no. 396. Phal. *exfoleta.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1409. Phal. *exfoleta.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 401. no. 2. t. 7. f. 1-4. *Phalene bois ſec.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes allongées croiſées d'un gris couleur du bois, mais d'un brun de caffé le long du dos; à corcelet huppé avec trois pointes en devant.

— *Ueberſ.* II. Th. I B. p. 290. no. 2. t. 7. f. 1-4. das *dürre Holz.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, länglicht-ovalen, gekreuzten, holzgrauen, längſt dem Rücken aber koffeebraunen

Flügeln, und einem Rückenkamm vorne mit drey Spitzen. *)

Merian. Eur. t. 108.

152. *Putris*, das *Faulholz.* **)

Müller l. c. p. 694. no. 152. das *Faulholz.*

Wien. Schmetterl. p. 75, K. No. 4. *Unbek. Raupe; weißlichte braungerändelte Eule*, Ph. *Putris.*

Fabric. S. E. p. 618. no. 119. NOCTUA *Putris.* Nom. *Linn.*

Statura N. *Verbasci*, at multo brevior. *Thorax* antice pallide testaceus.

153. *Verbasci*, die *Wollkrauteule.*

Müller l. c. p. 694. no. 153. die *Wollkrautseule.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 38. no. 730. Ph. *Verbasci*, die *Wollkrautseule.*

Auf dem *Wollkraut* häufig.

— Magaz. der Entomol. II. p. 28. Phal. *Verbasci.*

1) Die jungen *Raupen* bedienen sich im Gehen der 2 vordern Paar Bauchfüfse nicht, den *Spannmessern* ähnlich.

2) In der Jugend und Alter rollen sie sich stark zusammen, und so, auf dem Rücken liegend, bewegen sie sich in die Höhe und Ferne, *sprungweise.*

3) Ein Paar Jahr nach einander sind viele durch eine ungeheure *Brut kleiner Würmer* verdorben, die nach ihrem Tode einen unerträg-

*) P. 292. erzählet der V. eine sonderbare Begebenheit; dafs diese *Aspektenraupe* die Raupe vom Pap. *Rumni* (Zitronvogel) in der Schachtel aufgefressen habe.

**) *Nicht abgebildet.*

träglichen Geruch von ſich gegeben haben (Chorh. *Meyer*).

Friſch Inſ. VI. p. 22. no. 9. 2 Pl. t. 9. von der *Wullkrautraupe.*

Berlin. Magaz. III. p. 282. no. 23. Ph. *Verbaſci*, der *braune Mönch.*

Hellbraun, mit einem dunkelbraunen Rande und einer *Mönchskappe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 14. no. 14. Ph. *Verbaſci*, der *braune Mönch;* die *Wollkrauteule.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2Kl. p. 142. t. 23. die grünlichweiſſe ſchwarzgefleckte *Wollkrautraupe.*

Wiener Schmetterl. p. 73. I.

2) *Raupen* mit Schwarz und Gelb.

No. 4. *Wollkrauteuleuraupe* (Verbaſci Thapſi); *Wollkrauteule*, Ph. *Verbaſci.*

La Chenille du bouillon blanc. *Réaum.*

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Inſektologie p. 97. no. 17.

Die ſchöne *Raupe* auf dem *Wollkraut* — hat den beſondern Theil, nämlich das *Fleiſchhorn*, unter dem erſten Ringe zwiſchen der Unterlippe und dem erſten Paar Füſsen.

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 153. Ph. *Verbaſci.* Nom. *Linn.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 414. Ph. *Verbaſci*, der *Wollkrautvogel.*

Schaeff. Icon. t. 24. f. 6. 7.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 168. no. 25.

Phalaena media; alis exterioribus cinereis, lineis et maculis nigris, varie depictis.

— p. 352. no. 31.

Eruca Verbaſcum depaſcens cinerea, pulchre variegata.

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 521. Phalaena *Verbaſci. Long.* lin. 9. Lat. $3\frac{3}{4}$.

Lingua corporis longitudine; *thorax* criſta duplici; *alae* ſubdentatae, albo-cervinae, margine fuſco.

Fabric. S. E. p. 618. no. 117. NOCTUA *Verbaſci.*

Criſtata, alis deflexis, dentato-eroſis, margine laterali fuſco, immaculato.

Larva nuda, cinerea, flavo-nigroque punctata.

Pupa folliculata, lutea, ſtigmatibus nigris.

Müllери Faun. Fridr. p. 45. no. 397. Phal. *Verbaſci.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1409. Phal. *Verbaſci.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 158. no. 96.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis fuſco-cinereis, *ſuperioribus* fuſcis longitudinaliter ſtriatis.

Biblioth. Reg. Pariſ. p. 32. f. *omnes.*

154. *l album*, das *weiſſe l.*

Müller l. c. p. 694. no. 154. das *weiſſe L.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 731. Ph. *l album*, das *weiſſe L.*

Bey uns *ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 42. Ph. *Comma*, der *weiſſe Haken.*

Hellgelblichgrau, mit etwas Dunkelgrau ſchattirt; die *Oberflügel* der Länge nach ſehr fein gefurcht, in deren Mitte ein weiſſer Strich mit einem Haken.

Naturforſcher IX. p. 117. no. 42. Ph. *Comma* iſt des *Linn. l album* (von *Rottemb.*).

Gle-

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 745. no. 44. Ph. *Comma*, der *weiſſe Haken*.

Wien. Schmetterl. p. 85.

2) Ohne Queerſtriche.

No. 9. *Hundsribbeneulenraupe* (Plantaginis lanceolatae); *Hundsribbeneule*, Ph. *l album*.

Fabric. S. E. p. 606. no. 66. NOCTUA *l album*.

Criſtata, griſea, alis incumbentibus; anticis *l albo* notatis.

Müllerl Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1390. Ph. *l album*.

Elinguis? criſtata, alis pallide luteis, ſuperioribus nebuloſis: diſco *linea nivea uncinata*.

Schaeff. Icon. t. 92. f. 4.

155. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen*.

Müller, l. c. p. 695. no. 155. das *Verwunderungszeichen*.

Füeßl. ſchweizer. Inſekt. p. 38. no. 732. Ph. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen*.

Berlin. Magaz. III. p. 298. no. 48. Ph. *Clavus*, das *Schlüſſelloch*.

Braun, grau, mit einem dunkelbraunen *nierenförmigen* und einem *nagelförmigen* Fleck, ſo zuſammen ein *Schlüſſelloch* vorſtellt.

Naturf. VIII. p. 109. und IX. p. 119. no. 48. Ph. *Exclamationis* (von *Rottemb.*).

Wien. Schmetterl. p. 80. N. *Erderaupen*, Larvae *Terricolae; gemeine Eulen*, Ph. N. *Ruſticae*.

1) mit *ſchwarzem Halskragen*.

No. 2. *Kreuzwurzeulenraupe* (Senecionis vulgaris); *Kreuzwurzeule*, Phalaena *Exclamationis*.

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 220. no. 32. Ph. *exclamationis* t. 17.

Oben auf dem Flügel einen ſchwarzen Strich mit einem Punkt darunter, wovon es den Namen hat.

Fabric. S. E. p. 605. no. 65. NOCTUA *Exclamationis.* Nom. *Linn.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1403. Phal. *Exclamationis.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 161. no. 101.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis deflexis, ſuperioribus ferrugineo-cinereis; macula duplici longa rotundaque nigra; inferioribus albidis.

La *double tache.*

Long. 8. lign.

156. *Comma*, das *weiſſe Häklein.* *)

Müller l. c. p. 695. no. 156. das *Häklein.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 733. Ph. *Comma*, das *Häklein.*

Wiener Schmetterl. p. 76. K. *Rieſelraupen, holzfarbige Eulen.*

No. 9. *Unbekannte Raupe. Grauſtriemigte ſchwarzgezeichnete Eule.* Ph. *Comma.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 196. Ph. *Comma.*

Naturforſcher IX. p. 117. no. 42. Ph. *Comma* Hufnag. L *album* et Ph. *pallens* L. viel ähnliches (von *Rottemb.*).

Müller Faun. Fridr. p. 45. no. 399. Ph. *Comma.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1411. Ph. *Comma.* Nom. *Linn.*

157. *Plecta*, der *weiſſe Dickrand.*

Müller l. c. p. 695. no. 157. der *Dickrand.*

Füeß-

*) *Nicht abgebildet.*

Füeßlins ſchweizer. Inſekt. p. 38. no. 734. Phal. *Plecta.*

Bey uns etwas ſelten auf *Linden.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 48. no. 131. Phal. *Plecta*, der *Dickrand.*

Kleemanns Beytr. I. p. 189. t. 23.

Die einſame, glatte, ſchlechtgrüne und auf dem Tobackskraut ſich aufhaltende *Raupe* — vom *Ey* an.

Naturforſcher IX. p. 120. no. 49. Phal. *Ignobilis* Hufnag. (von *Rottemb.*)

Berlin. Magaz. III. p. 300. no. 49. Ph. *Ignobilis*, der *Springer.*

Dunkelbraun, mit vielen hellbraunen Zeichnungen, und einem *nierenförmigen Fleck.*

Wien. Schmetterl. p. 77. M.

2) mit ſchwarzen Fleckchen im Mittelraume.

No. 6. *Blindlatticheulenraupe* (Lactucae ſativae); *Blindlatticheule*, Ph. *Plecta.*

Fabric. S. E. p. 605. no. 63. NOCTUA *Plecta.*

Alis incumbentibus, fuſcis; *margine* craſſiori albo.

Larva viridis, capite brunneo.

Pupa folliculata, atra.

158. *Deraſa*, der *Wiſchflügel.*

Müller l. c. p. 695. no. 158. der *Wiſchflügel.*

Füeß. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 735. Ph. *Deraſa*, der *Achatflügel.*

Bey Zürch und Bern; aber *ſelten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 85. §. IV. no. 2. Ph. *Deraſa*, der *Achatvogel.*

Berlin. Magaz. III. p. 400. no. 74. Ph. *Pyritoïdes*, der *Feuerſtein.*

Die

Die Grundfarbe olivenfarbig, grau, wie ein durchſichtiger Feuerſtein, mit roſtfarbigen weiſſen und dunkeln Flecken und Zeichnungen.

Berlin. Magaz. p. 424. K. Auſserordentlich ſelten.

— — p. 560. Beſchr. einer ſeltenen und beſonders ſchönen *Phaläne.* Ph. *Pyritoïdes.* (*Hufnagel.*) Beygef. Kupfert. f. 4. *Vogel.*

Naturforſch. II. p. 16. V. t. 1. f. 7. (*Kühn.*)

— IX. p. 133. no. 74. Ph. *Pyritoïdes* iſt *Deraſa* L. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmetterl. p. 87. T. *Mordraupen; gewäſſerte Eulen.*

1) die Oberflügel gelblicht.

No. 2. *Himbeereulenraupe* (Rubi Idaei); *Himbeereule*, Ph. N. *Deraſa.*

Fabric. Syſt. E. p. 609. no. 80. NOCTUA *Deraſa.* Nom. *Linn.*

159. *Gothica*, die *gothiſche Schrifteule.*

Müller l. c. p. 696. no. 159. die *gothiſche Schrift.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 736. Ph. *Gothica.* Bey uns etwas *ſelten.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1412. Phal. *Gothica.* Nom. *Linn.*

Clerk Icon. t. 1. f. 1.

160. *Pinaſtri*, die *Fichteneule.*

Müller l. c. p. 696. no. 160. der *Buckel.*

Wien. Schmetterl. p. 82. O. *Jaſpisfarbige Eulen.*

1) Die Oberflügel ſchwärzlich mit gelber Zackenlinie.

No. 1. *Föhreneulenraupe* (Pini Sylveſtris); *Föhreneule*, Ph. *Pinaſtri.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 153. no. 365. Ph. *Pinaſtri*, der *Buckel.*

Ber-

Berlin. Magaz. III. p. 300. no. 50. Phal. *Dypterigia*, die *Flügelmotte.*

Kohlschwarz, mit einer grauen Figur auf jedem Oberflügel, so dem Flügel von einem Vogel ähnlich ist.

Naturforscher IX. p. 120. no. 50. Ph. *Dypterigia* ist Ph. *Pinastri* L.

Das beste *Unterscheidungszeichen* die vom *Hufnagel* auf den Oberflügeln am Unterrande in angulo ani angegebene *graue flügelförmige Figur.* (von *Rottemb.*)

Linn. Syst. Nat. ed. 10. p. 516. no. 108. Ph. *Scabriuscula.*

Clerk Icon. t. 1. f. 8.

161. *Strigilis*, der *Dreyring.*

Müller l. c. p. 696 no. 161. der *Dreyring.*

Clerk Icon. t. 9. f. 6.

162. *C nigrum*, das *schwarze C.*

Müller l. c. p. 696. no. 162. das *schwarze C.*

Wiener Schmetterl. p. 77. M.

2) mit schwarzen Fleckchen im Mittelraume.

No. 7. *Spinateulenraupe* (Spinaciae oleraceae); *Spinateule*, Ph. *C nigrum.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 2. Ph. *C nigrum.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 157. Le *C.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 122. no. 1413. Phal. *C nigrum.* Nom. *Linn.*

Clerk Icon. t. 1. f. 3.

163. *Brassicae*, die *Kohleule.*

Müller l. c. p. 696. no. 163. die *Kohleule.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 38. no. 737. Ph. *Brassicae*, die *Kohleule.*

Füeßl.

Füeßl. Magaz. der Entom. II. p. 29. Ph. *Braſſicae.*

Die *Raupen* kommen mit verſchiedenen Farben, weiſs und grau, aus den Eyern — ſehen nach jeder Häutung anders aus — häuten ſich fünfmal — gehen faſt wie *Spannraupen* — keine friſst bey Tage — die *Puppen* arbeiten ſich aus der Erde heraus. (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Magaz. III. p. 282. no. 24. Ph. *Braſſicae*, die *Kohlmotte.*

Glänzend, blaſs, gelblich, grau marmorirt, mit weiſslichgrauen Flecken, und ſchwarzen Haken auf den Oberflügeln.

Friſch Inſ. X. p. 19. no. 16. 3 Pl. t. 16. von der erdfarbnen *Erdraupe* mit drey gelben Strichen auf dem Halskragen oder Nackenſchild.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 169. t. 29. die ſchädliche, glatte, braune *Krautraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 81. N. *Gemeine Eulen.*

4) mit zweydeutiger Zeichnung.

No. 21. *Kohleulenraupe* (Braſſicae oleraceae); *Kohleule*, Ph. *Braſſicae.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 153. no. 365. Phal. *Braſſicae*, die *Kohleule.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 321. Phal. *Braſſicae*, der *Krautvogel*, der *Herzwurm.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 403. Phal. *Braſſicae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1414. Phal. *Braſſicae.* Nom. *Linn.*

Othon. Fabric. Faun. Groenl. p. 194. no. 146. Phal. *Braſſicae.* Nom. *Linn.*

Mea *puncta 4 alba marginalia* habebat.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 438. no. 9. Ph. *Braſſicae; Phalene brune-griſeâtre du Chou.*

Pha-

Phalene à antennes filiformes; à trompe et à corcelet huppé; à ailes rabatues d'un brun - griſeâtre obſcur à rayes ondées noirâtres avec une tache griſe, une tache mêlée de blanc et une raye blanchêatre.

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 320. no. 9. die *braungrauliche Kohlphaläne*, der *Ohrvogel.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und Rückenkamm, und niederhangenden dunkelbraungraulichen Flügeln, mit gewäſſerten ſchwärzlichen Streifen, einem grauen und einem weiſsmelirten Fleck, nebſt einer weiſslichen Streife. *)

Goed. Belg. Tom. III. t. F.

Liſt. Goed. p. 79. f. 29.

Merian. Eur. t. 81.

Albin. Inſ. t. 78. 79. no. 45. e f g h.

Réaum. Inſ. I. t. 40. f. 16. 17. t. 41. f. 1. 2. 3.

164. *Rumicis*, die *Sauerampfereule.*

Müller l. c. p. 697. no. 164. die *Sauerampfereule.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 738. Ph. *Rumicis.*

— Mag. der Entomol. II. p. 31. Ph. *Rumicis.*

Raupen freſſen *Boretſch* (Borrago) und *Weidenblätter* (Chorh. *Meyer*).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 57. no. 155. Phal. *Rumicis*, die *Sauerampfermotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 161. t. 27. die ſchwarzbraune, buntgeſprengte, rothhaarige *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 67. B.

2) Bey den Raupen die Haare auf Knöpfchen.

No.

*) Mittel dagegen p. 321. 322. *Anmerk. Preuſs. Samml.* I. p. 560. II. p. 1180. 1187. *Berlin. Magaz.* III. p. 3. 19.

No. 3. *Ampfereulenraupe* (Rumicis Crispi etc.); *Ampfereule*, Ph. *Rumicis.*

*Müller*i Faun. Fridr. p. 45. no. 401. Phal. *Rumicis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1415. Phal. *Rumicis.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. I. Mém. 5. p. 185. t. 9. f. 14-22.

Chenille velue, noire, à dix tubercules, garnie sur le dos de taches rougeâtres et blanches, et vers les côtés d'une raye blanche ou couleur d'orange. Elle se trouve sur l'*Aune*, le *Bouleau* et le *Saule.*

— — p. 699. t. 9. f. 22.

Phalene à antennes en filets; cendrée, à taches et nuances noires et blanchâtres, et à jambes picotées de noir.

— Tom. II. Part. I. p. 411. no. 4.

Phalene cendrée noirâtre à deux taches blanches.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un cendré noirâtre avec des rayes ondées noires, et deux taches blanches au bord intérieur.

— *Ueberf.* I. 1 Quart. 5te Abh. p. 137. t. 9. f. 14-22.

Die rauche, schwarze, auf dem Rücken röthlich und weifsgefleckte und an den Seiten weifs oder orangegelb gestreifte, auf den *Erlen*, *Birken* und *Weiden* lebende *Raupe*, mit zehn Buckeln.

— — 4 Qu. p. 122. t. 9. f. 22.

Ein aschgrauer *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, schwarz und weifsgefleckt, und schattirt, und schwarz gesprenkelten Füfsen.

Degeer

Degeer Inſ. II Th. I B. p. 298. no. 4.

Die ſchwärzlich aſchgraue *Phaläne* mit zween weiſſen Flecken.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und ſchwärzlich aſchgrauen niederhangenden Flügeln, mit zwo ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und zween weiſſen Flecken am Innenrande.

Réaumur Inſ. I. t. 15. f. 6. t. 37. f. 11. Tom. II. t. 34. f. 8. La *Chenille.*

165. *Oxyacanthae*, die *Weißdorneule.*

Müller l. c. p. 697. no. 165. die *Hochſchwanzeule.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 39. no. 739. Phal. *Oxyacanthae.*

Auf dem *Schlee-* und *Weißdorn*, etwas ſelten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 14. no. 15. Phal. *Oxyacanthae*, die *Hochſchwanzeule;* der *Buchfink.*

Berlin. Magaz. III. p. 284. no. 25. Ph. *Oxyacanthae*, der *Buchfink.*

Theils hell, theils dunkelgrau, theils blaſsgrau, mit einem groſsen weiſslichen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 185. t. 33. die glatte, hellgraue und braun gerautete *Baumraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 820. no. 13. Ph. *Oxyacanthae*, der *Buchfink.*

Wien. Schmetterl. p. 70. F.

2) Raupen mit Spitzen am Hinterleibe.

No. 3. *Weiſsdorneulenraupe* (Crataegi Oxyacanthae); *Weiſsdorneule*, Ph. *Oxyacanthae.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 391. Ph. *Oxyacanthae.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 90. NOCTUA *Oxyacanthae.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, albo-nigroque varia, cauda gibba.

Pupa folliculata, flava.

166. *Vaccinii*, die *Heidelbeereule.* *)

Müller l. c. p. 697. no. 166. die *Heidelbeereule.*

Wien. Schmetterl. p. 85. R. *Halsſchildraupen*, Larvae *Scutellatae; röthlichbraune Eulen*, Phal. N. *Badiae.*

No. 2. *Preuſelbeereulenraupe* (Vaccinii Vitis Idaeae); *Preuſelbeereule*, Ph. *Vaccinii.*

167. *Myrtilli*, die *Sumpfheideeule.*

Müller l. c. p. 698. no. 167. die *Sumpfheideeule.*

Berlin. Magaz. III. p. 492. no. 37. Ph. *Ericae*, die *Waldmotte.*

Die *Oberflügel* braunroth mit weiſſen geſchlängelten Queerlinien; die *Unterflügel* an der Einlenkung oraniengelb, am Rande ſchwarz.

Naturforſcher IX. p. 114. no. 37. Ph. *Ericae* iſt Ph. *Myrtilli* L. (v. *Rottemb.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 65. no. 185. Phal. *Myrtilli*, die *Sumpfheideneule.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 85. t. 11. f. A B C.

Das ausnehmend zierliche, grün und weiſsgeſcheckte *Räuplein* der Waldheyde.

Wien. Schmetterl. p. 79. M.

3) mit ſchwarzen Punkten am Aufsenwinkel, und gelben ſchwarz geränderten Unterflügeln.

No. 23. *Heidelbeereulenraupe* (Vaccinii Myrtilli); *Heidelbeereule*, Ph. *Myrtilli.*

Gle-

*) *Nicht abgebildet.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 411. no. 1. Ph. *Ericae*, die *Waldmotte.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 385. Ph. *Myrtilli.*

Fabric. S. E. p. 619. no. 121. NOCTUA *Myrtilli.*

Criſtata; alis deflexis, ferrugineis, albo-maculatis; poſticis luteis; faſcia lata nigra, ſubmarginali.

Larva nuda, viridis, dorſo quinque tuberculato, capite coeruleo.

Pupa brunnea, ſtigmatibus albis.

Othon. Fabric. Faun. Grönl. p. 194. no. 147. Phal. *Myrtilli.* Nom. *Linn.*

Paucas vidi in *Vaccinio uliginoſo.*

168. *Plebeja*, die *Pöbeleule.* *)

Müller l. c. p. 698. no. 168. die *graue Eule.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1210. Ph. *Plebeja* (*genaue Beſchreibung*).

169. *Hepatica*, die *leberfarbige Eule.*

Müller l. c. p. 698. no. 169. die *Leberfarbe.*

Wien. Schmetterl. p. 83. O.

4) Rothbraun.

No. 16. *Unbekannte Raupe. Leberbraune, düſter- und gelbgemiſchte Eule*, Ph. *Hepatica.*

Cathol. H. p. 120. Ph. *Hepatica.*

Clerk Icon. t. 8. f. 3.

170. *Polyodon*, die *vielzähnigte Eule.* **)

Müller l. c. p. 698. no. 170. der *Vielzahn.*

Wien. Schmetterl. p. 72. H. No. 1. *Birkeneulenraupe* (Betulae albae); *Birkeneule*, Ph. *Polyodon.*

Fabric. Syſt. E. p. 616. no. 109. NOCTUA *Polyodon.*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Criſtata, alis deflexis, dentatis, nebuloſis; ſtriga poſtica dentata alba.

Alae *ſubtus* cinereae, arcu punctoque fuſcis.

171. *Oleracea*, die *Krauteule.*

Müller l. c. p. 698. no. 171. der *Wurzelnager.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 740. Phal. *Oleracea*, die *Krauteule.*

Berlin. Magaz. III. p. 284. no. 26. Ph. *Oleracea*, die *Krautmotte.* Rothbraun, mit einem *pomeranzengelben Fleck* in den Oberflügeln, und einem weiſſen Streif.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 31. no. 76. Ph. *Oleracea.* *)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 183. t. 32. die *kleinere Waſſerpfefferraupe.***) p. 75. no. 214. die *kleinere Waſſerpfefferraupe*, Ph. *Oleracea.*

Friſch Inſ. VII. p. 29. no. 21. 3 Pl. t. 21. von der ſchwarzen *Meldenraupe* mit dem gelben Seitenſtreif.

Wien. Schmetterl. p. 83. O.

4) Rothbraun.

No. 19. *Kopflatticheulenraupe* (Lactucae ſativae capitatae); *Kopflatticheule*, Ph. *Oleracea.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 15. Phal. *Oleracea*, *Krauteule.*

Naturforſch. VII. p. 124. Ph. *Oleracea.*

Bekm.

*) Hier wird die *Raupe* die hellgraue und braungerautete *Baumraupe* genannt. Eine Verwechſelung mit der folgenden Oxyacanthae im *Röſel.*

**) Nach der *Linnéiſchen* Beſchr. beſonders in der Faun. Suec. ed. 2. no. 1197. trifft alles aufs genaueſte zu, beſonders die beyden pommeranzengelben Flecke auf den Oberflügeln, und die beyden weiſſen Zickzacklinien am Hinterrande.

Bekm. Epit. Syſt. L. p. 166. no. 171. Phal. *Oleracea.* Nom. *Linn.*

Onomat hiſt. nat. P. 6. p. 391. Ph. *Oleracea.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 166. no. 21.

Phalaena alis exterioribus atro-rubentibus, cum lineola alba prope imum marginem transverſa, duos cuſpides ad ipſum marginem emittente.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 157. no. 67. *Phalene de laitue.*

Fabric. Syſt. E. p. 613. no. 97. NOCTUA *oleracea.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, livida, nigro-punctata; linea dorſali fuſca, laterali alba.

Pupa nuda, nigricans.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1416. Ph. *Oleracea.* Nom. *Linn.*

β. Barbata, der *Haarafter* *).

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2290.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis alis deflexis ferrugineo-cinereis; *maculis alba flavaque;* ano barbato ferrugineo.

Smolandis *Askepiesk.*

In *Urtica*, *Spinacia*, *Atriplice*, frequens aeſtate in domibus, lucentibus candelis ſe ipſam cremans.

*) Ohnerachtet dieſe *Eule* mit der Oleracea viel ähnliches hat, ſo iſt es doch nicht die nämliche, obglei h Hr. Degeer l. c dabey den *Friſch und Röſel* angeführt hat. *Linné* hat ſie durch ſeine genaue Beſchreibungen in der Faun. Suec. ed. 2 ſtandhaft unterſchieden. Dahin gehöret beſonders das: maculis *alba flavaque ano barbato ferrugineo* Ich habe ſie daher gleich als eine Abänderung der Oleraceae unterordnen wollen.

Descr. Alae *posticae* lineola alba: maculae duae obsoletae; *anterior alba*, *posterior flava*. *Anus* ampliſſimus, 3 valvis, *monſtroſiſſimus*, barba rufa tectus. Alae *ſuperiores* ferrugineo-nigrae, maculis et lineolis obſoletis albidis. Alae *ſubtus* pallidae puncto nigricante in medio. *)

Raj. Hiſt. Inſ. p. 165. no. 20.

Phalaena media, corpore brevi craſſo, alis exterioribus e pulvereo rubentibus, maculis nigris variis.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 420. no. 12. t. 7. f. 17. *Chenille* raſe verte ou brune avec des points noirs et blancs, et une bande jaune de chaque côté.

Phalene rouſſe *à ligne ondée blanche.*

Phalene à antennes filiformes à trompe; à ailes rabatues d'un brun rouſſâtre avec deux taches, l'une blanche et l'autre jaune, et une ligne ondée blanche.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 305. t. 7. f. 17.

Die glatte grüne, oder braune *Raupe*, mit ſchwar-

*) Dies alles trifft von der *Röſelſchen* und wahren *oleracea* L. nicht zu. Von dieſer heiſst es Faun. Suec. ed. 2. p. 317. no. 1197. *Deſcr.* Faſciculus duplex thoracis a tergo: altero ad baſin thoracis gibbo, altero ad apicem. *Phalaena tota fuſca* eſt, ſed in medio *alae ſuperioris* verſus marginem craſſiorem *duae maculae pallidae*, quarum prior rotunda, poſterior reniformis. Linea alba intra marginem poſticum duplici dente exiens. Alae *inferiores* cinereae. *Anus* barbatus.

Das vom *Linné* bey Phal. *Oleracea* geſetzte Zitatum: *Friſch* VII. p. 29. t. 21. ſtehet auch bey dieſer zwoten Abänderung in der Faun. Suec. iſt aber richtiger jene, als dieſe. Wir haben dieſe letztere *Barbatam* wegen des auſserordentlich bebärteten Afters genennet.

ſchwarzen und weiſſen Punkten, und einer gelben Binde auf jeder Seite.

No. 12. die *braunröthliche Phaläne mit der geflammten weiſſen Linie.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und braunröthlichen, niederhangenden Flügeln, mit zween Flecken, einem weiſſen und gelben, und einer weiſſen gewäſſerten Linie.

172. *Piſi*, die *Erbſeneule.*

Müller l. c. p. 699. no. 172. der *Hülſenfreſſer.*

Füeßl. ſchweizer. Inſekt. p. 39. no. 741. Ph. *Piſi*, die *Hülſenmotte.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 32. Ph. *Piſi.* *Raupen* freſſen auch andere Gewächſe — — haben viele *Zwirnwürmer.* (Chorh. *Meyer.*)

Berl. Mag. III. p. 284. no. 27. Ph. *Piſi*, die *Erbsmotte.* Rothbraun, bisweilen roſtfarbig grau, mit einigen blaſsſchwefelgelben Flecken und ſchmalen Queerſtreifen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 1011. no. 3. Ph. *Piſi*, die *Erbsmotte.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 76. no. 217. Phal. *Piſi;* die *Erbsmotte*, der *Hülſenfreſſer.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 275. t. 52. Die ſchöne rothbraune, mit vier gelben bandförmigen Streifen, einem fleiſchfarbigen Kopf und dergleichen Füſsen gezierte *Ritterſpornraupe.*

Wiener Schmetterl. p. 83. O.

4) Rothbraun.

No. 14. *Erbſeneulenraupe* (Piſi ſativi); *Erbſeneule*, Ph. *Piſi.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 154. no. 367. Ph. *Piſi*, der *Hülſenfreſſer.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 397. Ph. *Piſi*, der *Erbſenvogel.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 160. no. 10.

Phalaena mediae magnitudinis, alis oblongis, e fuſco rubentibus, nigro et albo variegatis.

Fabric. S. E. p. 610. no. 88. NOCTUA *Piſi.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, ferruginea; lineis quatuor flavis; capite incarnato.

Pupa fuſca, inciſuris ſanguineis.

Müllerí Faun. Fridr. p. 46. no. 404. Ph. *Piſi.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1417. Phal. *Piſi.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 440. no. 10. *Phalene rouſſe à raye blanche en Ziczac.*

Phalene à antennes filiformes à trompe et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun rouſſâtre à taches et rayes brunes, noirâtres et griſes, avec une raye ondée blanche proche du bord poſtérieur.

— *Chenille* raſe brune ou verdâtre avec quatre rayes longitudinales jaunes de Citron.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 322. no. 10. die *braunröthliche Phaläne mit der weiſſen Zikzakſtreife.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden braunröthlichen Flügeln, mit braunen, ſchwärzlichen und grauen Flecken und Streifen, nebſt einer weiſſen gewäſſerten Streife dicht am Hinterrande.

Die *Raupe* glatt, braun oder grünlich, mit vier längſt herunterlaufenden zitrongelben Streifen.

173. *Atriplicis*, die *Meldeneule.*

Müller l. c. p. 699. no. 173. der *Meldenſauger.*

Berlin. Magaz. III. p. 286. no. 29. Ph. *Atriplicis*, die *Meldenmotte.*

Braun, mit gelbgrünen Flecken, in den *Oberflügeln* ein hellokergelber Fleck.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 58. no. 157. Phal. *Atriplicis*, die *Meldenmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 177. t. 31. die glatte, hellbraune, dunkelgeſtreifte und weiſsgeſprenkelte *Raupe*, auf dem *Flöhkraut* oder *Waſſerpfeffer.**)

Wiener Schmetterl. p. 82. O.

3) Grüngemiſcht.

No. 10. *Meldeneulenraupe* (Atriplicis patulae); *Meldeneule*, Ph. *Atriplicis.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 318. Ph. *Atriplicis*, der *Meldenvogel.*

Cathol. A. p. 586. Phal. *Atriplicis.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 91. NOCTUA *Atriplicis.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, rufeſcens, albo-punctata lineaque dorſali fuſca.

Pupa brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 159. no. 97.**)

Le *Volant doré.*

Long. 9. lign.

174. *Praecox*, die *rothgeſäumte Eule.*

Müller l. c. p. 699. no. 174. der *Rothſaum.*

*) Den *Linneiſchen* Karakter der Oberflügel: Lituram flavam *biſidam*, hat *Röſel* ſehr gut ausgedrückt.

**) Die Beſchreibung im *Geoffr.* aus der Faun. Suec. ed. 1. no. 875. gehöret zu *Chryſitis* L. ingleichen das Citatum *Raj.* p. 182. no. 45.

Berlin. Magaz. III. p. 286. no. 30. Phal. *Praecox*, die *Parallelmotte.*

Seladongrün, mit ſchwarzen abgebrochenen Strichen und weiſslichen Flecken; der *Hinterrand roſtfarbig.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 20. Phal. *Praecox*, der *Rothſaum;* die *Parallelmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 273. t. 51. die grünliche, grau- und oraniengelb gefärbte *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 82. O.

3) Grüngemiſcht.

No. 12. *Unbekannte Raupe*; *Blaſsgrüne braungeränderte Eule*, Ph. *Praeceps.* *)

Fabric. S. E. p. 612. no. 94. NOCTUA *Praecox.*

Criſtata, alis deflexis, cinereis, bimaculatis; *poſtice faſcia rufa, abbreviata.*

Larva nuda, griſea; linea dorſali alba.

Pupa brunnea.

175. *Triplacia*, die *dreyhöckrichte Eule.***)

Müller l. c. p. 699. no. 175. der *Dreyhöcker.*

Füeſsl. ſchweizer. Inſ. p. 39. no. 742. Ph. *Triplacia.* der *Dreyhöcker.*

Auf *Neſſeln* nicht ſelten.

Berlin. Magaz. III. p. 288. no. 31. Ph. *Triplaſia*, die *Neſſelmotte.*

Bräun-

*) Wir tragen kein Bedenken, dieſe für L. *Praecox* zu halten, dazu die W. Entomologen ſelbſt geneigt ſind, da *Hufnagel* ſelbſt von der ſeinigen ſagt: *Seladongrün.* Vielleicht nur eine Verſchiedenheit des Geſchlechts.

**) Die *Raupe* hat drey *Höcker* auf dem Rücken. Die *Tripartita* Hufnag. *Berl. Magaz.* III. p. 414. no. 95. eine bloſse Varietät der Triplacia L. S. *Naturf.* IX. p. 139. no. 95.

Bräunlichgrau, an der Einlenkung der Flügel bräunlichgelb; an dem Innenrande dergleichen Fleck mit einem krummen Strich darüber.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 76. no. 214. Phal. *Triplacia*, der *Dreyhöcker.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 190. t. 34. Die grüne, buckelichte *Mooßdiſtelraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 91. Y. *Afterſpannraupen*, Larvae *Pſeudogeometrae; blendende Eulen*, Ph. N. *Submetallicae.*

No. 1. *Neſſeleulenraupe* (Vrticae dioicae); *Neſſeleule*, Ph. N. *Triplaſia.*

Fabric. S. E. p. 617. no. 114. NOCTUA *Triplacia.* Nom. *Linn.*

Pupa folliculata, brunnea.

Müllers Faun. Fridr. p. 46. no. 402. Ph. *Triplacia.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1420. Phal. *Triplacia.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 152. no. 85.

Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis fuſcis; *ſuperioribus* lineis rufis, baſique macula fulva. — L' *aile brune à baſe fauve.*

Long. 7 lign.

Degeer Inſ. I. Mém. 3. p. 123. t. 6. f. 13-21.

Chenille raſe, verte, rayée de blanc, à trois taches obſcures ſur le dos, qui mange les feuilles de l'Ortie et qui marche en quelque ſorte à la maniere des *Arpenteuſes*, bien qu'elle a ſeize jambes complettes.

— — p. 699. t. 6. f. 20. 21.

Phalene à antennes en filets, d'un brun d'agathe, à deux rayes noires, qui renferment une petite tache triangulaire noire.

Degeer

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 442. no. 12. *Phalene à lunettes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun d'agathe, avec deux rayes courbées, et une tache triangulaire noire.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. p. 93. t. 6. f. 13-21.

Die glatte, grüne, weiſsgeſtreifte *Neſſelraupe*, mit drey dunklen Rückenflecken, und ſechzehn vollſtändigen Füſsen, welche aber doch gewiſſermaſsen wie die Spannmeſſer zu gehen pflegt.

— — 4 Qu. p. 122. t. 6. f. 20. 21. Ein achatbrauner *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und zwo ſchwarzen Streifen, zwiſchen welchen ein kleiner ſchwarzer dreyeckiger Fleck liegt.

— II Th. I B. p. 323. no. 12.*) *Phalene à lunettes*, die *Brillenphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm und niederhangenden achatbraunen Flügeln, mit zwo ſchwarzen gekrümmten Streifen, und einem dreyeckigen Fleck von gleicher Farbe.

Réaum. Inſ. I. t. 37. f. 1. 2. 3.

176. *Satellitia*, die *Trabanteneule.*

Müller l. c. p. 700. no. 176. der *Trabant.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 743. Ph. *Satellitia.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Ber-

*) Hierbey iſt zu erinnern, daſs in der Ueberſ. die vom *Degeer* angeführten Zitata des Linné, Geoffr. und Réaum. aus Verſehen ausgelaſſen ſind.

Berlin. Magaz. III. p. 418. no. 102. Ph. *Transverſa*, die *Queermotte.*

Rothbraun, mit vielen dunklern Queerſtreifen, und einem weiſsgelben Fleck in der Mitte der Flügel, unter welchem noch zween ganz kleine ſtehen.

Naturforſcher IX. p. 143. no. 102. Ph. *Transverſa* iſt L. *Satellitia* (von *Rottemb.*).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 20. no. 38. Ph. *Satellitia*, der *Trabant.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 287. t. 50.

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige *ſchwarze Raupe* mit dem braunen Kopfe und einer abgeſetzten hellen Seitenlinie — auf den Stachelbeeren.

Wiener Schmetterl. p. 86. R. No. 5. *Frühebirnraupenrule* (Pyri communis); *Frühebirneule*, Phal. *Satellitia.*

Fabric. S. E. p. 609. no. 81. NOCTUA *Satellitia.* Nom. *Linn.*

Larva nigra, linea laterali alba.

Pupa brunnea, poſtice obtuſe tridentata.

177. *Tragoponis*, die *Bocksbarteule.*

Müller l. c. p. 700. no. 177. der *Bocksbart.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 744. Ph. *Tragoponis.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 40. Phal. *Luciola*, der *Einſiedler.*

Glänzendgraubraun mit 3 kleinen ſchwärzlichen Flecken auf jedem Oberflügel.

Naturforſcher IX. p. 115. no. 40. Ph. *Luciola* iſt L. *Tragoponis* (von *Rottemb.*).

Friſch Inſ. XI. p. 33. 2 Pl. t. 9. von der grünen *Ritterſpornraupe* mit ſchwarzen Strichen.*)

Wie-

*) Unrichtig, daſs die Seitenlinien ſchwarz ſind; ſie ſind alle weiſs.

Wiener Schmetterl. p. 85. Q.

1) Ohne Queerſtriche.

No. 14. *Bocksbarteulenraupe* (Tragoponis pratenſis); *Bocksbarteule*, Ph. *Tragoponis.*

Fabric. S. E. p. 615. no. 107. NOCTUA *Tragoponis.* Nom. *Linn.*

— poſticis *lividis.*

Müller Faun. Fridr. p. 45. no. 398. Ph. *Tragoponis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1421. Ph. *Tragoponis.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 418. t. 7. f. 15. *Phalene griſe tête-jaune.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un gris cendré très-luiſant, avec trois points noirs au milieu; à tête jaune.

Chenille raſe d'un verd clair à cinq lignes fines blanches tout le long du corps.

— *Ueberſ.* II. Th. I B. p. 303. no. 10. t. 7. f. 15. die *graue Phalene mit gelbem Kopfe.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und ſehr glänzend-aſchgrauen niederhangenden Flügeln, mit drey ſchwarzen Mittelpunkten und gelbem Kopfe.

Die *Raupe* glatt, hellgrün, mit fünf feinen weiſſen Linien längſt dem Körper.

178. *Nigricans*, der *Schwärzling.* *)

Müller l. c. p. 700. no. 178. der *Schwärzling.*

Wien. Schmetterl. p. 81. N.

3) Mit verfinſterten Makeln.

No. 19. *Wegewarteulenraupe* (Cichorii Intybi); *Wegewarteule*, Ph. *Nigricans.*

Fa-

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 616. no. III. NOCTUA *Nigricans.* Nom. *Linn.*

Puncta aliquot minutiſſima ad marginem craſſiorem.

179. *Tritici*, die *Weizeneule.*

Müller l. c. p. 700. no. 179. die *Kornähre.*
Friſch Inſ. X. p. 21. no. 19. 3 Pl. t. 19. von der *Halmraupe.*
Wien. Schmetterl. p. 81. N.

2) Mit hellen oder deutlichen Ring - und Nierenmakeln.

No. 10. *Weizeneulenraupe* (Tritici hiberni *Spicis*); *Weizeneule*, Ph. *Tritici.*

180. *Polymita*, die *Rettigeule.*

Müller l. c. p. 700. no. 180. der *Rettigbeiſſer.*
Wiener Schmetterl. p. 72. H.

No. 4. *Rettigeulenraupe* (Raphani Sativi); *Rettigeule*, Ph. *Polymita.*
Merian. Eur. t. 35?

181. *Pyramidea*, die *Pyramideneule.*

Müller l. c. p. 701. no. 181. der *Flammenflügel.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 745. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*
— Magaz. der Entomol. II. p. 33. Phal. *Pyramidea.*

1) Zwo Raupen dieſer Art mit andern *Strichen und Punkten* als die *Röſelſchen.*

2) Weder *Reaumür* noch *Röſel* haben die *ſonderbare Stellung* dieſer Raupe bemerkt, die der von der Ph. *Camelina* L. n. 80. ähnlich iſt, und worinn ſie oft *länger* als dieſe bleibt.

3) Bey-

3) Beyde haben sich in einem zusammengezogenen *Blatte* — *eine* in einem eyförmigen Gewebe, die *andere* ohne anderes Gespinnste, verwandelt — hat sie mit *Haselnußblättern* gefüttert. (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Magaz. III. p. 288. no. 32. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

Dunkelbraun, mit theils schwarzbraunen, theils gelblichen Zeichnungen, die Unterflügel rothbraun.

— p. 422. not. E. Bey dieser Phaläne hat *Rösel* eine *ganz falsche Raupe* angegeben. *)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 12. no. 11. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramidenmotte*, der *Flammflügel.*

Röselś Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 73. t. 11. die glatte, blafsgrüne *Pyramidenraupe*, die eine pyramidenähnliche Erhöhung auf den zwey hintersten Absätzen führt.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 648. no. 18. et p. 745. 820. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

Wien. Schmetterl. p. 71. G.

1) Mit kupferbraunen Flügeln.

2) Raupen mit erhabenem gespitzten Hinterleibe.

No. 1. *Nußbaumeulenraupe* (Juglandis regiae); *Nußbaumeule*, Ph. *Pyramidea.*

Fi-

*) Die vom *Rösel* angegebene *Raupe* hat hinten die pyramidenförmige Erhöhung, und stimmt mit der *Linnéischen* Beschreibung und *Réaumurs* Abbildung derselben vollkommen überein. Ich möchte denn wohl wissen, wenn die *Röselsche* angegebene Raupe ganz falsch sey, welches die wahre *Raupe* der Ph. *Pyramidea* wäre. Hr. *Hufnagel* hat sich also geirret. Denn ich habe den Vogel aus eben dergleichen Raupen, wie Rösel abgebildet hat, oft gezogen. Man findet sie häufig in den Gärten.

Fiſchers N. G. von Livl. p. 154. no. 368. Ph. *Pyramidea*, der *Flammenflügel.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 159. no. 9.

Phalaena media, alis longis, anguſtis; *exterioribus* lineis et areolis nigris, albis, atro-rubentibus, transverſis pulchre depictis; *interioribus* obſcure rubris.

— Ib.

Eruca viridis, glabra, lineis albis ſecundum longitudinem ductis varia, anguloſa in extremo dorſo eminentia ſeu ſpina dotata.

Fabric. S.E. p. 612. no. 95. NOCTUA *Pyramidea.*

Criſtata, alis fuſcis; ſtrigis tribus undatis, flaveſcentibus repandis; *poſticis* ferrugineis.

Larva nuda, viridis, linea dorſali lateralibusque albis, poſtice *conico-gibba.*

Pupa brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 160. no. 99.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; *ſuperioribus* fuſcis, lineis transverſis undulatis nigris, *inferioribus* ferrugineis.

La *Brunette à ailes inférieures rougeâtres.*

Long. 11. lign.

Chenille verte, et à ſa partie poſtérieure relevée en pointe, comme *le bout d'un bateau.*

182. *Flavicornis*, das *Gelbhorn.*

Müller l. c. p. 701. no. 182. das *Gelbhorn.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 746. Ph. *Flavicornis*, das *Gelbhorn.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 163. die glänzende blafsgrüne und ſchlanke *Raupe* mit gelben Strichen. *)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 271. t. 50. die glänzende blafsgrüne und ſchlanke *Eichenraupe* mit gelben Streifen.

Wiener Schmetterl. p. 72. H. No. 6. *Hageicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Hageicheneule*, Ph. *Flavicornis* — et p. 151. wo eine Berichtigung wegen *Schäffers* Zitati.

Fabric. S. E. p. 617. no. 113. NOCTUA *Flavicornis*. Nom. *Linn.*

Larva nigra, albo - punctata, capite brunneo.

Mantiſſ. p. 283. — 33-34.

Noctua laevis, alis deflexis cinereis, ſtrigis duabus undatis albis; macula centrali nivea: *lunula nigra.* **)

Habitat in Germaniae *Quercu.*

Larva glabra *viridis*, utrinque lineis duabus longitudinalibus flavis.

183. *Leu-*

*) Wir trugen anfänglich Bedenken, *Röſels* t. 50. und *Fabric.* Mant. hierbey anzuführen; allein, auſserdem, daſs die *Röſelſche* Phaläne das weſentliche Kennzeichen des Linné: Flavicornis hat, und mit der übrigen Beſchreibung ziemlich übereinſtimmt, ſo ſagen die *Wien. Entomologen*: „Bergmann hat zwar ſeine Flavicornis vom Pappelbaume; wir erhalten ſolche Eulen immer nur häufig von der Eiche. Es ſtimmen freylich nur wenige davon mit der Beſchr. des Ritters L. überein; allein *dieſe Art ſpielt in ihren einzelen Eulen ſo verſchieden, daſs ſich ſelten zwo recht ähnlich ſehen.*“

Fabric. ſagt: habitat in *Pomonae arboribus*, und giebt die *Raupe* für ganz *ſchwarz* aus, welches der einzige Zweifel iſt, der uns übrig bleibt.

**) Dieſe Beſchreibung trifft genau bey der *Röſelſchen* zu.

183. *Leucomelas*, die *weiß- und ſchwarze Eule.* *)
Müller l. c. p. 701. no. 183. die *Weißwolke.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 747. Ph. *Leucomelas*, die *Elſter.*
Berl. Mag. III. p. 288. no. 12. Ph. *Leucomelas*, die *Elſter.*
Die *Oberflügel* ſchwarz, mit Grau ſchattirt; die *Unterflügel* ſchneeweiſs mit einem breiten ſchwarzen Rande.
Wien. Schmetterl. p. 90. W. *Bogenſtrichraupen;* Larvae *Curvilineatae; zweydeutige Eulen*, Ph. N. *Aequivocae.*
2) Schwarz, oder ſchwarzfleckicht.
No. 6. *Unbekannte Raupe. Schwarze weißmackelichte Eule*, Ph. *Leucomelas.*
Naturforſcher XIV. p. 90. t. 4. f. 10. Beſchr. der Ph. *Leucomelas* L. (*Capieux.*)
Fabric. Syſt. E. p. 613. no. 98. NOCTUA *Leucomelas.* Nom. *Linn.*

184. *Bimaculoſa*, der *Doppelfleck.* **)
Müller l. c. p. 701. no. 184. der *Schwarzfleck.*

185. *Dipſacea*, die *Karteneule.*
Müller l. c. p. 702. no. 185. der *Kartenvogel.*
Berlin. Magaz. III. p. 406. no. 84. Ph. *Viriplaca*, der *Grünzling.*
Grünlich, blaſsgelb, mit zwo dunklern Binden, und einem braungerändeten Fleck. Die *Unterflügel* blaſsgelb mit ſchwarzem Rande.

*) Dieſe *Leucom.* L. iſt weder die *Schäfferſche* Icon. t. 51. f. 11. 12. noch des *Geoffr.* II. p. 149. n. 80. *Alchymiſte.* S. *Wien. Schmett.* p. 150.

**) *Nicht abgebildet.* Dieſe verdiente es vor andern. Wenn ſie Herr *Schaller* in Halle beſitzt, ſo ſchlage ich den Naturforſcher und *Capieux's* Meiſterhand vor.

Naturforscher IX. p. 136. no. 84. Ph. *Viriplaca* ist L. *Dipsacea* (v. *Rottemb.*).

Wiener Schmetterl. p. 89. W.

1) Die Oberflügel oliv- oder buntfarbig.

No. 3. *Mengelwurzeulenraupe* (Rumicis acuti); *Mengelwurzeule*, Ph. *Dipsacea.*

Fabric. S. E. p. 598. no. 52. NOCTUA *Dipsacea.* Nom. *Linn.*

186. *Typica*, der *Splitterstrich.*

Müller l. c. p. 702. no. 186. der *Splitterstrich.*

Füeßl. schweizer. Ins. p. 39. no. 748. Phal. *Typica*, das *Netz.*

Auf den *Weiden*: selten.

Berlin. Magaz. III. p. 290. no. 34. Ph. *Typica*, das *Netz.*

Graubraun, mit einem nierenförmigen dunkeln Fleck, und netzförmigen blassgelben Strichen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 22. Ph. *Typica*, der *Splitterstrich.*

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 286. t. 56. die erdbraune *Raupe* mit hellen Seitenstreifen.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 744. no. 39. Ph. *Typica*, das *Netz.*

Wien. Schmetterl. p. 82. O.

2) Graulich mit weissen Linien die Oberflügel.

No. 4. *Flechtweideneulenraupe* (Salicis Pentandrae); *Flechtweideneule*, Ph. *Typica.*

Fabric. Syst. E. p. 613. no. 96. NOCTUA *Typica.* Nom. *Linn.*

Larva nuda grisea, lateribus albis, linea nigra. *Pupa* folliculata, brunnea.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1422. Ph. *Typica.* Nom. *Linn.*

187.

187. *Lucipara*, der *Purpurglanz.* *)

Müller l. c. p. 702. no. 187. der *Purpurglanz.*

Berlin. Magaz. III. p. 404. no. 80. Ph. *Dubia*, der *Leberfleck.*

Hellgelbbraun, mit einer ſchwarzbraunen breiten Binde, und einem hellgelben nierenförmigen Fleck.

Naturforſch. IX. p. 135. no. 80. Ph. *Dubia* iſt L. Ph. *Lucipara.* (v. *Rottemb.*)

Wiener Schmetterl. p. 84. P.

No. 3. *Brombeerſtraucheulenraupe* (Rubi fruticoſi); *Brombeerſtraucheule*, Ph. *Lucipara.*

188. *Delphinii*, der *Purpurflügel.*

Müller l. c. p. 702. no. 189. der *Ritterſporn.*

Berlin. Magaz. III. p. 290. no. 35. Phal. *Delphinii*, die *Roſenmotte.*

Purpurroth; theils heller, theils dunkler; die *Unterflügel* gelblich braun.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 81. t. 12. die veilblaue, gelbgeſtreifte und ſchwarzgeſprengte *Raupe* auf dem Ritterſporn.

Wien. Schmetterl. p. 87. T.

3) Purpurfarben.

No. 8. *Ritterſporneulenraupe* (Delphinii Conſolidae); *Ritterſporneule*, Ph. *Delphinii.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 384. Ph. *Delphinii*, der *Ritterſpornvogel.*

Fabric. S. E. p. 610. no. 87. NOCTUA *Delphinii.* Nom. *Linn.*

Larva laevis, nuda, flaveſcens, nigro-punctata lineisque duabus flavicantibus.

Pupa brunnea.

*) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inſ. II. p. 164. no. 109.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis deflexis roſeis ſuperioribus faſcia duplici limboque albidis.

L' *Incarnat.*

Long. 7. lign.

189. *Citrago*, die *Zitroneule.*

Müller l. c. p. 702. p. 189. der *Zitronvogel.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 41. Ph. *Umbra*, die *Zimmetmotte.*

Pomeranzengelb, mit breiten braungelblichen Binden an dem Hinterrande; die *Unterflügel* blaſsgelb mit einem ſchwärzlichen Rande.

Naturf. IX. p. 115. no. 41. Ph. *Umbra.* (Umſtändlich beſchrieben. Zuletzt: ich bin noch ungewiſs, ob es nicht die Ph. *Citrago* L. iſt. von *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 745. no. 43. Ph. *Citrago.*

Die gelbe *Nachteule* mit drey roſtfarbigen ſchrägen Queerbinden.

Wien. Schmetterl. p. 86. S. *Bleichkopfraupen*, Larvae *Ochrocephalae; goldgelbe Eulen*, Ph. N. *Aureolae.*

No. 3. *Steinlindeneulenraupe* (Tiliae Europaeae); *Steinlindeneule*, Ph. *Citrago.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 157. Ph. *Citrago*, *Zitronvogel.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 606. no. 67. NOCTUA *Citrago.*

Criſtata, alis incumbentibus, luteis, ferrugineo-ſubfaſciatis.

Degeer Inſ. II. Part. I. p. 429. no. 4. t. 7. f. 25.

Phalene à antennes filiformes à trompe, et à corcelet huppé; à ailes rabatues jaunes à quatre rayes transverſes, et deux cercles ovales roux.

Pha-

Phalene jaune à rayes rouſſes.

Chenille raſe brune ou griſeâtre marquée de pluſieurs taches noirâtres, et à ſeize pattes.

Degeer Ueberſ. II Th. II B. p. 313. no. 4. t. 7. f. 25.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, und gelben niederhangenden Flügeln, mit vier braunrothen Queerſtreifen, und zween dergleichen eyförmigen Zirkeln.

Die gelbe braunrothgeſtreifte Phaläne.

Die *Raupe* glatt, braun oder graulich mit verſchiedenen ſchwärzlichen Flecken, und ſechzehn Füſsen.

190. *Fulvago*, der *Roſtpunkt.*

Müller l. c. p. 703. no. 190. der *Roſtpunkt.*

Wien. Schmetterl. p. 86. S. No. 1. *Weißbirkeneulenraupe* (Betulae albae); *Weißbirkeneule*, Phalaena *Fulvago.*

Clerk Icon. t. 6. f. 15.

191. *Depuncta*, der *Punktſtrich.**)

Müller l. c. p. 703. no. 191. der *Punktſtrich.*

Othon. Fabric. Faun. Grönl. p. 195. no. 148. Phal. *Depuncta.* Nom. *Linn.*

192. *Litura*, der *Dreyſtrich.* **)

Müller l. c. p. 703. no. 192. der *Dreyſtrich.*

Wien. Schmett. p. 77. M.

1) mit ſchwärzlichen Punkten am Auſſenrande. No. 2. *Korbweideneulenraupe* (Salicis amygdalinae); *Korbweideneule*, Ph. *Litura.*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

193. *Retusa*, der *Stumpfflügel.* *)

Müller l. c. p. 703. no. 193. der *Oblatenflügel.* *Wien. Schmetterl.* p. 88. T.

5) Olivenbraun und wicklerförmig.

No. 18. *Bandweideneulenraupe* (Salicis viminalis); *Bandweideneule*, Ph. *Retusa.*

Unabgebildete Linnéische Eulen.

(Ph. *Noctuae.*)

1. *Sylvina.* No. 87.
2. *Ancilla.* No. 93.
3. *Parthenias.* No. 94.
4. *Algira.* No. 98.
5. *Ocularis.* No. 100.
6. *Sanguinolenta.* No. 101.
7. *Narbonea.* No. 103.
8. *Mi.* No. 106.
9. *Nivea.* No. 108.
10. *Heliconia.* No. 111.
11. *Pacta.* No. 120.
12. *Circumflexa.* No. 128.
13. *Virens.* No. 139.
14. *Affinis.* No. 144.
15. *Triptera.* No. 145.
16. *Diffinis.* No. 146.
17. *Putris.* No. 152.
18. *Comma.* No. 156.
19. *Vaccinii.* No. 166.
20. *Plebeja.* No. 168.
21. *Polyodon.* No. 170.
22. *Nigricans.* No. 178.
23. *Bimaculosa.* No. 184.
24. *Lucipara.* No. 187.

25. *De-*

*) *Nicht abgebildet.*

25. *Depuncta.* No. 191.
26. *Litura.* No. 192.
27. *Retusa.* No. 193.

NEUE EULEN.

(Phal. *Noctuae.*)

1. *Allica*, der *oſtindianiſche Blaufleck.*

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. Anim. p. 225.
Phalaena N. ſpirilinguis laevis, flava; alis ſuperioribus maculis duabus coeruleis connexis, margine coeruleo.
Müllers Suppl. u. Reg. B. p. 309. no. 116. a. Phal. *Allica*, der *Blaufleck.*

2. *Decora*, die *kapenſiſche Schöne.*

Linn. S. N. ed. 12. App. p. 1064. no. 14.
Phalaena ſubſpirilinguis; alis *ſuperioribus* albo-nigroque variegatis; *inferioribus* rubris margine nigro.
Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 11. t. 7. Fig. E F. (Mas), Ph. Hibou *Julie.* (v. p. 155. *Addit.* Ph. *Decora* Linn.)
— — Vol. III. p. 44. t. 219. Fig. F G. Phal. *Decora* — du *Cap. de B. E.*
Houttuin Hiſt. Nat. Tom. I. p. XII. p. 676. t. 92. f. 6. (*Femina.*)
Petiv. Gazoph. t. 58. f. 7.
Müllers Suppl. u. Reg. B. p. 311. no. 193. c. Ph. *Decora*, die *Docke.*

3. *Deplana*, der *Flachflügel.*

Linn. Mantiſſ. p. 539.

Phalaena ſpirilinguis, laevis, alis depreſſis; *ſuperioribus* lividis, margine baſeos nigris. Statura et ſimilitudo ſumma Ph. *Complanatae*, ſed *paulo maior*.

Fabric. S. E. p. 595. no. 20. NOCTUA *Deplana*. Laevis, alis incumbentibus, cinereis, thorace flavo.

In *Europae hortis*.

Müllers Suppl. u. Reg. B. p. 309. no. 116. b. Ph. *Deplana*, der *Hangflügel*.

4. *Argentea*, der *ſilberfleckige Mönch*.

Berl. Mag. I. p. 648. c. fig. 1-4.

Beſchreibung einer ſeltenen bisher unbekannten *Raupe*, und der daraus entſtehenden *Phaläne* (*Hufnagel*).

— III. p. 286. no. 28. Ph. *argentea*.

Die *Oberflügel* gelblichgrün, *mit 7 ſilberglänzenden Flecken* und weiſſem Rande; die *Unterflügel* ganz weiſs.

Naturforſcher IX. p. 113. no. 29. Ph. *argentea*.

Einer der *ſchönſten und ſeltenſten* europäiſchen Nachtvögel (v. *Rottemb.*).*)

Knochs Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 45. no. 8. t. 3. f. 2. Ph. *argentea*, der *ſilberfleckichte Mönch*. (*illumin.*)

Füeßl. Archiv der Entomol. I Heft, 4 Bogen, t. 5. f. 1-7. Naturgeſchichte des *Silbermönchs*. Phal. N. *argentea*.

(P. *Herbſt*:

*) Die *Hufnagelſche* Abbildung, ſagt Hr. v. *Rottemb.* ſey etwas ſchlecht gerathen; er verſpricht daher eine getreuere und beſſere Abbildung dieſes ſeltnen Vogels.

(P. *Herbſt:* vortrefflich *abgebildet und illuminirt.*)

Ph. N. criſtata, ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis, ſuperioribus viridibus, maculis ſeptem argenteis; poſticis albidis, margine dilutiore cinereo.

(Die Larve mit Fliegenmaden behaftet.)

5. *Artemiſiae*, der *bunte Mönch.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 38.

Dunkelaſchgrau, ſo an einigen Orten ins Helle fällt, mit einem nierenförmigen Fleck und andern Zeichnungen.

Naturforſch. IX. p. 114. no. 38. Ph. *Artemiſiae* — Der Ph. *Abſinthii* L. ſehr gleich. *Unterſcheidungszeichen* laſſen ſich nicht beſchreiben, ſondern am beſten durch den Augenſchein erkennen (v. *Rottemb.*).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 81. no. 232. die ſchöne grüne *Kamillenraupe* mit rothen dornenähnlichen Spitzen, der N. V. 2 Kl. *Artemiſia.*

Röſels Inſektenbeluſtig. III. p. 289. t. 51. f. 1-4. — die ſchöne grüne *Kamillenraupe* etc. (*ohne Vogel.*)

Wien. Schmetterl. p. 73. I. *Tigerraupen; kappenhalſigte Eulen.*

1) Weiſs mit Roth und grün: *die Raupen.*

No. 2. *Stabwurzeulenraupe* (Artemiſiae Abrotani et campeſtris); *Stabwurzeule*, Ph. N. *Abrotani.*

— — *Nachtrag* p. 312. q. (1) *Beyfußeule.* Anmerk. (*Hufnagel.*)

6. *W latinum*, das *lateiniſche W.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 39.

Grau-

Graubraun, mit einem unmerklichen nierenförmigen Fleck; in der blafsgelben Randlinie ein lateinifches W.

Naturf. IX. p. 114. no. 39. Ph. *W.* (v. *Rottemb.*)

— Die Gröfse wie Ph. *Oleracea* L.

7. *Icteritia*, die *Sommerfproffe.*

Berlin. Magaz. III. p. 296. no. 43.

Blafsfchwefelgelb, mit röthlichen zerftreuten Flecken und Punkten; die Unterflügel weifs.

— — p. 423. G. eine *durchaus blafsgelbe*, nur in der Mitte der Oberflügel ein bräunlichrother kleiner Fleck.

Naturf. IX. p. 117. no. 43. Phal. *Icteritia.* Der in der Anm. G. eine blofse Varietät der Icteritia (v. *Rottemb.*). die Gröfse wie Ph. *Oo* L.

8. *Munda*, die *Dachmotte.* *)

Berlin. Magaz. III. p. 296. no. 45.

Ganz blafsgelb, mit einem braunen Hinterrande und 2 fchwarzen Punkten in der Mitte der Flügel.

Naturf. IX. p. 118. no. 45. Ph. *Munda.* — Zu den kleinften diefer Art, viel ähnliches mit den *Blattwicklern.*

Gleditfch Forftwiff. I. p. 650. no. 22. Ph. *Munda*, die *Dachmotte.*

9. *Tha-*

*) Faft follt ich diefe mit L. *Mundana* no. 17. für einerley halten, zumal da Hr. von *Rottemb.* fagt: fie habe viel ähnliches mit den *Blattwicklern.* Daher hab ich auch bey der Mundana L. den Gleditfch bereits angeführt. Noch kann ichs nicht mit Gewifsheit entfcheiden.

9. *Thalaſſina*, der *Rothglanz*.

Berlin. Magaz. III. p. 298. no. 46.
Glänzend, bräunlichgelb, dunkelſchattirt, mit einem blaſsgelben nierenförmigen Fleck.
Naturforſch. IX. p. 119. no. 46. Ph. *Thalaſſina*. In der Gröſse der Ph. *Piſi* (v. *Rottemb.*).

10. *Incerta*, der *Chamäleon*.

Berl. Magaz. III. p. 298. no. 47.
Bald gelbroth, bald aſchgrau, bald rothbraun, mit einem dunklen nierenförmigen weiſs eingefaſsten Fleck.
— — p. 424. H. weichen ſehr in ihren Zeichnungen ab.
Naturf. IX. p. 119. no. 47. Ph. *Incerta*. (von *Rottemburg.*)
Röſels Inſektenbel. I. V. N. 2 Kl. p. 278. t. 53. die gelblichgrüne mit 3 gelben Streifen gezierte glatte *Raupe* auf den Kirſchbäumen.
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 21.*) p. 33. no. 81. Ph. *Incerta*; Ph. *Ceraſi*, die *Kirſchmotte*.
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 555. no. 6. et II. p. 746. no. 45. Ph. *Incerta*, der *Chamäleon*.
Im *Junio* häufig auf Erlen und Weiden.
Füeßl. Magaz. der Entom. II. p. 15. Ph. N. *Ceraſi*.
1) *Raupe* friſst die Blätter vom *Schlehendorn*.
2) hat *Zwirnwürmer*.
3) der Vogel kömmt im warmen Zimmer ſchon den 23ten *Jänner* aus (Chorh. *Meyer*).
Fabric. S. E. p. 600. no. 42. NOCTUA *Ceraſi*.

Lae-

*) Hier iſt die Ueberſchrift zu t. 55. aus Verſehen zu t. 53. geſetzt, und das Zitatum am Rande LV muſs LIII heiſſen, wie p. 33. n. 81.

Laevis, alis deflexis, griſeo - ferrugineis; maculis ſtrigaque poſtica flaveſcentibus, margine nigro punctato.

In *Ceraſo* Angliae, Germaniae.

Alae poſticae cinereae, nitidae, ſubtus puncto magno centrali, fuſco.

Larva flaveſcens, ſtriis tribus ſulphureis; capite coeruleo.

Pupa nuda, brunnea, poſtice bidentata.

11. *Morpheus*, der *Schmuz.*

Berlin. Magaz. III. p. 302. no. 52.

Schmuzgelb mit 2 grauen Binden; und einem dergleichen Fleck auf den Oberflügeln.

Naturforſcher IX. p. 121. no. 52. Ph. *Morpheus*: in der Gröſse der Ph. *Brunnea.* (von *Rottemb.*)

12. *Bicruris*, die *Winkelmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 302. no. 53.

Braun, mit Grau ſchattirt, und eine weiſſe Zeichnung in Form eines Winkels.

Naturf. IX. p. 121. no. 53. Ph. *Bicruris* (von *Rottemb.*).

Friſch Inſ. X. p. 14. no. 11. 3 Pl. t. 11. von der *Bilſenraupe.*

13. *Lucida*, die *Tagemotte.*

Berl. Magaz. III. p. 302. no. 52.

Schwarzbraun mit weiſſen Flecken, die Unterflügel weiſs mit breitem ſchwarzem Rande.

— — p. 424. I. die *Raupe* ſoll zu den *Spannmeſſern* gehören.

Naturf. IX. p. 122. no. 52. Ph. *Lucida.* Der Vogel gehört

gehört doch mit Recht zu den Noctuis. (v. *Rottemb.*)

— Etwas kleiner als Ph. *Fuliginosa.*

14. *Ornitopus*, die *Strichmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 304. no. 56.

Weifs und grau marmorirt mit feinen grauen Zeichnungen, und gelben nierenförmigen Fleck.

Naturf. IX. p. 124. no. 56. Ph. *Ornitopus.* In der Gröfse der Ph. *Pfi.* (von *Rottemb.*)

15. *Orbona*, die *Trauerbinde.* *)

Berl. Magaz. p. 304. no. 57.

Die *Oberflügel* rothbraun mit einem nierenförmigen braunen Fleck. Die *Unterflügel* oraniengelb mit schwarzem Rande und schwarzen Flecken.

Naturf. IX. p. 125. no. 57. Ph. *Orbona.* Nie gröfser als Ph. *Brassicae.*

Vielleicht das *Männchen* von Phal. *Pronuba* — (von *Rottemb.*).

Unbekannte Raupe.

Degeer Inf. II. Part. I. p. 401.

— Une autre espece, qui leur (Ph. *Pronuba*) ressemble beaucoup, mais qui est constamment plus petite — en quantité en *Hollande.*

Merian. Eur. t. 63.

16. *Triangulum*, das *doppelte Dreyeck.*

Berl. Magaz. III. p. 306. no. 58.

Rothgelb oder braun, mit einem grofsen dun-

*) Viel ähnliches mit *Pronuba* L. n. 122. aber nur halb so grofs.

dunkelbraunen Fleck, ſo zwey mit ihren Spizen zuſammenſtoſsende Triangel vorſtellt.

Naturf. IX. p. 125. no. 58. Ph. *Triangulum.* In der Gröſse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)*)

17. *Sordens*, der *Eſel.*

Berl. Magaz. III. p. 306. no. 59.

Bräunlichgrau mit einem ſchwärzlichen nierenförmigen, und einem länglicht runden Fleck.

Naturf. IX. p. 126. no. 59. Ph. *Sordens.* In der Gröſse der vorigen Ph. *Triangulum.* (v. *Rottemburg.*)

18. *Lateritia*, die *Ziegelmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 306. no. 60.

Ziegelfarbig, mit einem weiſſen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Naturf. IX. p. 127. no. 60. Ph. *Lateritia.*

Rothbraun. In der Mitte der Oberflügel ein dunkelbrauner nierenförmiger Fleck mit einer weiſslichen Einfaſſung.

Beynahe in der Gröſse der Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

19. *Monoglypha*, der *Treiber.*

Berl. Magaz. III. p. 307. no. 62.

Theils blaulich, theils hell, theils dunkelgrau mit einem lateiniſchen W an dem hintern Rande.

Na-

*) Noch eine beſondere Art, dieſem ſehr ähnlich. Die *Oberflügel* ganz ſchwarzbraun; in dieſem Grunde nahe am Oberrande zwey *kohlſchwarze Triangel*, die mit den Spitzen zuſammenſtoſsen. Der dazwiſchen befindliche Raum weiſslich, und ſtellt den dritten weiſsen Triangel vor. Die *Unterflügel* weiſsgrau. Eine *wirklich verſchiedene Art.* (v. *Rottemb.*)

Naturf. IX. p. 128. no. 62. Ph. *Monoglypha.* Vier helle gezackte Queerlinien auf den Oberflügeln, deren vierte zunächst am Aussenrande am meisten gezackt ist, und in der Mitte ein lateinisches W formirt. — Etwas kleiner als Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

20. *Subcorticalis*, die *Rindenmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 307. no. 63.
Schmuziggelb, mit einer Reihe schwarzer Punkte und braunem Vorderrande.

Naturf. IX. p. 128. no. 63. Ph. *Subcorticalis.* In der Mitte der Oberflügel ein nierenförmiger Fleck, der in der Mitte schwarzgrau, am Rande hellbraun, und mit einer braunen Linie eingefasst ist. (v. *Rottemb.*)

Gleditsch Fortwiss. II. p. 747. no. 49. Ph. *Subcorticalis*, die *Rindenmotte.*

21. *Velitaris*, die *Segelmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 394. no. 64.
Schmuziggelb, mit 2 braunen Queerstreifen, daran die hinterste unterbrochen ist.

Naturf. IX. p. 129. no. 64. Ph. *Velitaris.* Etwas kleiner als Ph. *Camelina* — steht mit Unrecht unter den Noctuis; das *Männchen* hat haarichte Fühlhörner (Antennas pectiniformes); also ein *Bombyx.* (v. *Rottemb.*)

Knochs Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 66. no. 14. t. 4. f. 8. Ph. *Bombyx* velitaris, die *Segelmotte.*
Elinguis, crista; alis pallide moschatinis; superioribus strigis duabus albis undatis lineola intra apicem fusca.

22. *Irregularis*, der *Buntſcheck.*

Berlin. Magaz. III. p. 394. no. 65.
Schmuziggelb mit weiſſen Flecken, und ausgezackten braunen Queerſtreifen.

Naturforſch. IX. p. 130. no. 65. Phal. *Irregularis.* Zu den kleinern Arten: kaum ſo groſs, als Ph. Fuliginoſa — doch mit ſehr abwechſelnden Farben, und ſehr feinen Zeichnungen. (v. *Rottemb.*)

23. *Lunula*, das *Möndchen.*

Berlin. Magaz. III. p. 394. no. 66.
Graubraun, mit einigen dunkelbraunen Flecken, und einem kleinen ganz weiſſen mondförmigen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Naturforſcher IX. p. 130. no. 66. Ph. *Lunula.*
Noch kleiner als der vorige. (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 29. Phal. *Lunula*, das *Möndchen.*

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 282. no. 39.*) t. 16. f. 15.
Ph. N. *Lunula*, ſpirilinguis criſtata, alis deflexis atro-purpureis, nebuloſis, lineola arcuata *flava.*

24. *Singularis*, der *Sonderling.* **)

Berlin. Magaz. III. p. 396. no. 67.

Röth-

*) Ich halte dieſen und die beyden *Röſelſchen* I. N. V. 2 Kl. t 44. et 45. (*Müll.* Zool. Dan. Pr. no. 1430.) nebſt *Hufnagels* Lunula für lauter nahe verwandte Arten, oder auch wohl nur für bloſse Abänderungen. S. no. 55. 56.

**) Dieſe ſcheint der Hr. v. *Rottemb.* in ſeinem ſchönen *Erläuterungsregiſter* überſehen zu haben.

Röthlichbraun, theils heller, theils dunkler, mit einem blafsfleifchfarbenen fehr gebogenen Haken.

25. *Simulans*, der *Heuchler.*

Berl. Magaz. III. p. 396. no. 68.
Graulichbraun, mit abgefetzten, theils runden, theils eckichten Queerftreifen.
Naturf. IX. p. 131. no. 68. Ph. *Simulans.*
Sehr undeutliche Zeichnungen. — In der Gröfse der Ph. *Atriplicis* — hat befonders die Eigenfchaft, dafs er des Abends in die Stuben fliegt, und man des andern Tages öfters 10 bis 12 Stück in den Falten der Fenftergardinen findet. — Seine Raupe ift unbekannt. (von *Rottemburg.*)

26. *Brunnea*, der *Weifsfleck.*

Berlin. Magaz. III. p. 396. no. 69.
Mattbraun mit Dunkelbraun fchattirt, und einem weifsen Fleck in der Mitte der Oberflügel.
Naturforfch. IX. p. 131. no. 69. Ph. *Brunnea.*
Kleem. Beytr. I. p. 155. §. 8.
Raupe Röfel III. t. 68. f. 6. die unanfehnliche braune *Erdraupe.*
Puppe und Vogel Kleem. l. c. t. 17. f. AB.
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 21. no. 39. p. 41. no. 110. Ph. *Brunnea.*

27. *Trifolii*, das *Dreyblatt.*

Berl. Magaz. III. p. 398. no. 70.
Schmuziggelb und grau mit einigen blafsgelben fchmalen Queerftreifen.
Naturf. IX. p. 131. no. 70. Ph. *Trifolii.* *Röfels* Vogel nicht völlig getroffen. (v. *Rotte.nb.*)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 265. t. 48 die *Spargelraupe* mit dem rothen Seitenſtreif.

Kleem. Beytr. I. p. 191. Anm. — die Raupe des *Röſels* t. 48. hat auch *Tobakskraut* gefreſſen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 329. Phal. *Trifolii.*

28. *Nana*, der *Zwerg.*

Berl. Magaz. III. p. 398. no. 71.

Weiſsgrau, ins Dunkelgraue vertrieben, mit einem weiſsgrauen zackichten Flecke in der Mitte der Oberflügel.

Naturf. IX. p. 132. no. 71. Ph. *Nana.*

In der Gröſse der Ph. *Triplaſia.* (v. *Rottemb.*)

29. *Sororcula*, die *Strohmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 398. no. 72.

Durchaus okergelb mit ſchmalen Flügeln.

Naturf. IX. p. 132. no. 72 Ph. *Sororcula.*

In der Gröſse der Ph. *Padella*, nach ſeinem Bau den Tineis ſehr ähnlich. (v. *Rottemb.*)

30. *Muſcerda*, der *Fliegenquark.*

Berlin. Magaz. III. p. 600. no. 73.

Mauſefarbig, mit 5 ſchwarzen Punkten auf jedem Oberflügel.

Naturf. IX. p. 133. no. 73. Ph. *Muſcerda.*

Gehört auch zu den *Schmalflüglichen.* (von *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 28. Ph. *Muſcerda*, der *Fliegenquark.*

31. *Crenata*, die *Spaltmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 402. no. 76.

Röth-

Röthlichbraun, mit einem nierenförmigen und einigen andern Flecken im braunen Grunde.

Naturf. IX. p. 133. no. 76. Ph. *Crenata.*

In der Gröfse der Ph. *Trifolii.* (von *Rottemb.*)

32. *Furcifera*, die *Gabelmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 402. no. 77.

Blaulichgrau, mit einigen braunen Zeichnungen, darunter die Figur einer *zweyzackichten Gabel.*

Naturforscher IX. p. 134. no. 77. Ph. *Furcifera.*

In der Gröfse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

33. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 402. no. 78. et. p. 425. L.

Bräunlichgelb mit 2 braunen Queerſtreifen; die Unterflügel etwas brauner.

Die *Raupe* hat die Figur eines *Schildes.*

Naturf. IX. p. 134. no. 78. Ph. *Limacodes.*

Kleem. Beytr. I. p. 321. t. 38.

Das zur N. V. 2 Kl. gehörige einſame dicke, gelblichgrüne, gelbbordirte *Schildräuplein* ohne Bauchfüſse.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 68. no. 195. p. 85. no. 245. p. 92. no. 267. et p. 95. no. 276. Ph. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 600. no. 3. Ph. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

34. *Circellaris*, die *Zirkelmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 404. no. 79.

Braungelb, mit einem kleinen ſchwarzgrauen Fleck in der Mitte der Flügel, und einer *zirkelförmigen Figur.*

Naturforsch. IX. p. 134. no. 79. Ph. *Circellaris.*
In der Gröfse der Ph. *Pisi.* (von *Rottemb.*)

35. *Domiduca*, die *Sturmhaube.*

Berlin. Magaz. III. p. 404. no. 81.
Mit abwechselnden, hell- und dunkelbraunen schwarzgezogenen Queerbinden; die *Unterflügel* oraniengelb mit einem breiten schwarzen Rande.

Naturforscher IX. p. 135. no. 81. Ph. *Domiduca.*
Ungemein viel ähnliches mit Ph. *Pronuba:* auch so grofs, aber doch 2 verschiedene Arten. (v. *Rottemb.*)

Knochs Beytr. zur Insektengesch. I St. p. 63. no. 13. t. 4. f. 5.
N. spirilinguis cristata, alis incumbentibus violaceis, fasciis saturatioribus; posticis dilucide aurantiis ad basin et fascia submarginali nigris.

Wien. Schmett. p. 78. no. 19. *veilblaulichte braunfleckichte Eule*, N. *Janthina.*

36. *Domestica*, der *Tieger.*

Berl. Mag. III. p. 406. no. 83.
Grünlichgrau und blafsgelb, mit verschiedenen grünlichgrauen schwarzgerändeten Flecken.

Naturf. IX. p. 136. no. 83. Ph. *Domestica.*
1) die Hufnag. Beschr. nicht recht passend.
2) die angegebene Gröfse unrichtig; nicht gröfser als Ph. *Viridana* (v. *Rottemb.*).

37. *Pyrarga*, die *Meise.*

Berl. Magaz. III. p. 408. no. 85.
Weifs und braun marmorirt, mit schwarzen Flecken; die Gegend des äufsern Randes ganz weifs.

Na-

Naturf. IX. p. 136. no. 85. Ph. *Pyrarga.*
Etwas gröſser als Phal. *Domeſtica.* (von *Rottemb.*)

38. *Trigrammica*, die *Bandmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 408. no. 86.
Blaſsgelb mit drey ſchmalen braunen Queerſtreifen.

Naturforſcher IX. p. 137. no. 86. Ph. *Trigrammica.*
In der Gröſse der Ph. *Oleracea.* (v. *Rottemb.*)

39. *Tricomma*, die *Lebermotte.*

Berl. Magaz. III. p. 408. no. 87.
Graubraun, bald heller, bald dunkler, mit gezackten Queerſtreifen, und 3 kleinen ſchwarzen und 3 weiſſen Strichen. *)

40. *Sagittigera*, der *Pfeilträger.*

Berlin. Magaz. III. p. 410. no. 88.
Bräunlichgrau mit verſchiedenen ſchwarzbraunen Zeichnungen, darunter einige die Figur einer *Pfeilſpitze* vorſtellen.

41. *Bicolorata*, die *Mausmotte.*

Berl. Mag. III. p. 410. no. 89.
Weiſslichgrau, mit einer dunklen braunen Binde, in welcher einige braune ausgebogene abgeſetzte Linien befindlich.

Naturf. IX. p. 137. no. 89. Ph. *Bicolor.*
In der Gröſse der Ph. *Fuliginoſa.* (von *Rottemburg.*)

*) Dieſe nebſt no. 40. und no. 42. vermiſſe ich bey dem Hrn. v. *Rottemburg.*

42. *Bombycina*, die *Wachtel.*

Berlin. Magaz. III. p. 410. no. 90.

Grau mit braunen Zeichnungen, einer weifslichen Zirkelfläche; und weiffem nierenförmigen Fleck.

43. *Grifea*, die *Graumotte.*

Berl. Magaz. III. p. 411. no. 91.

Ganz gelblich grau mit vielen zerftreuten grauen und braunen Flecken.

Naturf. IX. p. 138. no. 91. Ph. *Grifea.*

In der Gröfse der Ph. *Fuliginofa.* (von *Rottemburg.*)

44. *Tineodes*, die *Grafemücke.*

Berlin. Magaz. III. p. 412. no. 92.

Weifslich, mit braunen ziemlich grofsen Flecken.

Naturf. IX. p. 138 no. 92. Ph. *Tineodes.*

Etwas gröfser als Ph. *Viridana.* (v. *Rottemb.*)

45. *Arabica*, der *Reuter.*

Berlin. Magaz. III. p. 412. no. 93.

Olivenbraun, mit untermifchten hell fchwefelgelben Streifen und Flecken.

Naturf. IX. p. 139. no. 93. Ph. *Arabica.*

In der Gröfse der Ph. *Viridana.*

Die *Raupe* ein Spannmeffer mit 2 Paar Bauchfüfsen — verwandelt fich in der Erde. (v. *Rottemb.*)

46. *Confufa*, der *Tänzer.* *)

Berl. Magaz. III. p. 414. no. 94.

Schwarz-

*) Steht beym Hrn. v. *Rottemburg.*

Schwarzgrau, mit weifslichen Flecken von verfchiedener Gröfse, und einem kleinen grauen halben Mond in weiffem Felde.

47. *Matura*, die *Glanzmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 414. no. 96.

Braungrau, mit weiffen und blafsgelben Zeichnungen, die meiftens braun gerändert find. Die *Unterflügel* blafsgelb mit einem breiten braunen Rande.

Naturf. IX. p. 140. no. 96. Ph. *Matura.*

Am Innenrande der Oberflügel ein kleines *lateinifches* v — wegen feines Glanzes und feinen Zeichnungen ein fchönes Anfehen — in der Gröfse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

Gleditfch Forftwiff. I. p. 651. no. 27. Ph. *Matura*, die *Glanzmotte.*

48. *Curforia*, der *Rothbart.*

Berl. Magaz. III. p. 416. no. 97.

Gelblichgrau, mit 2 braunen ausgefchweiften und ausgezackten, und 2 grauen gefchlängelten Queerftreifen.

Naturf. IX. p. 140. no. 97. Ph. *Curforia.*

In der Gröfse der Ph. *Trifolii.* (v. *Rottemb.*)

49. *Cinerea*, die *Afchmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 416. no. 98.

Ganz afchgrau, mit einigen unmerklichen weifslichen und einem gelbbraunen Flecken.

Naturf. IX. p. 141. no. 98. Ph. *Cinerea.*

Etwas kleiner als Ph. *Trifolii.* (v. *Rottemb.*)

50. *Ipfilon*, der *Zweyzack.*

Berlin. Magaz. III. p. 416. no. 99.

Hellbraun, mit einem nierenförmigen Fleck, und einem dunkelbraunen lateiniſchen *Ipſilon*, oder zweyzackichter Gabel auf jedem Oberflügel.

Naturf. IX. p. 141. no. 99. Ph. *Ipſilon.*

— Gehört unter die *Bombyces* — die Fühlhörner des *Männchens* nicht ganz haarig, ſondern an der Spitze glatt. In der Gröſse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

51. *Socia*, der *geſtreifte Mönch.*

Berlin. Magaz. III. p. 418. no. 101.

Gelblich, weiſsgrau, mit einigen braunen Streifen und Punkten.

Naturf. IX. p. 142. no. 101. Ph. *Socia.*

In der Gröſse der Ph. *Verbaſci.*

Raupe lebt auf den *Linden:* grün mit einigen weiſſen Linien und Punkten. Gehört nicht unter die *Mönche.* (v. *Rottemb.*)

52. *Nebuloſa*, die *Nebelmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 418. no. 103.

Weiſsgrau, mit braungerändeten Flecken, darunter ein nierenförmiger; oder braungrau mit weiſsgrauen Flecken.

Naturf. IX. p. 143. no. 103. Ph. *Nebuloſa.*

In der Gröſse der Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

53. *Variegata*, die *Schreckeule.*

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 183. no. 40. t. 15. f. 16.

Phalaena (*Variegata*), ſpirilinguis criſtata, alis deflexis, canis lineolis undulatis transverſalibus confluentibus.

Auf *Fichtenſtöcken.*

54. *Ani-*

54. *Anifurca*, die *Schwanzgabel.*

Röſels Inſektenbel. I. V. N. 2 Kl. p. 241. t. 42. die glatte ſchwarz und gelbgefleckte *Salatraupe.*

Cinerea, criſtata, alis deflexis cinereis nigro-venoſis; *poſticis* fuſceſcentibus, albo-marginatis; *ano furcato.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 160. p. 76. no. 215. die glatte ſchwarz und gelbgefleckte *Salatraupe.*

55. *Lunulata*, die *Mondeule.* *)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 249. t. 44. die ſchwarze *Raupe* mit gelbrothen Haaren und Knöpfen auf der *Schwarzbeerſtaude.*

Maders (Kleem.) Raupenkalend. p. 59. no. 161. die ſchwarze *Raupe* etc. et no. 216.

Müllerі Zool. Dan. Pr. p. 104. no. 1430.

Phalaena *Lunulata*, ſpirilinguis, criſtata; alis murinis; *ſuperioribus* ſtrigis transverſis dentatis *circulo lunulaque nigris.*

Schaeff. Icon. t. 28. f. 7. 8.

56. *Lunulata minor*, die *kleine Mondeule.* **)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 252. t. 45. die ſchwarze mit weiſſen *kleeblätterförmigen Flecken* gezierte haarige *Raupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 162.

Wien.

*) S. No. 23.

**) Die Raupe iſt ganz von der vorigen verſchieden. Der Vogel kleiner. Alle Flügel mauſefahl; die obern mit wellenförmigen ſchwärzlichen Linien, einem kleinen grauen ſchwarz eingefaſsten Zirkel, und zwey ſehr kleinen ſchwarzen *Möndchen.*

Wien. Schmetterl. p. 67. Anm. B. zu den Scheinſpinnerraupen; *düſtere Eulen.*
Albin Inſ. t. 88. fig. f.

57. *Aurantio-maculata*, die *orangegelbgefleckte Eule.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 281. t. 54. die punktirte blaulichgrüne *Raupe*, mit dem blaſsgelben Seitenſtreif.

Criſtata, alis deflexis cinereis; *anticis* nigro-punctatis, *aurantiaco-maculatis.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 33. no. 82.

58. *Undulata*, die *Wellenlinie.**)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 283. t. 55. die ſchlanke, glatte, grasgrüne *Raupe* mit dem gelben Seitenſtreif.

Criſtata, alis deflexis, *anticis* cinereis *nigro-aurantiacoque* ſtriatis; *poſticis* luteſcentibus, margine nigro undulato.

Maders (Kleem.) Raupenkalend. p. 33. no. 83.

59. *Purpuraſcens*, der *Purpurfleck.***)

Röſels Inſektenbel. IV. p. 145. t. 21.

Die hellbraune, glatte Grasraupe mit dunkelbraunen geſchuppten Queerflecken, und hellen unterbrochenen Streifen.

Criſtata, alis purpuraſcentibus nigro-lineatis; anticarum media macula oblonga rubra; poſticis luteſcentibus; *abdomine* aurantiaco-barbato.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 45. no. 123.

60. *Cin-*

*) Der vorigen ſehr ähnlich, etwas gröſser und mehr geſcheckt.

**) Eine der ſchönſten Eulen mit ſehr ſanften Farben.

60. *Cinnamomea*, die *zimmetfarbige Ilmeneule.*

Kleemanns Beytr. I. p. 157. t. 18. f. 1-6.

Die ſchöne gelblichgrüne, mit einem ſchmalen hellgelben Rücken- und Seitenſtreif auch verſchiedenen weiſslichen Strich- und Pünktlein gezierte *Raupe.*

Alis incumbentibus; *anticis* fuſco-*poſticis* hilare cinnamomeis.

Wiener Schmetterl. p. 71. Anm. G. zu den *Wellenſtrichraupen.* *Glänzende Eulen.*

1, Mit kupfer-braunen Flügeln.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 67. no. 190.

61. *Atropos minor*, der *kleine Todtenkopf.*

Kleem. Beytr. I. p. 185. t. 22.

Die blaulichgrüne, mit einer gelben Halsborte gezierte *Raupe.* Der *Nachtvogel* mit einem *Todtenkopf.*

— Auf dem *Gartenſalat* (Lactuca hort.). Alis complanis; *anticis* olivaceis, nigro-variegatis, circulo gilſeo; *poſticis* luteſcentibus; in thorace *caput mortuum.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 97. no. 278. der *kleine Todtenkopf.*

62. *Deaurata*, die *Goldeule.*

Kleem. Beytr. I. p. 237. t. 29. f. 1-10.

Die *Raupe* in *Röſ's* III B. p. 401. t. 68. f. 8.

Die glänzende glatte braune Raupe mit hellem Kopfe, und fünf ebenfalls hellen bandförmigen Streifen.

Criſtata, alis incumbentibus; *anticis* furvis, *figuris lineisque* irregularibus aureo-flavis; *poſticis* flavo-nigricantibus.

63. *Glau-*

63. *Glauceſcens*, der *Blaufleck.*

Kleem. Beytr. I. p. 338. t. 40.

Die halbſpannende, grasgrüne gelbgeſtreifte *Raupe* mit ungleichen Bauchfüſsen.

Alis incumbentibus anguſtis, flavo-fuſco-nigroque maculatis: *anticis* macula transverſa glauceſcente.

(Conf. *Degeer* Tom. I. Mém. 12. p. 377. t. 21. f. 10. 11. 12. eben dergleichen *Raupe.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 137.

64. *Hiſtrio*, der *Harlekin.*

Kleem. Beytr. I. p. 353. t. 42.

Die glatte, gelblich, zimmetbraune, und mit dunklen Rückenſtreifen und einer gelben Seitenborte gezierte, aber anfänglich grüne Raupe.

Alis anticis diverſimode coloratis; *anticis* binis maculis maioribus ferrugineis; *poſticis* pallide flavis.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 69. no. 196. p. 85. no. 247. p. 93. no. 269.

65. *Bi-ren*, der *doppelte Nierenfleck.*

Kleem. Beytr. I. p. 361. t. 43.

Die glatte, gelblichgrüne, und mit braunrothen Rückenzeichnungen gezierte *Raupe.*

Alis *anticis* murinis, lineis undulatis, binisque maculis pallide griſeis reniformibus; *poſticis* luteſcentibus.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 86. no. 248. p. 93. no. 270.

66. *Anceps*, die *zweydeutige Eule.* *)

Kleem. Beytr. I. p. 115. t. 13. f. A B.

Die ungemein ſchön gezeichnete grün- und weiſsgeſtreifte *Eichenraupe* mit gelben und rothen Seitenſtrichen.

Alis umbroſis cineraſcentibus, lineis transverſis undulatis griſeis; in thorace figura M.

Die *ſchöne Raupe* in *Röſels* III B. p. 272. t. 48. f. 3.

67. *Triceſima*, der *Dreyßiger.*

Naturf. III. p. 2. t. 1. f. 1. (D. *Kühn.*)

Alis *anticis* fuſco-rubris, numero 30 notatis; *poſticis* fuſco-luteſcentibus.

68. *Viridana*, die *braungrüne Ohreule.*

Naturf. XIII. p. 28. t. 3. f. 5. a. f. 5. b.

Phalaena N. antrorſum alis *ſuperioribus* e fuſco ſubvireſcens, annulis, maculis et lineis flexis albis, margine albo, punctis nigris maculato; alis *inferioribus* ex albo ſubcoeruleis, retrorſum alis omnibus coeruleſcentibus. (*Walch.*)

69. *Hermelina*, der *gelbe Hermelinvogel.*

Naturf. XIV. p. 65. t. 3. f. A. der *gelbe Hermelinvogel.* (D. *Kühn.*)

Alis

*) Dieſer Phaläne gebe ich den Namen *Anceps*, weil ſie von den Bombycibus und Noctuis, von beyden etwas hat: von den erſtern den dicken Hinterleib; von den letztern die Fühlhörner, und den Habitus der Flügel. Nach der ſchönen glatten *Raupe* zu urtheilen, könnte man ihr unter den Eulen kaum die Stelle verſagen.

Alis pallide ſulphureis; *anticis* multis lineis transverſis nigris undulatis, binisque ſtrigis atris dentatis; *poſticis* baſi fuſcis.

70. *Agathina*, das *Achatvöglein.*

Sulzers Geſch. p. 160. t. 22. f. 4.

Dunkelgrau mit abwechſelnden braunrothen und grauen Feldern, und grauem Saum oben; unten bräunlichgrau mit wellenförmigen kaum deutlichen Queerlinien.

Cramer Pap. exot. III. p. 145. t. 273. Fig. E. *Foem.* p. 171. t. 288. Fig. A. *Mas.*

71. *Tricolora*, die *amerikaniſche dreyfarbige Eule.*

Sulzers Geſch. p. 160. t. 22. f. 5.

Die *Vorderflügel* dunkelbraun, unten ſchwarzbraun, mit einem ſtrohgelben Fleck in der Mitte, und einem kleinern von dem Federſtaub entblöſsten näher gegen dem Ende; die Hinterflügel braunſchwarz, faſt gezähnt, mit drey rothen und einem gelben durchgehenden Fleck.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 125. t. 263. Fig. E. Ph. *Tricolora.*

72. *Bicolora*, die *indianiſche zweyfarbige Eule.*

Sulzers Geſch. p. 161. t. 22. f. 6.

Blauſchwarzſpielend, in den Vorderflügeln zwey Queerbänder von weiſſen Flecken, gegen den Leib blaue Streifen, mehrere auf den Hinterflügeln blaulich weiſs, davon die gegen den Leib ganz, die andern in der Mitte getheilt ſind. Die Fühlhörner und das Bruſtſtück ſchwarz und weiſs punktirt, der Hinterleib oben grün und blau ſpielend, unten weiſs.

Cra-

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 74. t. 143. Fig. A. Ph. *Bicolora.*

73. *Vlmi*, die *Rüſtereule.*
Wien. Schmetterl. p. 66. A. no. 1.

74. *Tridens*, die *Aprikoſeneule.*
Wien. Schmetterl. p. 67. B. 1) mit einem Auswuchſe auf dem Rücken.
Réaum. La Chenille *demi-velue* de l' Abricotier.

75. *Euphorbiae*, die *Wolfsmilcheule.*
Wien. Schmetterl. p. 67. B. 2) die Haare auf Knöpfgen. no. 4.

76. *Megacephala*, die *Weideneule.*
Wien. Schmetterl. p. 67. B. no. 5.

77. *Auricoma*, die *Bocksbeereule.*
Wiener Schmetterl. p. 67. B. no. 6.

78. *Vnita*, die *Tanneneule.*
Wien. Schmetterl. p. 68. C. no. 2.
Geoffr. Inſ. II. p. 192. no. 24.
Tinea alis corpori circumvolutis croceis, oculis pedibusque nigris.
Le *Manteau jaune.*
Long. 7. lign.

79. *Eborina*, die *weiſſe gelbgerändete Eule.*
Wiener Schmetterl. p. 68. D. no. 5. *Unbekannte Raupe.*

80. *Roſcida*, die *gelbe ſchwarzpunktirte Eule.*
Wien. Schmetterl. p. 68. D. no. 7. *Unbekannte Raupe.*

81. *Marginea*, die *ſchwarzgrüne gelbgeſäumte Eule.*
Wiener Schmetterl. p. 69. D. no. 13. *Unbekannte Raupe.*

82. *Palliola*, die *Birneule.*
Wien. Schmetterl. p. 69. E. no. 1.

83. *Strigula*, die *Eicheneule.*
Wien. Schmetterl. p. 69. E. no. 2.

84. *Albula*, die *Bachmünzeneule.*
Wien. Schmetterl. p. 69. E. no. 3.

85. *Ligustri*, die *Hartriegeleule.*
Wiener Schmetterl. p. 70. E. no. 1.

86. *Glandifera*, die *blaßſcheckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 70. E. no. 2. *Unbekannte Raupe.*

87. *Perla*, die *perlenfarbene Eule.*
Wien. Schmett. p. 70. E. no. 3. *Unbekannte Raupe.*

88. *Degener*, die *Aepfeleule.*
Wien. Schmett. p. 70. E. no. 4.

89. *Runica*, die *Kahneicheneule.*
Wien. Schmett. p. 70. F. no. 1.
1) Raupe ohne Spitzen auf dem Hinterleibe.

90. *Culta*, die *Holzbirneule.*
Wien. Schmett. p. 70. F. no. 4.
2) *Raupen* mit Spitzen auf dem Hinterleibe.

91. *Comta*, die *ſchwarzgraue weißmakelichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 70. F. no. 5. *Unbekannte Raupe.*

92. *Conſperſa*, die *ſchwarz- und weißſpreckichte weißgefleckte Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. F. no. 6. *Unbekannte Raupe.*

93. *Cal-*

93. *Calvaria*, die *ſchwarzbraune gelbgefleckte Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. F. no. 9. *Unbek. Raupe.*
3) *Raupen* mit einer ſtumpfen Erhöhung.

94. *Lucipeta*, die *gelbgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. G. No. 2. *Unbek. Raupe.*
2) Mit trübgrauen Flügeln.

95. *Birivia*, die *weißgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. G. no. 3. *Unbek. Raupe.*

96. *Pyrophila*, die *dunkelgraugezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. G. no. 4. *Unbek. Raupe.*

97. *Candeliſequa*, die *ſchwarzgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 72. G. no. 5. *Unbek. Raupe.*

98. *Cubicularis*, die *Lämmerlatticheule.*
Wien. Schmett. p. 72. G. no. 6.

99. *Flavicincta*, die *Kirſcheneule.*
Wien. Schmett. p. 72. H. no. 2.

100. *Dyſodea*, die *Wildlatticheule.*
Wien. Schmett. p. 72. H. no. 5.

101. *Chamomillae*, die *Kamilleneule.*
Wien. Schmett. p. 73. I. no. 3.

102. *Tanaceti*, die *Rheinfarneule.*
Wien. Schmett. p. 73. I. no. 5.
2) Raupe weiſs mit ſchwarz und gelb.

103. *Linariae*, die *Leinkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 73. I. no. 6. *Leinkrauteulenraupe* (Antirrhini Linariae).
Réaum. Inſ. Tom. I. p. 536. (ed. 4.) t. 37. f. 4. 5. 6. 7.

La *Chenille de la Linaire.*

Réaum. Inf. p. 591. f. 4. La *Sang-sue.*

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 430. no. 5. t. 8. f. 5. 6. *Phalene de la Linaire.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet doublement huppé; à ailes rabatues d'un blanc gris-de-perle à nuances et rayes noirâtres, avec des taches noires le long du bord postérieur.

— *Ueberf.* II B. I Th. p. 314. no. 5. t. 8. f. 5. 6. *Leinkrautphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, doppeltem Rückenkamm, und niederhangenden weisperlgrauen Flügeln, mit schwärzlichen Schattirungen und Streifen, und schwarzen Flecken längst dem Hinterrande.

104. *Lactucae*, die *Latticheule.*
Wien. Schmett. p. 74. I. no. 7.

105. *Lithoxylaea*, die *Winterbirneule.*
Wien. Schmett. p. 75. K. no. 2.

106. *Petrificata*, die *Steineicheneule.*
Wien. Schmett. p. 75. K. no. 3.

107. *Rizolitha*, die *Weißeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 75. K. no. 6.

108. *Conformis*, die *Ellerbaumeule.*
Wien. Schmett. p. 76. K. no. 7.

109. *Pulla*, die *Schwarzeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 76. K. no. 8.

110. *Hyperici*, die *Johanniskrauteule.*
Wien. Schmett. p. 76. K. no. 10.

111. *Instabilis*, die *Mandelneule.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 76. L. no. 1.
1) Die *Raupen* grün.

112. *Stabilis*, die *Lindeneule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 2.

113. *Humilis*, die *Löwenzahneule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 3.

114. *Gracilis*, die *Weidericheule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 4.

115. *Lychnidis*, die *Wiederſtoßeule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 5.

116. *Munda*, die *Gartenbirneule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 7.
2) *Raupen* bräunlich.

117. *Blanda*, die *fahle weißlichgezeichnete Eule.*
Wien. Schmetterl. p. 77. L. no. 8. *Unbek. Raupe.*

118. *Cruda*, die *Eichbuſcheule.*
Wien. Schmett. p. 77. L. no. 9.

119. *Ambigua*, die *röthliche hellgraugezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 77. L. no. 10. *Unbek. Raupe.*

120. *Advena*, die *Mayeneule.*
Wien. Schmett. p. 77. L. no. 11.
3) *Raupen* lichtgrau.

121. *Piſtacina*, die *Flockenkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 1.
1) Mit ſchwärzlichen Punkten am Aufsenrande.

122. *Baja*, die *Tollkrauteule.* (Atropae Belladonnae.)
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 3.

123. *Rubricoſa*, die *Grindwurzeule.*
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 4.

124. *Erythrocephala*, die *Spitzwegericheule.*
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 5.

125. *Sigma*, die *Gartenmeldeeule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 8.
2) Mit ſchwarzen Fleckchen im Mittelraume.

126. *Nun atrum*, die *Klebekrauteule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 9.

127. *I cinctum*, die *röthlichgraue bogenſtriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 10. *Unbek. Raupe.*

128. *Characterea*, die *Waldkicherneule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 11.

129. *Baſilinea*, die *fahle geradſtriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 12.

130. *Ypſilon*, die *Sarbaumeule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 13.

131. *Forcipula*, die *weißgraue kreuzſtriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 14. *Unbek. Raupe.*

132. *Rectangula*, die *Siebengezeiteule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 15.

133. *Polygona*, die *Breitwegericheule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 16.

134. *Secalis*, die *Rockenhalmeule.* *)
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 17. (Secalis cerealis *intra culmos habitans.*)
Linn. Syſt. Nat. ed. 10. p. 519. (ed. Hal.) no. 126. Ph. *Secalis.*

Spiri-

*) *Müllers* Secalis F. Fr. p. 46. no. 410. ſcheint denn doch von dieſer noch verſchieden zu ſeyn.

Spirilinguis criſtata, alis deflexis, *ſuperioribus* griſeo-fuſcis ſtriatis; macula reniformi *A latino.*

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. XIV. p. 67. die Raupe in den *weiſſen Aehren* (*Rolander*).

Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, faſciculata; alis depreſſis griſeo-fuſcis, ſtriatis, *A latino* inſcriptis.

135. *Subſequa*, die *Vogelkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 79. M. no. 21.

136. *Linogriſea*, die *veilgraulichte braungerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 79. M. no. 22. *Unbek. Raupe.*

137. *Flammatra*, die *graubraune flammenſtriemigte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 1. *Unbek. Raupe.*
1) Mit ſchwarzem Halskragen.

138. *Cinerea*, die *aſchengraue feingeſtreifte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 3. *Unbek. Eule.*

139. *Suffuſa*, die *Gänſediſteleule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 4.

140. *Obeliſca*, die *rehfarbige blaßgerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 5. *Unbek. Raupe.*
2) Mit hellen oder deutlichen Ring- oder Nierenmakeln.

141. *Aquilina*, die *adlerbraune ſchwarzgezähnte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 6. *Unbek. Raupe.*

142. *Ravida*, die *wolfsfarbige wellenſtrichige Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 7. *Unbek. Raupe.*

143. *Signifera*, die *Türkenkreſſeneule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 8.

144. *Valligera*, die *hornfarbige kleinmakelichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 9. *Unbek. Raupe.*

145. *Teſtacea*, die *ſandfarbige kleinmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 11. *Unbek. Raupe.*

146. *Segetum*, die *Winterſaateule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 12. *Winterſaateulenraupe* (Secalis cerealis gramine et radice). tab. 1. a. f. 3. *Raupe.* tab. 1. b. f. 3. *Vogel.*

147. *Corticea*, die *rindenfarbene kleingeſtrichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 13. *Unbek. Raupe.*

148. *Coecimacula*, die *Sichelkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 14.

149. *Radicea*, die *Graswurzeneule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 15.

150. *Lutulenta*, die *braunſchwarze blaßgeſtrichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 16.
3) Mit verfinſterten Makeln.

151. *Sordida*, die *erdfarbene mattgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 17. *Unbek. Raupe.*

152. *Fumoſa*, die *rauchfarbene weißgezähnte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 18. *Unbek. Raupe.*

153. *Furva*, die *Kletteneule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 19.
4) Mit zweydeutiger Zeichnung.

154. *Anceps*, die *honigbraune weißadrigte Eule.*

Wie-

Wiener Schmetterl. p. 81. N. no. 22. *Unbekannte Raupe.*

155. *Ceſpitis*, die *Waſengraseule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 2.
1) Die Oberflügel ſchwärzlich mit gelber Zackenlinie.

156. *Leucophaea*, die *Tauſendblatteule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 5.
2) Graulich mit weiſſen Linien.

157. *Chenopodii*, die *Gänſefußeule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 6.

158. *Contigua*, die *Gutheinricheule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 7.

159. *Dentina*, die *bräunlichgraue zahnmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 8. *Unbek. Raupe.*

160. *Caeſia*, die *blaulichtgraue düſternfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 9. *Unbek. Raupe.*

161. *Praſina*, die *Meerrettigeule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 10.
3) Grüngemiſcht.

162. *Thalaſſina*, die *Flechteneule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 13.

163. *Brunnea*, die *Stockerbſeneule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 15.
4) Rothbraun.

164. *Porphyrea*, die *purpurbraune dunkelſpreckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 17.

165. *Suasa*, die *Steinkleeeule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 18.

166. *Xanthographa*, die *kastanienbraune gelbgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 20. *Unbek. Raupe.*

167. *Leucographa*, die *veilbraune weißlich gezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 19. *Unbek. Raupe.*

168. *Satura*, die *purpurschwärzliche Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. P. no. 2. *Unbek. Raupe.*

169. *Serena*, die *perlweisse hellbraunstreifige Eule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 4. *Unbek. Raupe.*

170. *Cucubali*, die *Gliedereicheule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 5.

171. *Capsincola*, die *Lychnissaameneule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 6.

172. *Protea*, die *Zerreicheneule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 7.

173. *Convergens*, die *Zwergeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 8.

174. *Filicea*, die *Farrenkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. Anm. auf der Pteris aquilina.
Albin. Inf. t. 75. fig. e f g h.

175. *Acetosellae*, die *Schafampfereule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 1.
1) Mit zwo düstern am Innenrande zusammengeneigten Queerlinien.

176. *Co-*

176. *Conigera*, die *rothgelbe weißgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 3. *Unbek. Raupe.*

177. *Albipuncta*, die *Wegericheule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 4.

178. *Trilinea*, die *weißliche dreygeſtreifte Eule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 5. *Unbek. Raupe.*

179. *Aenea*, die *erzfarbige gemeinſtreifige Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 6. *Unbek. Raupe.*

180. *Communimacula*, die *leibfarbene braunmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 7. *Unbek. Raupe.*
2) Ohne Queerſtriche.

181. *Pudorina*, die *weißliche rothgemengte Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 11. *Unbek. Raupe.*

182. *Nervoſa*, die *lichtgraue geradſtriemigte Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 12. *Unbek. Raupe.*

183. *Livida*, die *griechenblaue Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 13. *Unbek. Raupe.*

184. *Silene*, die *Feldkohleule.*
Wien. Schmett. p. 85. R. no. 1.

185. *Polita*, die *dunkelbraune glänzende Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. R. no. 3. *Unbek. Raupe.*

186. *Nitida*, die *Ehrenpreiseule.*
Wien. Schmett. p. 86. R. no. 4.

187. *Spadicea*, die *Schafzungeneule.*
Wien. Schmett. p. 86. R. no. 6.

188. *Fer-*

188. *Ferruginea*, die *okerbraune röthlichgeſtrichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. R. no. 7. *Unbek. Raupe.*

189. *Rubiginea*, die *Holzäpfeleule.*
Wien. Schmett. p. 86. R. no. 8.

190. *Croceago*, die *Traubeneicheneule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 2.

191. *Rutilago*, die *Pappelweideneule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 3.

192. *Flavago*, die *Königskerzeneule.*
Wien. Schmetterl. p. 86. S. no. 4.

193. *Luteago*, die *oraniengelbe hellfleckige Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 5. *Unbek. Raupe.*

194. *Aurago*, die *goldgelbe hellſtriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 6. *Unbek. Raupe.*

195. *Sulphurago*, die *hellgelbe ſchwarzſpreckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 7. *Unbek. Raupe.*

196. *Cerago*, die *Palmweideneule.*
Wien. Schmett. p. 87. S. no. 8.

197. *Gilvago*, die *trübgelbe wellenſtriemigte Eule.*
Wien. Schmett. p. 87. S. no. 9. *Unbek. Raupe.*

198. *Flammea*, die *blaßgoldfarbene rothgewäſſerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 3. *Unbek. Raupe.*
1) Die Oberflügel gelblicht.

199. *Ochroleuca*, die *gelbbräunliche weißgemiſchte Eule.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 87. T. no. 4. *Unbekannte Raupe.*

200. *Or*, die *Alberneule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 5.
2) Graulicht.

201. *Diluta*, die *graugewäſſerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 6. *Unbek. Raupe.*

202. *Ruficollis*, die *Wintereicheneule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 7.

203. *Purpurina*, die *purpurrothgewäſſerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 9. *Unbek. Raupe.*
3) Purpurfarben.

204. *Pyralina*, die *dunkelbraune blaulicht gewäſſerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 12. *Unbek. Raupe.*
4) Rothbraun.

205. *Minioſa*, die *Galleicheneule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 14.

206. *Strigoſa*, die *grünlichbraune graugemiſchte Eule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 15. *Unbek. Raupe.*
5) Olivenbraun und wicklerförmig.

207. *Ambuſta*, die *Wändeflechteneule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 16.

208. *Subtuſa*, die *Zitterpappeleule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 17.

209. *Latruncula*, die *braune rothſchielende Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. *Grabraupen*, Larvae *Furtivae; kleine Eulen*, N. *Puſillae.* *)
1) Die Flügel ſchmal. No. 1. *Unbek. Raupe.*

210. *Praeduncula*, die *braune weißgerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 2. *Unb. Raupe.*

211. *Furuncula*, die *braune weißſtreifige Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 3. *Unb. Raupe.*

212. *Raptricula*, die *braungraue ſchwarzſtrichichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 4. *Unb. Raupe.*

213. *Spoliatricula*, die *Nelkenveileule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 5. *Nelkenveileulenraupe* (Cheiranthi incani).

214. *Fuſcula*, die *braune weißgemiſchte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 6. *Unb. Raupe.*
2) Die Flügel ſpannerförmig.

215. *Atratula*, die *ſchwarze weißwechſelnde Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 7. *Unb. Raupe.*

216. *Candidula*, die *weiſſe ſchwarzfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 8. *Unb. Raupe.*

217. *Scutoſa*, die *Eberreißeule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 1.
1) die Oberflügel oliv- oder buntfarbig.

218. *Peltigera*, die *blaßzimmetfarbene randfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 2. *Unb. Raupe.*

219. *Ono-*

*) Aus dieſer Familie hat *Linné* keine einzige.

219. *Ononis*, die *Hauhecheleule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 4.

220. *Alchymiſta*, die *ſchwarze braunlich gerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 5. *Unb. Raupe.*
2) Schwarz, oder ſchwarzfleckicht. Et p. 150.
Geoffr. Inſ. II. p. 149. no. 80. *)
Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis, undulato-nigris, inferioribus baſi albis.
L' *Alchymiſte.*
Long. 10. lign.

221. *Luctuoſa*, die *Wegebreiteule.*
Wien. Schmett. p. 90. W. no. 7.

222. *Solaris*, die *weiſſe ſchwarzgemiſchte Eule.*
Wien. Schmett. p. 90. W. no. 8. *Unb. Raupe.*

223. *Rupicola*, die *ſchwarze weiſslich gezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 90. W. no. 9. *Unb. Raupe.*

224. *Promiſſa*, die *Wolleicheneule.*
Wien. Schmett. p. 90. X. no. 6.
2) Mit rothen Unterflügeln.

225. *Hymenaea*, die *Schwarzdorneule.*
Wien. Schmett. p. 91. X. no. 8.
3) Mit gelben Unterflügeln, faſt ungezähnt.

226. *Aſclepiadis*, die *Schwalbenwurzeule.*
Wien. Schmett. p. 91. Y. no. 2.

227. *Cuprea*, die *kupferfarbene dunkelfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 91. Y. no. 3.

228. *Lu-*

*) S. die Anmerk. bey *Leucomelas* L. no. 183. bey der der Ritter dieſe *Geoffroyſche* Phaläne zitirt hatte.

228. *Lunaris*, die *Truffeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 94. Aa. no. 1.
1) Mit einer schwärzlichen unvollkommenen *Mondmakel* auf den Oberflügeln.

229. *Craccae*, die *Vogelwickeneule.*
Wien. Schmett. p. 94. A a. no. 3.

230. *Triquetra*, die *veilgraue dreyeckmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 94. A a. no. 6. *Unb. Raupe.*
2) Mit braungelben düsterneblichten Unterflügeln.

231. *Heliaca*, die *kupferbraune mattstreifige Eule.*
Wien. Schmett. p. 94. A a. no. 7. *Unb. Raupe.*

232. *Asteris*, die *Sternblumeule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 10. Fam. I.

233. *Lucifuga*, die *Schildampfereule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 11. Fam. I.

234. *Ditrapezium*, die *Wachtelweizeneule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 24. Fam. M.

235. *Tersa*, die *fahle gelbgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 12. Fam. L. *Unbekannte Raupe.*

236. *Perplexa*, die *mattbraune düster- und weissgestrichte Eule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 313. Fam. N. no. 23. *Unbek. Raupe.*

237. *Herbida*, die *Kuhweizeneule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 313. Fam. O. no. 22.

238. *Chry-*

238. *Chryſographa*, die *oranienbraune goldgelb gezeichnete Eule.*

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 313. Fam. Q. no. 23. *Unbek. Raupe.*

239. *Decora*, die *glänzendſilbergraue mattgezeichnete Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 313. Fam. Q. no. 15. *Unbekannte Raupe.*

240. *Glabra*, die *blaßhonigbraune düſterſtriemigte Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. R. no. 10. *Unbekannte Raupe.*

241. *Reſperſa*, die *ſilberfarbige, düſtergewäſſerte und punktirte Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. T. no. 19. *Unbekannte Raupe.*

242. *Feſtiva*, die *dunkelrothe und perlfarbene Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. T. no. 20. *Unbekannte Raupe.*

243. *Bractea*, die *purpurbraune und goldmacklichte Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. Z. no. 7. *Unbekannte Raupe.*

Knochs Beytr. zur Inſektengeſchichte I St. p. 7. t. 1. f. 2. Ph. N. *C aureum.*

Spirilinguis criſtata, alis deflexis: ſuperioribus rubeſcentibus fuſco-variis, maculis ſeptem aureis; C aureo inſcriptis.

244. *Aemula*, die *fleiſchfarbene blaßgoldgezeichnete Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. Z. no. 8. *Unbekannte Raupe.*

245. *Ochreacea*, der *Ochravogel.*

Gladbachs Schmett. p. 24. t. 11. f. 5. 6. *Raupe* unbekannt — des Abends auf den *Specklilien.*

Alis ciliatis; *anticis* ochreaceis, binis punctis fuscis; *posticis* griseo-albis — omnibus nigro-lituratis.

246. *Terrena*, die *schwarze Erdeule.*

Gladbachs Schmetterl. p. 39. t. 18. f. 3. 4. *der schwarze Erdvogel. Unbek. Raupe.*

Alis *ciliatis; anticis* fusco-nigris, binis maculis pallidioribus; *posticis* albo-griseis, margine rufescente.

247. *Variegata*, die *Scheckeule.*

Gladbachs Schmett. p. 39. t. 18. f. 5. 6. der *rare Scheckflügel. Unbek. Raupe.*

Alis *anticis* viridi-micantibus, basi, fasciisque transversis ferrugineis; *posticis* nigris, *Ypsilon* griseo, nigro-venoso, notatis.

Schaeff. Icon. t. 173. f. 2. 3.

248. *Cristata*, die *duppirte Eule.*

Gladbachs Schmett. p. 41. t. 19. f. 1. 2. 3. das *Duppe. Unbek. Raupe.*

Alis *anticis* glauco-sulphureis; *posticis* griseo-rubescentibus; *thorace* cristato striato.

249. *Ypsilon album*, die *Eule mit dem weissen Ypsilon.*

Glad-

Gladbachs Schmett. p. 43. t. 19. f. 6. 7. das *gelbe Ypſilon. Unbek. Raupe.*

Alis concoloribus flaveſcentibus, *Ypſilon albo.*

250. *Striata*, die *Stricheule.*

Gladbachs Schmett. p. 53. t. 24. f. 1. 2. *der gelbe Muſchenflügel. Unbek. Raupe.*

Alis concoloribus flavo-rubroque longitudinaliter ſtriatis.

251. *Hermelina*, die *Hermelineule.*

Gladbachs Schmett. p. 57. t. 25. f. 1-6. der *rare kleine Hermelinvogel* mit der ſeltſamen *Katzenkopfraupe.*

Alis *anticis* albo-purpureoque variegatis, lineis transverſis aurantiacis; margine cum poſticis nigro-punctatis.

252. *Tormentaria*, die *Kanoneneule.*

Gladbachs Schmett. p. 63. t. 27. f. 7. 8. der *rare Kanonenvogel. Unb. Raupe.*

Alis concoloribus niveis; *anticis tormento* flavo.

253. *Octogenaria*, die *Achtziger Eule.*

Gladbachs Schmett. p. 66. t. 29. f. 1-5. der *Achtziger mit ſeiner Raupe, Geſpinnſt und Puppe.*

Alis *anticis* rubeſcentibus, numero 80 notatis.

254. *Aluco*, die *chineſiſche Aluko.*

Fabric. S. E. p. 591. no. 4. N. *Aluco.*

Alis *patulis*, dentatis, brunneis, nigro-undulatis, maculisque tribus marginalibus fuſcis.

255. *Caprimulgus*, der *chineſiſche Kaprimulgus.*

Fabric. S. E. p. 591. no. 5. N. *Caprimulgus.*
Alis *patulis*, dentatis, fuſcis, nigro-undulatis; anticis ocello coeruleſcente.

256. *Ulula*, das *indianiſche Nachteulchen.*

Fabric. S. E. p. 592. no. 6. N. *Ulula.*
Alis *patulis*, dentatis, nigro-undulatis; *anticis* faſcia abbreviata alba maculaque ſubocellari.

257. *Spiralis*, die *chineſiſche Spirale.*

Fabric. S. E. p. 592. no. 7. N. *Spiralis.*
Alis *patulis*, griſeo-fuſcoque undatis; anticis *linea ſpirali convoluta* nigra.

258. *Illibata*, der *indianiſche Randfleck.*

Fabric. S. E. p. 592. no. 8. N. *Illibata.*
Alis *patulis* fuſcis; macula apicis nigra.

259. *Scrobiculata*, die *oſtindianiſche Höckereule.*

Fabric. S. E. p. 592. no. 9. N. *Scrobiculata.*
Laevis, alis *incumbentibus*, ſubdentatis, griſeis, *ſcrobiculo* baſeos nigro; *poſticis* vitta marginali atra.

260. *Hybrida*, die *indianiſche Schneelinie.*

Fabric. S. E. p. 593. no. 11. N. *Hybrida.*
Laevis, alis *incumbentibus; anticis* flavis; *linea nivea*, limbo pallidiore, fuſco-maculato.

261. *Microrrhoea*, der *neuholländiſche Blutafter.*

Fabric. S. E. p. 593. no. 12. N. *Microrrhoea.*
Laevis, alis *incumbentibus*, cinereis; *poſticis* rufeſcentibus; macula atra. — *Abdomen* ſupra ſubſanguineum.

262. *Ser-*

262. *Serva*, die *neuholländiſche Magd.*

Fabric. S. E. p. 593. no. 13. N. *Serva.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griſeis, punctis ſtrigisque quatuor undatis, fuſcis; poſticis apice nigris.

263. *Aſtrea*, die *neuholländiſche Aſtrea.* *)

Fabric. S. E. p. 594. no. 14. N. *Aſtrea.*

Laevis, alis incumbentibus, concoloribus, fuſcis, diſco hyalino; thorace niveo, nigro-punctato.

264. *Quercus*, die *Eicheneule.*

Fabric. S. E. p. 594. no. 15. N. *Quercus.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griſeis, ſtrigis tribus fuſcis.

265. *4-punctata*, die *engliſche vierpunktirte Eule.*

Fabric. S. E. p. 594. no. 16. N. *4-punctata.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griſeis, fuſco-undatis; *punctis quatuor* marginis exterioris nigris.

266. *Ficus*, die *oſtindianiſche Feigeneule.*

Fabric. S. E. p. 595. no. 22. N. *Ficus.*

Laevis, alis *deflexis*, cinereis, baſi fulvo-albo-nigroque maculatis; *antennis pectinatis* **), *apice ſetaceis.*

In *Ficu racemoſa* Ind. orient.

267. *Caricae*, der *oſtindianiſche Fünfpunkt.*

*) Dieſs iſt der Sphinx *Aſtreus* des *Drury.* S. 3 Th. 2 B. p. 218. no. 49.

**) Vielleicht ein *Mittelding* zwiſchen Bombyx und Noctua.

Fabric. S. E. p. 596. no. 23. N. *Caricae.*
Laevis, alis *deflexis*, cinereis, ſtriis punctoque medio albis; *punctis quinque atris.*

268. *Coronata*, die *chineſiſche Kroneneule.*

Fabric. S. E. p. 596. no. 24. N. *Coronata.*
Laevis, alis *deflexis*, fuſcis, ſtrigis tribus obſcurioribus ſtigmateque poſtico nigro-punctato.

269. *Leonina*, der *indianiſche Schwarzgürtel.*

Fabric. S. E. p. 596. no. 25. N. *Leonina.*
Laevis, alis *deflexis*, brunneis, ſtigmatibus griſeis, poſticis flavis; maculis duabus nigris; *abdomine cingulis nigris.*

270. *Dama*, die *neuholländiſche Dama.*

Fabric. S. E. p. 596. no. 26. N. *Dama.*
Laevis, alis *deflexis*, fuſcis, albo-ſtriatis; *poſticis* albis, margine nigro.

271. *Marginata*, der *amerikaniſche Weißrand.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 27. N. *Marginata.*
Laevis, alis *deflexis* variegatis; *poſticis* atris, *margine albo.*

272. *Sagitta*, die *indianiſche Pfeileule.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 30. N. *Sagitta.*
Laevis, alis *deflexis*, griſeis: macula magna marginali flava; *poſticis* flavis, apice fuſcis.

273. *Vulpina*, die *oſtindianiſche Vulpina.*

Fabric. S. E. p. 598. no. 34. N. *Vulpina.*
Laevis, alis *deflexis; anticis* obſcure cinereis, immaculatis; *poſticis* apice nigris, albo-maculatis.

274. *De-*

274. *Deſtituta*, der *chineſiſche Rauchſchenkel.*

Fabric. S. E. p. 598. no. 35. N. *Deſtituta.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griſeis, fuſco-maculatis; ſtriga alba fuſcae innata, ſubmarginali.

275. *Tigrina*, der *oſtindianiſche Tiger.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 36. N. *Tigrina.*

Laevis, alis *deflexis; anticis* variegatis; *poſticis* nigris; faſcia maculisque tribus marginalibus albis.

276. *Geometrica*, der *oſtindianiſche Schwarzmakel.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 37. N. *Geometrica.*

Laevis, alis *deflexis;* macula magna atra, faſciis duabus, anteriore nivea.

277. *Stolida*, die *oſtindianiſche Schneebinde.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 38. N. *Stolida.*

Laevis, alis *deflexis* fuſcis; *faſciis duabus niveis*, poſteriore unidentata.

278. *Inclyta*, die *braſilianiſche Blaubinde.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 40. N. *Inclyta.*

Laevis, alis *deflexis* fuſcis; *ſtrigis tribus coeruleſcentibus*, brunneae adnatis.

279. *Vndata*, die *oſtindianiſche Wellenbinde.*

Fabric. S. E. p. 600. no. 43. N. *Vndata.*

Laevis, alis *deflexis* griſeis, *ſtrigis undatis* fuſcis; poſticis cinereis, faſcia marginali nigra.

280. *Vittata*, die *oſtindianiſche Randbinde.*

Fabric. S. E. p. 600. no. 44. N. *Vittata.*

Laevis, alis *deflexis* dentatis cinereis; ſtrigis fuſcis, poſticis flaveſcentibus; *vitta marginali atra.*

281. *Frugalis*, die *indianiſche Punktſtreife.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 45. N. *Frugalis.*
Laevis, alis *deflexis* cinereis: faſcia obliqua *ſtrigaque punctorum nigrorum.*

282. *Flava*, der *oſtindianiſche Gelbflügel.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 46. N. *Flava.*
Laevis, alis *deflexis flavis;* ſtrigis undatis ferrugineis.

283. *Stigmatizans*, der *indianiſche Weiſspunkt.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 47. N. *Stigmatizans.*
Laevis, alis *deflexis* angulatis, flavis; ſtrigis obſcurioribus, *ſtigmateque niveo.*

284. *Equeſtris*, das *indianiſche Ritterband.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 48. N. *Equeſtris.*
Laevis, alis *deflexis* fuſcis; *faſcia lata viridi.*

285. *Rejecta*, der *indianiſche Grünfleck.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 49. N. *Rejecta.*
Laevis, alis *deflexis* albis; *macula poſtica vireſcente.*

286. *Litura*, der *oſtindianiſche Grauſtrich.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 50. N. *Litura.*
Laevis, alis *deflexis; anticis* fuſco-nebuloſis; *litura* maculaque cinereis; *poſticis* niveis.

287. *Augur*, die *teutſche Karaktereule.*

Fabric. S. E. p. 604. no. 58. N. *Augur.*

Cri-

Criſtata, alis *planis* fuſcis, *charactteribus atris.*

288. *Mercatoria*, die *oſtindianiſche braune Wellenſtreife.*

Fabric. S. E. p. 604. no. 59. N. *Mercatoria.*
Criſtata, alis *incumbentibus* ferrugineis; *ſtrigis fuſcis undatis; poſticis* apice nigris, albomaculatis.

289. *Partita*, der *indianiſche Zirkelfleck.*

Fabric. S. E. p. 604. no. 60. N. *Partita.*
Criſtata, alis *incumbentibus* ſubdentatis griſeis; macula baſeos atra, ſtigmatibus duobus bruneis, ſtrigaque media alba.

290. *Pagana*, der *indianiſche Achtfleck.*

Fabric. S. E. p. 606. no. 68. N. *Pagana.*
Criſtata, alis *incumbentibus*, griſeo-fuſcis; punctis marginalibus fuſcis *quinque*, albis *tribus;* poſticis albis, faſcia nigra.

291. *Orichalcea*, der *indianiſche Meſſingfleck.*

Fabric. S. E. p. 607. no. 70. N. *Orichalcea.*
Criſtata, alis *deflexis* fuſcis; macula magna lunata *orichalcea.*

292. *Signata*, das *indianiſche goldene Fragzeichen.*

Fabric. S. E. p. 608. no. 74. N. *Signata.*
Criſtata, alis *deflexis* obſcuris, baſi nigropunctatis; *ſigno medio ? aureo* inſcriptis.

293. *Peponis*, die *oſtindianiſche Kürbiseule.*

Fabric. S. E. p. 608. no. 75. N. *Peponis.*

Criſtata, alis *deflexis* griſeis, macula apicis dorſalique brunneo-aurea.

In *Peponibus* Indiae orient.

294. *Pauperata*, der *chineſiſche Glasflügel.*

Fabric. S. E. p. 608. no. 77. N. *Pauperata.*

Criſtata, alis *deflexis* fuſcis, cinereo-variegatis; *poſticis albo-hyalinis.*

295. *Lacera*, der *chineſiſche Schwarzmond.*

Fabric. S. E. p. 609. no. 79. N. *Lacera.*

Criſtata, alis *deflexis*, fuſco-ferrugineoque variegatis, dorſo emarginatis, fronte fulva.

Ad angulum ani macula fulva, *lunula nigra.*

296. *Marginata*, der *europäiſche Braunrand.*

Fabric. S. E. p. 610. no. 85. N. *Marginata.*

Criſtata, alis deflexis flaveſcentibus; ſtrigis ferrugineis, poſtice fuſcis.

297. *Mendica*, der *teutſche Bettler.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 89. N. *Mendica.*

Criſtata, alis *deflexis*, pallide incarnatis; macula media fuſca, ſtigmatibus flavis.

298. *Sinuata*, der *indianiſche Winkelfleck.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 92. N. *Sinuata.*

Criſtata, alis *deflexis*, baſi cinereis, macula magna ſinuata nigra.

299. *Hiſtrionica*, der *indianiſche Harlekin.*

Fabric. S. E. p. 612. no. 93. N. *Hiſtrionica.*

Criſtata, alis *deflexis* variegatis; poſticis albis, ſtriga marginali alba.

300. *Ri-*

300. *Rivularis*, die *ſächſiſche Spaltſtreife.*

Fabric. S. E. p. 613. no. 99. N. *Rivularis.*

Criſtata, alis *deflexis* fuſcis; *faſcia* griſea, apice *bifida*, flavo-marginata.

301. *Lichenis*, die *teutſche Mooseule.*

Fabric. S. E. p. 614. no. 102. N. *Lichenis.*

Criſtata, alis *deflexis; anticis* virentibus, maculis variis atris, ſubtus fuſcis.

In Germaniae *Lichenibus.*

Summa affinitas N. *Aprilinae;* at *duplo minor**), et puncta poſtica trigona deſunt. Antennae fuſcae.

302. *Algae*, die *teutſche Steinflechteneule.*

Fabric. S. E. p. 614. no. 103. N. *Algae.*

Criſtata, alis *deflexis;* anticis fuſcis; faſciis duabus viridibus.

In *Lichene ſaxatili* Germaniae.

303. *Eremita*, der *Leipziger Einſiedler.*

Fabric. S. E. p. 616. no. 110. N. *Eremita.*

Criſtata, alis *deflexis* ferrugineis; ſtrigis duabus undatis albis: anteriore obſoleta, poſteriore repanda.

304. *Triſtis*, die *ſchwediſche Trauereule.*

Fabric. S. E. p. 617. no. 115. N. *Triſtis.*

Criſtata, alis *deflexis* cinereis, fuſco-ſubundatis, margineque exteriore punctato, ſubtus pallidis faſcia fuſca.

305. *Rurea*, der *engliſche Dickrand.*

Fabric. S. E. p. 618. no. 120. N. *Rurea.*

Cri-

*) An *Ludifica* minor no. 143. *β*?

Criſtata, alis *deflexis*, griſeo-fuſco-variis; poſticis fuſcis, margine craſſiori albo.

306. *Arbuti*, die *engliſche Arbuteule.*

Fabric. S. E. p. 619. no. 122. N. *Arbuti.*
Criſtata, alis *deflexis* fuſcis; *poſticis* nigris, faſcia flava.

307. *Boleti*, die *Löcherſchwammeule.*

Fabric. Mantiſſ. p. 282. no. 21 22. N. *Boleti.*
Laevis, alis *depreſſis* planis, fuſco-irroratis; antennis *pectinatis.*
Kilonii in Boleto verſicolore.

308. *Vireſcens*, die *amerikaniſche grüne S. Cruxeule.*

Fabric. Mant. p. 282. no. 27-28. N. *Vireſcens.*

309. *Monilis*, der *engliſche weiſſe Vierpunkt.*

Fabric. Mant. p. 283. no. 42-43. N. *Monilis.*
Laevis, alis *deflexis* brunneis; *punctis quatuor* approximatis *albis*; antennis *pectinatis.*

310. *Lanceolata*, die *teutſche ſchmalflüglichte Eule.*

Fabric. Mant. p. 283. no. 50-51. N. *Lanceolata.*
Laevis, alis *lanceolatis* cinereis, *anticis* fuſco-irroratis.

311. *Viminalis*, die *Goldweideneule.*

Fabric. Mant. p. 284. no. 67-68. N. *Viminalis.*
Criſtata, alis incumbentibus, baſi fuſcis, ſtrigis undatis fulvis, apice cinereis.
Röſels Inſektenbel. III. p. 68. t. 11.

Die

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige blafsgrüne *Raupe* mit weifsen Linien, Queerſtreifen und Punkten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 34. die *blaßgrüne Raupe* etc.

312. *Rubiginoſa*, die *Roſteule.**)

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 525.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Alae *anticae* ſupra ferrugineae lunula media nigra.

In *Carnioliae* herbidis.

313. *Clavipalpis*, die *Keulſpitze.*

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 526.

Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.

Alae *anticae* cervinae; margine craſſiore punctis nigris — *Palpi* clavati, compreſſi.

In agro *Labacenſi.*

314. *Deceptoria*, die *wickelförmige Eule.*

Scop. Ent. carn. p. 214. no. 527.

Long. lin. 5. *Lat.* 3.

Alae *anticae* albae; margine externo faſciaque lata media eroſa fuſcis.

In Sylveſtribus circa *Idriam.*

Habitus Ph. *Tortricis.*

315. *Ochracea*, die *öſterreichiſche Okereule.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 114. no. 124.

Vix

*) Ich vermuthe, daſs unter den ſogenannten *Obrvögeln* oder *Nierenculen* verſchiedene von einerley Art doppelt aufgeſtellt ſind, da man ſie nicht ſowohl aus dem Syſtem, als durch den Augenſchein unterſcheiden kann.

Vix minor Ph. *Quadra*, utrinque flava.

Alae *anticae* ſupra punctis nigris multis; *poſticae* utrinque unico ſubmarginali.

In pratis circa *Schemnitzium.*

Non confundenda cum *Mare* Ph. *Lubricipedae.*

316. *Pyrauſta*, die *wolgaiſche Feuereule.*

Pallas Reiſen I. Anh. p. 20. Ausz. no. 68.

Noctua. Affinis Ph. *complanatae* et *rubricolli*, qua triplo maior. *Alae* obſoletius nigrae; *primariae* punctis tribus aterrimis, ſerie longitudinali aequidiſpoſitis. *Secundariae* obſoletiores. Corpus atrum, ſed abdomen, ſola baſi excepta, *igneo colore* fulvum ſubtus punctis atris. *Vernalis* ad *Volgam* obſervata.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 310. no. 116. c. Ph. *Pyrauſta*, die *Frühlingseule.*

317. *Profuga*, der *Flüchtling.*

Forskähl Deſcript. Animal. p. 82. no. 17.

Spirilinguis; laevis, alis *deflexis*, fuſco-viridibus; faſciis flavis; *inferioribus* rubris, maculis inaequalibus nigris.

Magn. Ph. *Cajae.*

In *Archipelago* prope inſulam *Miteline* excepta in *navi.*

318. *Aureo-maculata*, die *goldmaklichte Eule.*

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 13. t. 3. de *Goudlakens-Vlinder.*

Criſtata; alis *incumbentibus; anticis* pallide fuſcis, *aureo-flavo*-maculatis, faſciatisque; *poſticis* pallide incarnatis.

Larva

Larva lignivora, fuſco-alba, atro-punctata.
Pupa hilare rubra.

319. *Flava*, die *ganz gelbe Waldeule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 407.
Spirilinguis, criſtata; alis omnibus immaculatis *flavis.*
— Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1423. Ph. *flava.*
Schaeff. Icon. t. 102. f. 1. 2.

320. *Puſtulata*, die *Pockeneule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 408.
Elinguis criſtata; alis fulvis, maculis *novem* luteis. — In *Nemore.*

321. *Pratenſis*, die *Wieſeneule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 409.
Spirilinguis criſtata; alis fuſceſcentibus, faſciis duabus fuſcis; omnibus ſubtus flavis, macula media nigra.
— Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1424. Phal. *Pratenſis.*
Schaeff. Icon. t. 163. f. 4. 5?

322. *Deſolata*, die *Weißwelle.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 411.
Spirilinguis criſtata; alis faſcia media undulata *alba; prioribus* faſciis macula baſeos flava: *poſticis* griſeis. — In *Corylo* et *Tilia.*
— Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1426. Phal. *Deſolata.*
Albin. Inſ. t. 85.

323. *Jutica*, die *Schlangeneule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 412.

Criſta-

Criſtata, alis griſeis: *ſuperioribus* ſtrigis *ſerpentibus* quatuor fuſcis; omnibus margine poſtico maculatis.

Müller Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1427. Ph. *Jutica.*

324. *Nocturna*, der *Nächtling.*

Müller Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1429.

Spirilinguis criſtata; alis denticulatis albidis, faſcia lata (medio macula reniformi lutéſcente), maculisque duabus apicis nigris.

325. *Heteroclita*, die *Raupenkopfeule.*

Müller Faun. Fridr. p. 47. no. 413.

Subcriſtata; *capite erucae*, *antennis nullis;* alis albis, lineis transverſim undatis punctatisque marginalibus nigris. — In *Epilobio.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1429. Ph. *Heteroclita.*

Mém. de Mathem. et de Phyſ. Naturforſch. Tom. V. p. 508. c. figg. *Découverte* d'un *Papillon à tête de Chenille.*

326. *Bilineata*, die *neuyorkiſche Doppellinie.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 18. t. 9. f. 3. Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.* Statura Ph. *Pronubae.*

Alis *anticis* cineraſcentibus, baſi glauco-griſeis, binis lineolis transverſis nigris; *poſticis* glauceſcentibus apice fuſco-flavis, binis faſciis transverſis fuſco-nigris.

327. *Flavo-ſerpentina*, die *neuyorkiſche Gelbſchlange.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 19. t. 9. f. 4. Ses ailes environ *deux pouces.*

Ejusdem *magnitudinis.*

Niger-

Nigerrima, innumeris lineis longitudinalibus, fasciisque transversis nigris; *quatuor lineis serpentinis flavis.*

328. *Incarnato-rubra*, die *neuyorkische fleischfarbigrothe Eule.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 35. t. 18. f. 3. Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Alis *anticis* incarnatis, clavis, triangulis, lineisque longitudinalibus nigris; *posticis* rubris nigro-maculatis.

329. *E latinum*, das *neuyorkische lateinische E.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 36. t. 18. f. 5. Ses ailes environ *un pouce et un quart.*

Alis griseo-albis; *anticis* fasciis transversis latis flavis, nigro-punctatis: E latino fusco, ad marginem anteriorem.

330. *Melicerta*, die *bombayische Melizerta.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 46. t. 23. f. 1. — de *Bombay.**)

— Ses *ailes* environ *deux pouces et demi.*

Alis *anticis* longitudinaliter glauco-striatis, fasciis transversis fulvis, apice striga purpurascente; *posticis* nigris, albo-maculatis.

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 96. t. 62. Fig. CD. *Melicerta.* (*Foemina.*) — de la Côte de *Coromandel.*

331. *Epi-*

*) *Drury* hat beyde Phalänen t. 23. f. 1. 2. für einerley ausgegeben; Cramer aber daraus zwo verschiedene Arten gemacht, die aber der Zeichnung nach, besonders seine Epione, mit den Druryschen nicht wohl übereinstimmen.

331. *Epione*, die *neuyorkiſche Epione.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 46. t. 23. f. 2.

Alis *anticis* nigris, faſciis transverſis fulvis; *poſticis* concoloribus aterrimis.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 9. t. 102. Fig. EF. *Epione* — à la *Nouv. York* et en *Virginie.*

332. *Ferruginea*, die *St. Chriſtophorſche Roſteule.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 47. t. 23. f. 3. Ses ailes environ *deux pouces et demi.*

Alis concoloribus ferrugineis; *anticis* puncto verſus marginem nigricante, faſciaque transverſa obſcuriore.

333. *Horologica*, die *antiguaiſche Sanduhreule.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 48. t. 23. f. 4.

Alis nigricantibus; *anticis* margine rubro-cinctis, medio apicis rubri faſcia brevis albiſſima. Margines rubri cum thorace rubro *horologii* figuram conſtituunt; inde nomen *Horologica*; *poſticis* margine exteriore partim rubro.

334. *Alboſtrigata*, der *jamaiſche Weißſtrich.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 49. t. 23. f. 5.

Alis fuſco-nigris; *anticis* ſtriga longitudinali alba, faſciis transverſis undulatis nigris, baſin ſtrigae albae tangentibus; *poſticis* margine exteriore albis.

335. *Reſpectabilis*, die *neuyorkiſche ehrwürdige Eule.**)

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 49. t. 23. f. 6. Ses ailes *deux pouces.*

Alis

*) Gar keine Aehnlichkeit mit Ph. *Paranympha* L. n. 122. *Röſel* IV. t. 18. f. 1. 2.

Alis *anticis* canescentibus nigro-maculatis, totis fere nigris, binis lineis transversis undulatis glaucescentibus, binisque maculis fulvis reniformibus; *posticis* aurantiacis, late nigro-fasciatis.

336. *Hieroglyphica*, die *madrassische Hieroglyphen-eule.*

Drury Illustr. of nat. hist. p. 3. t. 2. f. 1. Ses ailes *trois pouces et cinq huitiemes.*

Alis concoloribus fusco-nigris; *anticis* binis versus apicem maculis flavissimis contiguis, *serpenteque* in gyrum contracto fusco, canali nigro.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 119. t. 174. Fig. F. Ph. *Mygdonia* — sur la côte de *Coromandel.**)

337. *Puella*, das *madrassische Mägdlein.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 3. t. 2. f. 2. Ses ailes *un pouce et un quart.*

Parva. Alis *anticis* albis, fasciis transversis rubris, binisque in medio punctis fuscis; *posticis* rubescentibus, fusco-striatis, margine flavo.

338. *Myrtaea*, die *madrassische Myrtäa.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 4. t. 2. f. 3. Ses ailes *un pouce et un quart.*

Alis concoloribus *rubris*, uncinulis nigris tenuissimis. Parva.

*) Bey der *Cramerschen* hat die *Schlange* auf den Oberflügeln, da, wo sie sich mit dem Schwanze gegen den Kopf krümmet, noch ein *himmelblaues großes lateinisches* D.

339. *Papilionaris*, die *chineſiſche tagfalterähnliche Eule.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. p. 4. t. 2. f. 4. Ses ailes *trois pouces et presque un quart.*

Habitus *Papilionis Danai Feſtivi.* Alis nigris, ſulphureo-faſciatis maculatisque; margine anticarum anteriore thoraceque glauceſcentibus, duodecim in hoc punctis albidis maioribus minoribusque.

340. *Specioſa*, die *ſierraleoniſche Eule.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 8. t. 5. f. 2. Ses ailes *deux pouces et trois quarts.*

Alis *anticis baſi* aurantiacis, fuſco-punctatis, *medio* pallide flavis, *apice* fuſcis; *poſticis* concoloribus ſulphureis.

341. *Servula*, die *madraſſiſche Servula.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 20. t. 11. f. 4. Ses ailes *deux pouces.*

Alis *anticis* flavis, ſtrigis tribus obſoletis longitudinalibus, margineque exteriore fuſcis; *poſticis* dimidio albicantibus, dimidio fuſcis.

342. *Anilis*, die *virginiſche alte Frau.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 22. t. 12. f. 3. Ses ailes *un pouce et demi.*

Alis *anticis* furvis binis lituris, faſciisque binis transverſis flaviſſimis; *poſticis* pallidioribus.

343. *Amabilis*, die *afrikaniſche Perl.* *)

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 23. t. 13. f. 3. Ses ailes *un pouce et demi.*

Alis

*) Unſtreitig eine Eule mit den ſchönſten und ſeltenſten Zeichnungen, ſo klein ſie auch iſt.

Alis *anticis* rubris, maculis rotundis, partim contiguis, margineque interiore flaviſſimis; *poſticis* luteis, binis in medio maculis, margineque exteriore aterrimis.

344. *Fluctuoſa*, die *ſierraleoniſche Waſſerwelle.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 24. t. 14. f. 1. Ses ailes *trois pouces et un huitieme.*

Alis concoloribus fuſcis, ubique nigro-undulatis, faſciis binis transverſis latis pallidioribus, linea fuſca.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 118. t. 174. Fig. C. Ph. *Fluctuoſa.*

345. *Miniſtra*, die *neuyorkiſche Dienerinn.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 25. t. 14. f. 3. Ses ailes *deux pouces.*

Alis *anticis* ferrugineis, lineis transverſis nigris tenuiſſimis; *poſticis* flavicantibus margine aurantiacis.

346. *Chera*, die *ſurinamiſche Chera.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 36. t. 20. f. 4. Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus fuſco-caneſcentibus, *anticis* margine interiore flavis.

Cramer Pap. exot. Vol. IV. p. 39. t. 308. Fig. E.

347. *Scolopacea*, die *jamaiſche Schecke.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 38. t. 22. f. 1. Ses ailes *trois pouces et trois huitiemes.*

Alis dentatis concoloribus luteſcentibus, innumeris lituris, faſciisque nigris undulatis, variegatis.

348. *Soſpeta*, die *jamaiſche Soſpeta.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 39. t. 22. f. 3. Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus flaviſſimis, falcato-dentatis, maculis ſtriatis fuſcis.

349. *Opigena*, die *jamaiſche Opigena.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 39. t. 22. f. 4. Ses ailes *trois pouces et demi.*

Alis falcatis concoloribus fuſco-furvis, lineis transverſis undulatis nigris, faſciisque obſcurioribus: *palpis* longioribus.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 118. t. 174. Fig. D. Ph. *Scolopacea* *) — de *Suriname.*

350. *Hercyna*, die *jamaiſche Herzyna.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 41. t. 24. f. 1. 2. Ses ailes *quatre pouces et un quart.*

Magna. Alis denticulatis fuſco-furvis, lineis longitudinalibus undulatis nigris; *anticis* diſco pallidiore, binis *lunulis* obſcure fuſcis.

351. *Eduſa*, die *neuyorkiſche Eduſa.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 42. t. 24. f. 4. Ses ailes *deux pouces et presque un quart.*

Alis dentatis, concoloribus fuſcis, griſeo-albo-variegatis.

352. *Fla-*

*) Das Citatum des Drury bey dieſer Scolopacea iſt richtig: nämlich II. t. 22. f. 4. wie denn auch beyderley Abbildungen übereinkommen, nur ſind die ſchwarzen Queerlinien in der kramerſchen deutlicher; die Benennung aber Scolopacea iſt unrichtig, und aus Verſehen von *Drury* II. t. 22. f. 1. genommen, die ganz anders ausſiehet.

352. *Flavo-maculata*, der *Gelbfleck.*
Geoffr. Inſ. II. p. 148. no. 77.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, *ſuperioribus* nebuloſo-fuſcis; *inferioribus* nigris, *macula* margineque luteis.
La *Phalene brune à tache jaune aux ailes inférieures.*
Long. 5. *lign.*

353. *Terlineata*, die *Dreylinie.*
Geoffr. Inſ. II. p. 148. no. 78.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* cinereis, faſciis transverſis fuſcis *e triplici linea* compoſitis.
La *Rayure à trois lignes.*
Long. 8. lign.

354. *Undoſa*, die *Welle.*
Geoffr. Inſ. II. p. 153. no. 86. t. 12. f. 4.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* cinereo-fuſcis; *ſuperioribus* faſcia *undoſa* triplici, punctoque obſcuro marmoratis.
Le *Flot.*
Long. 1 pouce.

355. *Bifaſciata*, die *braune Doppelbinde.*
Geoffr. Inſ. II. p. 153. no. 87.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* albo-flaveſcentibus, *faſcia duplici* transverſa *fuſca.*
La *Phalene blancheatre à deux bandes brunes.*
Long. 7. lign.

356. *Margine maculata*, der *Randfleck.*
Geoffr. Inſ. II. p. 154. no. 88.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* albido-flaveſcentibus, faſcia marginali oblonga fuſca.

La *tache marginale.*

Long. 5. lign.

357. *Decolorata*, die *verbleichte Eule.*

Geoffr. Inſ. II. p. 154. no. 90.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis*, albido-fulvis immaculatis.

La *Décolorée.*

Long. 7 lign.

Réaum. Inſ. I. t. 36. f. 8. 10. 11. 12.

358. *Griſea*, die *kleine graue Eule.*

Geoffr. Inſ. II. p. 160. no. 98.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſco-nebuloſis, *ſuperioribus* maculis irregularibus albis.

La *Phalene petit-gris.*

Long. 6. lign.

359. *Teſſellata*, der *Würfelſaum.*

Geoffr. Inſ. II. p. 161. no. 102.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſco-nebuloſis, *limbo teſſellato;* ſuperioribus macula duplici punctoque albis.

La *Frange bigarrée.*

Long. 7. lign.

360. *Atra*, der *Schwarzflügel.*

Geoffr. Inſ. II. p. 162. no. 104.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis*, atris, ſingulis macula alba.

La

La *Phalene* noire à une tache blanche ſur chaque aile.

Long. 6. lign.

361. *Albo-maculata*, der *weiſſe Doppelfleck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 163. no. 105.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigris, ſingulis duabus maculis, et lineis undulatis albis.

La *Phalene noire à deux taches blanches ſur chaque aile.*

Long. 7. lign.

362. *Albo-lineata*, die *Weißlinie.*

Geoffr. Inſ. II. p. 163. no. 106.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigris, lineis punctisque albis.

La *Phalene noire à lignes blanches.*

Long. 6. lign.

363. *Albo-faſciata*, die *Weißbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 163. no. 107.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſcis; ſuperioribus faſcia duplici obliqua alba.

La *Phalene brune à deux bandes blanches.*

Long. $3\frac{1}{2}$. lign.

364. *Aureo-maculata*, der *Goldfleck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 165. no. 110.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigro-fuſcis, maculis plurimis albido-flaveſcentibus.

La *plaque dorée.*

Réaum. Inſ. I. t. 19. f. 2.

365. *Murina*, die *mauſegraue Eule.*

Degeer Inſ. Tom. I. Part. I. p. 406. no. 3. t. 6. f. 22.
Phalene gris-de-ſouris à 4 taches noires.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes croiſées d'un gris de ſouris avec 4 taches irrégulieres noires, à ailes inférieures en partie blanches.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 293. no. 3. t. 6. f. 22. die *mauſefahle Phaläne mit 4 ſchwarzen Flecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und gekreuzten mauſefahlen Flügeln mit vier ſchwarzen ungleichen Flecken, und zum Theil weiſſen Unterflügeln.

Schaeff. Icon. t. 112. f. 1. 2.

366. *Griſeo-variegata*, die *Grauſchecke.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 410. no. 2. t. 6. f. 23.
Phalene griſe bigarrée à deux taches blanches ſur chacune.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues griſes tachetées de jaune orange, avec deux grandes taches blanches ſur chacune.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 297. no. 2. t. 6. f. 23. die *graue geſcheckte Phaläne mit zween weiſſen Flecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und niederhangenden grauen, orangegelb gefleckten Flügeln, und zween groſsen weiſſen Flecken auf jedem.

367. *Viridi-obſcura*, die *dunkelgrüne Eule.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 412. no. 5. t. 6. f. 24.
Phalene verte obſcure à rayes blanches et noires.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un brun verdâtre avec des rayes ondées

ondées blanches et noires, et deux taches blancheatres au milieu.

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 299. no. 5. t. 6. f. 24. die *dunkelgrüne weiß und ſchwarzgeſtreifte Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und braungrünlichen niederhangenden Flügeln, mit weiſſen und ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und zween weiſslichen Mittelflecken.

368. *Megacephala*, der *Dickkopf.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 413. no. 7. t. 7. f. 9. *Phalene groſſe-tête.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit cendrées, avec des rayes ondées noires et une tache ovale au milieu d'un blanc ſale.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 200. no. 7. t. 7. f. 9. der *Dickkopf.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauen dachförmig niederhangenden Flügeln, mit ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und einem eyförmigen weiſsgraulichen Mittelfleck.

369. *Albo-venoſa*, die *Weißader.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 415. no. 8. t. 7. f. 14. *Phalene griſe à nervures blanches.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit griſes, dont les nervures ſont d'un gris blancheâtre.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 301. no. 8. t. 7. f. 14. die *graue weißadrichte Phaläne.*

Die

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und grauen, dachförmig niederhangenden Flügeln, mit weiſsgraulichen Adern.

370. *Hepatica*, die *leberfarbige Eule.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 417. no. 9. t. 6. f. 25. *Phalene couleur de foye.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris couleur de foye luiſant avec deux lignes ondées et deux taches noirâtres.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 303. no. 9. t. 6. f. 25. die *leberfarbige Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und grauen, glänzend leberfarbigen niederhangenden Flügeln, mit zwo gewäſſerten Linien, und zween ſchwärzlichen Flecken.

371. *Hippophäe*, die *Weidendorneule.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 419. no. 11. t. 7. f. 16. *Phalene de l' Hippophäe.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un brun luiſant rouſſâtre avec une ligne transverſe rouſſe, et un gros point noir.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 304. no. 11. t. 7. f. 16. die *Weidendornphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und braunglänzend röthlichen niederhangenden Flügeln mit einer röthlichen Queerlinie, und einem dicken ſchwarzen Punkt.

372. *Cinerea*, die *aſchgraue Eule.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 422. no. 13. t. 7. f. 19. *Phalene cendrée à deux taches couleur de ſouffre.*

Pha-

Phalene à antennes filiformes rouſſes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris-cendré agathe avec des rayes transverſes noires, et deux taches couleur de ſouffre.

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 306. no. 13. t. 7. f. 19. die *aſchgraue Phaläne mit zween ſchwefelgelben Flecken.*

Die *Phaläne* mit braunröthlichen fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauen achatfarbigen, niederhangenden Flügeln, mit ſchwarzen Queerſtreifen, und zween ſchwefelgelben Flecken.

373. *Ypſilon graecum*, das *griechiſche Ypſilon.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 423. no. 14. t. 7. f. 23. *Phalene ϐ, ou.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris d'agathe à nuances couleur de lilas, et à rayes ondées noirâtres, avec une tache couleur de ſouffre en ϐ.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 307. no. 14. t. 7. f. 23. *die ϐ Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und achatgrauen, lilafarbigen, ſchattirten, niederhangenden Flügeln, mit gewäſſerten ſchwärzlichen Streifen, und einem ſchwefelgelben Fleck in Geſtalt eines griechiſchen ϐ.

374. *Filicis*, die *Farrenkrautphaläne.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 435. no. 7 t. 7. f. 26. *Phalene de la Fougere.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues rayées de noir, et

et de gris-de-perle avec deux taches cendrées, et une tache et raye ondée d'un blanc jaunâtre.

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 317. no. 7. t. 7. f. 26. die *Farrenkrautphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden ſchwarz- und perlgraugeſtreiften Flügeln, mit zween aſchgrauen und einem weiſsgelblichen Fleck, und eben dergleichen gewäſſerten Streife.

375. *Angulata*, die *Eckbruſt.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 436. no. 8. t. 8. f. 9. *Phalene ardoiſée à corcelet angulaire.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à corcelet huppé et angulaire, à ailes rabatues ardoiſées avec des taches d'un gris blancheatre, deux taches rouſſes et quelques traits noirs.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 318. no. 8. t. 8. f. 9. die *ſchieferfarbige Phaläne mit eckigem Bruſtſchilde.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, eckigem Bruſtſchilde, und niederhangenden ſchieferfarbigen Flügeln, mit grauweiſslichen und zween roſtfarbigen Flecken, wie auch einigen ſchwarzen Strichen.

376. *Reticulata*, die *Netzſtreife.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 441. no. 11. t. 7. f. 27. *Phalene brune à rayes griſes en réſeau.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé et angulaire, à ailes rabatues brunes à nervures et à rayes transverſes d'un gris clair.

Degeer

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 223. no. 11. t. 7. f. 27. die *braune Phaläne mit grauen netzförmigen Streifen.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, eckigem Bruſtſchilde, und niederhangenden achatbraunen Elügeln, mit zwo ſchwarzen gekrümmten Streifen, und einem dreyeckigen Fleck von gleicher Farbe.

377. *Agrippina*, die *ſurinamiſche Agrippina.* *)

Cramer Pap. exot. I. p. 136. t. 87. Fig. A. Ph. *Agrippina.*

— — p. 138. t. 88. Fig. A.

Maxima. Alis incarnatis cineraſcentibus; lineis innumeris transverſis undulatis nigris fulvisque.

Merian. Surin. t. 20.

378. *Arnea*, die *ſurinamiſche Arnea.*

Cramer Pap. exot. I. p. 59. t. 36. Fig. G.

Alis *anticis* vireſcentibus nigro-venoſis, flavo-marginatis: diſco flavo-rubro, atro-uncinulato; *poſticis* incarnatis.

379. *Cajeta*, die *koromandelſche Kajeta.*

Cramer Pap. exot. I. p. 48. t. 30. Fig. A B. *Mas;* Fig. C. *Foemina.*

Alis *anticis* fuſco-rubris, margine exteriore albis; *lineis* longitudinalibus arcuatis, albo-punctatis, binisque transverſis albis: *maculis* binis oblongis nigris, quatuorque ovatis obſcure viridibus;

*) Dieſe iſt nicht *Strix* Linn.

dibus; *posticis* ferrugineis dilute atro-maculatis, punctis marginalibus ochreaceis.

380. *Corinna*, die *surinamische Korinna.*

Cramer Pap. exot. I. p. 47. t. 29. Fig. H.

Alis testaceis, aureo-marginatis; *anticis* quatuor lineis transversis *aureis*, coeruleo-terminatis; *posticis* punctis quatuor marginalibus fuscis, binis aureis, et in utraque cyaneum.

381. *Ilus*, die *surinamische Ilus.*

Cramer Pap. exot. I. p. 145. t. 95. Fig. E. *Foemina.*

Alis *anticis* furvis, apice littera Y fulva, rubro-punctata; *posticis* rubicundis.

382. *Julia*, die *kapensische Julia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 11. t. 7. Fig. EF.

Alis fusco-rubris, *anticis* flavo-variegatis; *posticis* concoloribus brunneis.

Houttuin Nat. Hist. Tom. I. Part. XII. p. 676. t. 92. f. 6. *Foemina.*

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 310. no. 193. a. Phal. *Julia*, der *Pinselschwanz.*

383. *Latona*, die *guinéische Latona.*

Cramer Pap. exot. I. p. 20. t. 13. Fig. B.

Magna. Alis obscure brunneis; *anticis* numero 9 olivaceo, macula media atra, notatis; fasciis transversis, lineisque acute undulatis albis.

384. *Manlia*, die — *Manlia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 144. t. 92. Fig. A.

Magna.

Magna. Alis ſubfalcatis fuſco-rubentibus; *anticis* binis maculis obſoletis furvis; *poſticis* baſi fuſco-rubris, medio cyaneo-viridibus, apice purpuraſcentibus.

385. *Menete*, die *weſtindiſche Menete.*

Cramer Pap. exot. I. p. 110. t. 70. Fig. D.

Alis *anticis* purpuraſcentibus, binis maculis, lineisque longitudinalibus, binisque transverſis, flavicantibus; *poſticis* luteis marginalibus fuſcis, binis maculis longitudinalibus fuſcis.

386. *Milete*, die *nordamerikaniſche Milete.*

Cramer Pap. exot. I. p. 26. t. 18. Fig. D.

Alis concoloribus nigerrimis flavo-maculatis.

387. *Nyſeus*, der *ſurinamiſche Nyſeus.*

Cramer Pap. exot. I. p. 119. t. 75. Fig. E.

Alis ſubfalcato-dentatis ciliatis; *anticis* flaveſcentibus, lineis transverſis incarnatis, punctis numeroſis nigris; *poſticis* purpuraſcentibus, baſi margineque flavicantibus.

388. *Ora*, die — *Ora.*

Cramer Pap. exot. I. p. 139. t. 88. Fig. B.

Alis rubeſcentibus; *anticis* margine anteriore luteo; binis lineis transverſis, binisque lunulis nigris, puncto atro.

389. *Pomona*, die *koromandelſche Pomona.*

Cramer Pap. exot. I. p. 122. t. 77. Fig. C.

Magna. Alis *anticis* viridi-albo-fuſcoque variegatis, *virga* fuſca bifurcata; *poſticis* ferrugineo-fuſcis, macula *reniformi* fuſca.

390. *Sybaris*, die *jamaiſche Sybaris.*

Cramer Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. E. *Mas.*
Alis concoloribus nigerrimis, albo-maculatis; tribus anticarum margine anteriore punctis ruberrimis.

391. *Tanais*, die *ſurinamiſche Tanais.*

Cramer Pap. exot. I. p. 106. t. 68. Fig. D. *Foemina.*
Alis fuſcis, flavo-nigroque variegatis.

392. *Tybris*, die *ſurinamiſche Tybris.*

Cramer Pap. exot. I. p. 145. t. 92. Fig. D.
Alis incarnatis; *anticis* fuſco-maculatis punctatisque; *poſticis* margine interiore abdomineque aurantiacis.

393. *Timolea*, die *ſurinamiſche Timolea.*

Cramer Pap. exot. I. p. 127. t. 80. Fig. F.
Alis concoloribus fuſcis; *anticis* lineis transverſis undulatis caneſcentibus.

394. *Admirabilis*, die *ſurinamiſche Wundereule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 11. t. 103. Fig. G.
Alis *anticis* albo-flavis, puncto ocellari albo, maculisque ovatis pellucidis; *poſticis* niveis, abdomine rubro, albo-punctato.

395. *Amphix*, die *koromandelſche Amphix.*

Cramer Pap. exot. II. p. 59. t. 134. Fig. C.
Alis *denticulatis*; *anticis* incarnatis, tribus medio punctis nigris, in triangulo poſitis, margine interiore atro-punctato; *poſticis* albo-furvis.

396. *Aſy-*

396. *Aſylas*, die *kapenſiſche Aſylas.*

Cramer Pap. exot. II. p. 62. t. 137. Fig. C.
Alis incarnatis; *anticis* atro-lituratis, faſcia longitudinali albicante.

397. *Bajularia*, die *amboiniſche Bajularia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 115. t. 172. Fig. C.
Alis *anticis* furvis, binis maculis faſciaque transverſa albis; *poſticis* flavis atro-maculatis faſciatisque.

398. *Caffraria*, die *kafferſche Eule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 82. t. 147. Fig. F.
Alis furvis; *anticis* flavo-atroque variegatis, punctis marginalibus atris; *poſticis* albis, fuſco-marginatis.

399. *Capenſis*, die *Kapeule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 109. t. 167. Fig. C.
Alis concoloribus fuſcis; *anticis* lineis faſciisque albis variegatis.

400. *Chlorea*, die *ſurinamiſche Chlorea.*

Cramer Pap. exot. II. p. 12. t. 104. Fig. C.
Alis furvis; *anticis* nigro-flavoque variegatis, *tridente rubro.*

401. *Cocalus*, der *oſtindianiſche Kokalus.*

Cramer Pap. exot. II. p. 59. t. 134. Fig. B.
Alis *anticis* viridibus, fuſco-lineatis; *poſticis* aurantiacis, margine nigris.

402. *Colluſoria*, die *ſurinamiſche Colluſoria.*

Cramer Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. F.

Alis furvis; *anticis* fascia longitudinali undulata obscuriore; *posticis* aurantiacis, margine aterrimo, binis figuris atris, *catulum* referentibus.

403. *Cresus*, die *berbizeische Kresuseule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 72. t. 142. Fig. C.

Alis *anticis* fuscis, atro-argenteoque punctatis; *posticis* incarnato-flavis.

404. *Dolon*, der *surinamische Dolon.*

Cramer Pap. exot. II. p. 7. t. 101. Fig. DE. *Foemina;* Fig. F. *Mas.*

Foem. Alis nigricantibus, linea transversa albidissima; *anticis* glauco-maculatis; *posticis* fusco-cyaneis, fusco-punctatis.

Mas. Alis furvis, apice binis maculis incarnatis, lineisque transversis undulatis albis.

405. *Hermonia*, die *koromandelsche Hermonia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 119. t. 174. Fig. E.

Alis fusco-nigris; *anticis* fascia transversa brevi alba, flavo-marginata; binisque lunulis glaucis, medio luteis.

406. *Hieroglyphica*, die *kurakaische Bildereule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 81. t. 147. Fig. D.

Alis *anticis* hieroglyphicis, viridi-flavoque lineatis, trina punctorum atrorum serie marginali; *posticis* fuscis.

407. *Juturna*, die *surinamische Juturna.*

Cramer Pap. exot. II. p. 48. t. 129. Fig. E.

Alis brunneis; *anticis* flavo-fasciatis, binisque

que litteris O fuſcis, flavo-marginatis; *poſticis* brunneis concoloribus.

408. *Lelex*, die *ſurinamiſche Lelex.*

Cramer Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. C.
Alis luteis, nigro-venoſis.

409. *Lepida*, die *bengaliſche Lepida.*

Cramer Pap. exot. exot. II. p. 50. t. 130. Fig. E.
Alis *anticis* viridi-fuſcis; *poſticis* fuſco-rubentibus, baſi flavicantibus.

410. *Levida*, die *ſurinamiſche Levida.*

Cramer Pap. exot. II. p. 46. t. 128. Fig. D. *Foemina.*
Alis concoloribus purpuraſcentibus, transverſe nigro-lineatis.

411. *Macarea*, die — *Makarea.*

Cramer Pap. exot. II. p. 17. t. 107. Fig. F.
Alis nigerrimis, baſi cyaneo-radiatis; *anticis* faſcia transverſa alba, latere uno rubro-marginato; *poſticis* binis maculis rubris.

412. *Macaria*, die *ſurinamiſche Makaria.*

Cramer Pap. exot. II. p. 48. t. 129. Fig. D.
Alis fuſcis, viridi-micantibus, linea transverſa, rubro-alba, margine exteriore lato rubente, atro punctato.

413. *Modeſta*, die *ſurinamiſche Modeſta.*

Cramer Pap. exot. II. p. 28. t. 115. Fig. C.
Alis *anticis* furvis, macula marginali ſanguinea; *poſticis* rubeſcentibus.

414. *Mygdon*, der — *Mygdon.*

Cramer Pap. exot. II. p. 94. t. 156. Fig. G.

Alis *anticis* nigris, triangulo furvo, basi aurantiaco, lateribus albicantibus; *posticis* incarnatis.

415. *Mygdonia*, die *koromandelsche Mygdonia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 119. t. 174. Fig. F.

Alis nigro-furvis; *anticis* binis lineis transversis luteis, medio interruptis, litteraque D cyanea, annulis fuscis inclusa.

416. *Onytes*, die *surinamische Onytes.*

Cramer Pap. exot. II. p. 107. t. 165. Fig. E.

Alis *anticis* fusco-rubris; *posticis* pallide fuscis, omnibus flavissime marginatis.

417. *Orodes*, die *surinamische Orodes.*

Cramer Pap. exot. II. p. 49. t. 129. Fig. F.

Alis concoloribus brunneis; *posticis* binis fasciis coeruleis ad marginem exteriorem.

418. *Orsa*, die *surinamische Orsa.*

Cramer Pap. exot. II. p. 75. t. 143. Fig. F.

Alis niveis; *anticis* ocellis fuscis pellucidis, margine exteriore linea fusca undulata, abdomine aurantiaco atro-annulato.

419. *Perithea*, die *amboinische Perithea.*

Cramer Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. D.

Alis fusce scentibus, basi fasciaque transversa flavissimis.

420. *Phasis*, die *surinamische Phasis.*

Cramer

Cramer Pap. exot. II. p. 106. t. 165. Fig. B.

Alis *anticis* marmoratis, lineis transversis atris undulatis; *posticis* olivaceis, binis fasciis transversis luteis.

421. *Procus*, der *surinamische Prokus.*

Cramer Pap. exot. II. p. 85. t. 149. Fig. G.

Magna. Alis *anticis* violaceis fusco-liturati, littera d fusca insignitis; *posticis* aurantiacis, binis fasciis latis nigris sinuosis, medio continuis.

422. *Priverna*, die *surinamische Priverna.*

Cramer Pap. exot. II. p. 108. t. 166. Fig. E.

Alis violaceis, fasciis binis transversis flavissimis, lineisque luteis longitudinalibus partim concatenatis; *posticis* aurantiacis, margine purpurascentibus.

423. *Puera*, die *surinamische Puera.*

Cramer Pap. exot. II. p. 10. t. 103. Fig. DE.

Alis supra, *anticis* cinereo-glaucis, margine anteriore rubro-punctatis; *posticis* nigerrimis, flavo-rubroque maculatis; subtus rubris, flavo-atroque maculatis.

424. *Pyrgo*, die *surinamische Pyrgo.*

Cramer Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. D.

Alis *anticis* concoloribus castaneis, margine anteriore albo; *posticis* fuscis, maculis mediis flavis.

425. *Retorta*, die *koromandelsche Retorte.*

Cramer Pap. exot. II. p. 29. t. 116. Fig. D. *Mas.*

Alis fuſco-nigris; *anticis Retorta* chymica.
Clerk Icon. t. 54. f. 2. 3.
Cramer Pap. exot. III. p. 146. t. 274. Fig. A. *Foemina.*

426. *Salaminia*, die *ſurinamiſche Salaminia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 117. t. 174. Fig. A.
Alis *anticis* viridibus, margine anteriore rubro-lituratis, faſcia longa lata incarnata, venis nigris, binis ſanguineis, margine exteriore fuſco-rubro, glauco-albo; *poſticis* luteis nigro-marginatis, binis in medio uncis nigris.
Clerk Icon. t. 48. f. 5. 6.

427. *Sicheas*, der *ſurinamiſche Sicheas.*

Cramer Pap. exot. II. p. 86. t. 150. Fig. E.
Alis fuſcis, rubro-transverſe lineatis; *poſticis* flavo-fuſcis.

428. *Suero*, die — *Suero.*

Cramer Pap. exot. II. p. 3. t. 97. Fig. F.
Alis nigricantibus, lineis transverſis coeruleis interruptis, margine anteriore antice incarnato, lineola marginali communi ferruginea.

429. *Tages*, die — *Tages.*

Cramer Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. D.
Alis furvis, glauco-maculatis.

430. *Tarchon*, die *ſurinamiſche Tarchon.*

Cramer Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. G.
Alis *falcatis* concoloribus, obſolete-fuſcis.

431. *Tirhaca*, die *kapenſiſche Tirhaka.*

Cramer

Cramer Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. E.
Alis *anticis* viridibus, binis maculis fuſcis, margine exteriore fuſco, lineis transverſis rubris undulatis; *poſticis* luteis fuſco-maculatis.

432. *Uſeus*, der *ſurinamiſche Uſeus.*

Cramer Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. E.
Alis furvis; *anticis* binis maculis glaucis, lineola transverſa glauca communi.

433. *Venulia*, die — *Venulia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 107. t. 165. Fig. D.
Alis *anticis* atro-punctatis, binis faſciis acuminatis, rubro-marginatis, puncto diaphano; *poſticis* luteis binis punctis margineque nigris.

434. *Acron*, der *berbizéiſche Akron.*

Cramer Pap. exot. III. p. 59. t. 227. Fig. B.
Alis fuſcis; *anticis* nigro-hieroglyphicis, margine punctis pallidioribus.

435. *Adiutrix*, die *ſurinamiſche Adjutrix.*

Cramer Pap. exot. III. p. 144. t. 272. Fig. E F.
Alis *anticis* rubellis, nigro-maculatis; *poſticis* pallide fuſcis.

436. *Amando*, die *ſurinamiſche Amando.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. E.
Alis fulvis concoloribus, fuſco-maculatis punctatisque; *anticis* falcatis.

437. *Ammonia*, die *koromandelſche Ammonia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 98. t. 250. Fig. D.

Alis fuſcis; *anticis* areis furvis, flavis faſciis transverſis.

438. *Archeſia*, die *koromandelſche Archeſia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 145. t. 273. Fig. G.

Alis obſcure aurantiacis, atro-lineatis faſciatisque.

439. *Caraenea*, die *bataviſche Karänea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 140. t. 269. Fig. EF.

Alis furvis; nigro-venoſis, margine poſtico communi fuſco-incarnato, atroque punctato.

440. *Cephiſe*, die *oſtindianiſche Zephiſe.*

Cramer Pap. exot. III. p. 59. t. 227. Fig. C.

Alis fuſcis; *anticis* medio furvis, faſcia transverſa flava, margine atro-punctatis.

441. *Cupentia*, die *ſurinamiſche Kupentia.*

Cramer Pag. exot. III. p. 103. t. 252. Fig. E.

Alis *anticis*, fuſco-alboque variegatis; *poſticis* concoloribus fuſcis.

442. *Cyllaria*, die *koromandelſche Zyllaria.*

Cramer Pap. exot. III. p. 100. t. 251. Fig. CD.

Alis *anticis* furvis, gagatheo-variegatis; *poſticis* purpuraſcentibus, tribus ſignaturis albis.

443. *Emmedonia*, die *virginiſche Emmedonia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. D.

Alis fuſcis; *anticis* baſi macula, medio faſcia, margine 9 lituris transverſis obſcurioribus; *poſticis* ſubdentatis, viridi-incarnatis: abdomine *ſphegiformi.*

444. *Epo-*

444. *Epopea*, die *surinamiſche Epopea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 144. t. 272. Fig. G H.

Alis *anticis* incarnatis, baſi maculis ocellatis, verſusque marginem transverſis latis — nigerrimis; *poſticis* incarnato-fuſcis.

445. *Erichtea*, die *virginiſche Erichtea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. E.

Alis concoloribus fuſcis, nigro-venoſis; *anticis* binis *bacillis*, *malleisque*, ſcapo obliquo — nigris.

446. *Ezea*, die *guineiſche Ezea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 78. t. 239. Fig. D.

Alis furvis; *anticis* maculis, lineisque transverſis undulatis nigris; *poſticis* maculis marginalibus flavis.

447. *Filia*, die *kapenſiſche Tochter.*

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. D.

Alis *anticis* aurantiaco-canis, maculis marginalibus albis; *poſticis* albo-canis.

448. *Grynea*, die *virginiſche Grynea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 29. t. 208. Fig. H.

*Het virginiſch geele Weskind.**)

La Likenée jaune de la Virginie.

Alis *anticis* canescentibus, binis in utraque litteris Y albicantibus; *poſticis* aurantiacis nigro-ſignatis.

449. *Hyppaſia*, die *koromandelſche Hyppaſia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 99. t. 250. Fig. D.

Alis

*) Im Gegenſatz der *Paranympha* L.

Alis incarnatis; *anticis* triangulo furvo, albo-faſciato.

450. *Inara*, die *koromandelſche Inara.*

Cramer Pap. exot. III. p. 78. t. 289. Fig. E.

Alis teſtaceis; *anticis* baſi albicantibus, maculisque fuſcis triangularibus.

451. *Luminoſa*, die *javaniſche Lichteule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 147. t. 274. Fig. D.

Alis furvis; *anticis* baſi purpuraſcentibus, lunulis albis, albo-punctatis, binis margine litteris U albis; *poſticis* lineis transverſis undulatis nigris.

452. *Martheſia*, die *virginiſche Martheſia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 127. t. 264. Fig. B.

Alis flavo-incarnatis; *anticis* maculis triangularibus liturisque nigris.

453. *Materna*, die *koromandelſche Materna.*

Cramer Pap. exot. III. p. 137. t. 267. Fig. E.

Magna. Alis viridi-micantibus fuſco-lituratis, alboque longitudinaliter faſciatis; tribus globulis brunneis; *poſticis* aurantiacis, binis in medio globulis atris, margineque ſinuato nigerrimo.

454. *Neptis*, die *ſurinamiſche Neptis.*

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. F.

Alis ferrugineis albo-maculatis.

455. *Nitida*, die *ſurinamiſche Glanzeule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 147. t. 274. Fig. F.

Alis

Alis *anticis* fulvis, rubro-punctatis, maculis bacillisque transversis olivaceis, quatuor maculis ovatis albis continuis; *posticis* hilare rubris albo-marginatis.

456. *Obscura*, die *koromandelsche Düstereule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 146. t. 274. Fig. B.

Alis obscure fuscis, fasciis lineisque longitudinalibus et transversis nigerrimis; *anticis* macula obsolete fusca, uno latere albo-nigra.

457. *Ocellata*, die *surinamische Augeneule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 151. t. 276. Fig. D. *Foemina*; Fig. E. *Mas.*

Alis *anticis* fusco-olivaceis, *posticis* pallidioribus: ocello nigro, albo-pupillato.

458. *Orosia*, die *koromandelsche Orosia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. D.

Alis *anticis* fusco-incarnatis, triangulo obtuso furvo, albo-marginato; *posticis* aurantiacis fusco-marginatis.

459. *Soror*, die *surinamische Schwester.*

Cramer Pap. exot. III. p. 150. t. 276. Fig. B.

Alis *anticis* fusco-purpurascenti-nigris, basi aurantiaco-striatis, *posticis* furvis binis maculis aurantiacis.

460. *Spadix*, die *virginische Spadix.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. F.

Alis *anticis* obscure fuscis, lineis transversis ferrugineis, binis ad marginem punctis nigris; *posticis* pallidioribus.

461. *Ti-*

461. *Timais*, die *koromandelſche Timais.*

Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. B.

Alis anticis olivaceis maculis coadunatis incarnatis, binis ocellis nigris, iride aurantiaca, punctisque marginalibus aurantiacis; *poſticis* caneſcentibus.

462. *Umminia*, die *javaniſche Umminia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 137. t. 267.

Alis olivaceo-rubeſcentibus, *anticis* ſubfalcatis, binisque maculis coadunatis albis, annulo medio aurantiacis.

463. *Vxor*, die *ſurinamiſche Gattinn.*

Cramer Pap. exot. III. p. 150. t. 276. Fig. A.

Alis olivaceis; *anticis* fulvo-coeruleoque variegatis, binis punctis albiſſimis; *poſticis* obſcurioribus, binis maculis aurantiacis.

464. *Vidua*, die *guineiſche Wittwe.*

Cramer Pap. exot. III. p. 127. t. 264. Fig. C.

Alis *anticis* luteo-fuſcis; *poſticis* incarnatis nigro-venoſis.

465. *Virbia*, die *koromandelſche Virbia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 146. t. 273. Fig. H.

Alis incarnatis, *anticis* fulvo-punctatis, linea transverſa nigra, antice furcata; *poſticis* binis faſciis acute undulatis.

466. *Schneideriana*, die *ſurinamiſche Schneidereule.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 37. t. 308. Fig. A.

Alis furvis, *anticis* baſi nigro-punctatis ſtriatisque,

atisque, margine atra lunulatis; *posticis* transverse atro-lineatis.

467. *Stenelea*, die *surinamische Stenelea.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 38. t. 308. Fig. B.

Alis testaceis, numerose atro-lituratis, omnibus ciliatis, linea marginali undulata nigra.

468. *Herilia*, die *surinamische Herilia.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 39. t. 309. Fig. A. *Mas.* B C. *Foemina.*

Magna. Alis concoloribus furvis, lineis transversis atris undulatis; *anticis* ocellis, maculis reniformibus, squamisque papilionaceis atris.

469. *Helima*, die *afrikanische Helima.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 40. t. 309. Fig. D.

Alis concoloribus fusco-nigris, lineis fasciisque longitudinalibus pallidioribus.

470. *Sterope*, die *surinamische Sterope.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 40. t. 309. Fig. E. *Femina.* p. 47. t. 312. Fig. C. *Mas.*

Alis concoloribus luteis nigro-lineatis punctatisque; *anticis* binis maculis marginalibus aurantiacis, nigro-atomatis lineola alba.

471. *Politia*, die *surinamische Politia.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 41. t. 309. Fig. F.

Alis albis nigro-lineatis punctatisque.

472. *Stolliana*, die *surinamische Stolliana.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 41. t. 310. Fig. A B.

Alis *anticis* brunneis, nigro-fasciatis punctatisque;

tisque; *posticis* purpurascentibus, disco aurantiaco, basi abdomineque coeruleis.

473. *Ebalea*, die *surinamische Ebalea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 41. t. 310. Fig. C.
Alis fuscis, *anticis* ocello furvo, margine ferrugineo; *posticis* pallidioribus.

474. *Androgea*, die *surinamische Androgea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. D.
Alis *anticis* olivaceis, mirifice variegatis; *posticis* albido-rutilantibus.

475. *Cedica*, die *surinamische Zedika.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. E.
Alis fuscis, albido-variegatis.

476. *Choninea*, die *surinamische Choninea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. F.
Alis brunneis, fasciis coalitis aurantiacis.

477. *Dares*, die *surinamische Dares.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. G.
Alis *anticis* olivaceis variegatis; *posticis* brunneis, basi nigris.

478. *Idonea*, die *surinamische Idonea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 43. t. 311. Fig. A.
Alis cinerascentibus, fusco-albo-flavo-aurantiacoque variegatis; *posticis* concoloribus fuscis.

479. *Clara*, die — *Klara.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 43. t. 311. Fig. B.

Alis

Alis fuscis; *anticis* macula triangulari argentea; *posticis* disco albo.

480. *Dyndyma*, die — *Dyndyma.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 44. t. 311. Fig. C.

Alis luteo-fuscescentibus; *anticis* macula triangulari furva, linea recta flavissima.

481. *Viridata*, der — *Grünling.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 44. t. 311. Fig. D.

Alis *anticis* virescentibus, punctis binis ferrugineis; *posticis* purpurascentibus, margine flavo.

482. *Oo*, das — *doppelte* O.

Cramer Pap. exot. IV. p. 45. t. 311. Fig. E. *Foemina*; F. *Mas.*

Alis fusco-flavoque variegatis; *anticis* duplici o argenteo.

483. *Glauca*, der *surinamische Blauling.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 45. t. 311. Fig. G.

Alis *anticis* glaucis, fusco-striatis.

484. *Nutrix*, die *surinamische Nutrix.*

Cramer Pap. exot IV. p. 46. t. 312. Fig. B.

Alis fusco-flavo-aurantiaco-nigroque variegatis.

485. *Amoenita*, die *surinamische Amönita.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 47. t. 312. Fig. D.

Alis fuscis, nigro-aureoque punctatis.

486. *Hylea*, die — *Hylea.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. E.

Alis testaceis rubro-aurantiacoque variegatis.

487. *Marcellina*, die — *Marzellina.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. F.

Alis nigricantibus, fuſco - ſtriatis; *poſticis* dentatis; omnibus ciliatis.

488. *Diſſimilis*, das *unähnliche Weibchen.*

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte I St. p. 57. no. 12. t. 4. f. 1. *Larva;* f. 3. *Foemina;* f. 4. *Mas.*

N. ſpirilinguis, criſtata, alis deflexis crenatis, ſuperioribus hepaticis macula conica linea terminali bidentata.

IV. SPANNMESSER: Phal. *Geometrae.*

1. mit *kammförmigen Fühlhörnern.* *)
   a. etwas *eckigen,*
   b. *runden* Hinterflügeln.
2. mit *borſtenförmigen Fühlhörnern.*
   a. *eckigen,*
   b. *runden Flügeln.*

I. Mit *kammförmigen Fühlhörnern und eckigen Flügeln.*

194. *La-*

*) *Linn.* Geometrae
1. *Pectinatae*
   a. alis *poſticis* ſubangulatis,
   b. — *rotundatis.*
2. *Seticornes*
   a. alis *angulatis,*
   b. — *rotundatis.*

Der *erſten* Klaſſe der Spanner hat *Linné* lauter lateiniſche Namen gegeben, die ſich in *aria*, der *zweyten* aber, die ſich in *ata* endigen. S. *Wien. Schmett.* p. 95. Anm.

194. *Lactearia*, der *Milchflügel.*

Müllers L. N. S. 5 Th. I B. p. 704. no. 194. der *Milchflügel.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 978. no. 23. Ph. *Lactearia*, die *milchweiſſe Spannmeſſermotte.*

Wien. Schmett. p. 98. *Raupen mit 10 Füßen;* B. *Schoßraupen*, Larvae *Stoloniformes; weißſtriemige Spanner*, Ph. G. *Albolineatae.*

No. 9. *Unbekannte Raupe: weiſſer ſchneeweißgeſtrichter Spanner*, Ph. G. *Lactearia.*

— — p. 99. Anm. Vielleicht eine *Abänderung* der *Striataria* L. no. 197.

Fiſchers N. G. von Livl. p. 154. no. 369. Ph. *Lactearia*, der *Milchflügel.*

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 283. no. 41. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 194. Ph. G. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 155. no. 56. Phal. ſetic. ſpiril. *tota nivea.*

Act. Vpſal. 1736. p. 34. no. 39.
Papilio alis planis *albis.*

Scop. Entom. carn. p. 215. no. 529. Ph. *Lactearia.*
Long. lin. 5. lat. $3\frac{1}{2}$.
Alba; antennis *pectinatis;* pectinibus villoſis, apice ſetaceis; alis *poſticis* angulatis, omnibus ſtrigae transverſae veſtigio.

Fabric. S. E. p. 619. no. 1. *Phalaena Lactearia.* Nom. *Linn.*
In Europae *Nemoribus.*
Tenerrima et fere *pellucida.* *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 417. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

*) Wenn ſie ſich abgeflattert hat.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1431. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 131. no. 44.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus rotundatis *niveis*, corpore flavo.

La *Laiteuſe.*

Long. 3 lign. *Larg.* 7 lign.

195. *Vernaria*, der *Frühlingsſpanner.* *)

Müller l. c. p. 704. no. 195. der *Frühlingsvogel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 749. Ph. *Vernaria*, der *Frühlingsmeſſer.*

Bey uns etwas *ſelten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 34. Ph. *Vernaria.*

1) Die Raupen freſſen *Eichen*, *Haſelſtauden-* auch *Erlenblätter.*

2) Da ſolche, und die *Röſelſche* I. Ph. 3. t. 13. *zwo weiſſe* Queerlinien hat, ſo iſt es eher die Vernaria, als die Viridata L. no. 230. wobey *Füeßl.* vielleicht dieſe Röſelſche unrichtig angeführt hat (Chorh. *Meyer*).

Berlin. Mag. IV. p. 506. no. 4. Ph. *Vernaria*, das *weiſſe Band.*

Blaſsgrün, mit zwo weiſſen Queerſtreifen, durch

*) Bey dieſem Spanner ſind die Schriftſteller ſehr uneins: *Fabric.* hält ihn für *Röſels* I. N. V. 3 Kl. t. 13. *Füeßl.* hat dieſe *Röſelſche* bey der Viridata L. no. 230. angeführt; *Müller* in ſ. Faun. Fr. hat eine neue Art *Strigata* no. 454 beſchrieben, und dabey dieſe Röſelſche zitirt. *Kleem.* im Raupenkal. p. 37. no. 97. alles zur Viridata gezogen. Wie iſt hieraus zu kommen? Die *Röſelſche* iſt weder Vernaria noch Viridata L. ſondern *Mülleri* Strigata; *Scop.* Fimbrialis no. 535. der *Wiener* Bupleuraria p. 97. n. 4. und *Hufnagels* Fimbriata ſ. *Berl. Mag.* IV. p. 604. no. 64. ſ. *Naturf.* XI. p. 80. no. 64.

durch die *Ober-* und einem durch die *Unterflügel.*

— — p. 620. B. das *Männchen* von *dieſer Phaläne* — ſagt Hr. *Hufnagel.* Allein dies vermeynte *Männchen* der Vernaria iſt G. *Putataria* L. no. 196.

Naturf. XI. p. 65. no. 4. Ph. *Vernaria.*

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte I St. p. 1. t. 1. f. 1. Ph. G. *Seſquiſtriataria* (Mas).

Wien. Schmett. p. 97. B. no. 3. *Waldrebenſpannerraupe* (Clematis Vitalbae); *Waldrebenſpanner*, Ph. *Vernaria.*

Schriften der Dronth. Geſ. IV. p. 284. no. 42. Phal. *Vernaria.*

Schaeff. Icon. t. 122. f. 5.

Réaum. Inſ. Tom. II. t. 29. f. 14-19.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1432. Ph. *Vernaria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 620. no. 3. *Phalaena Vernaria.**)

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 362. no. 3. t. 6. f. 8. *Phalene à antennes demi-barbues.*

Phalene à antennes barbues à extrémité liſſe et à trompe, à ailes horizontales d'un verd celadon pâle, à deux lignes transverſes ondées blanches, et dont les inférieures font un angle.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 263. no. 3. t. 6. f. 8. das *halbbärtige Fühlhorn.*

*) Margo alarum fuſco-punctatus.
Larva ferruginea, albo-nigroque varia, capite dentato.

Dies alles aber gehet auf die *Röſelſche* Phaläne I. N. V. 3. t. 13, weil man vorausſetzte, dieſe ſey mit Vernaria einerley.

Die *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, die am Ende glatt sind; einem Saugrüssel, horizontalen blafsseladongrünen Flügeln, mit zwo gewässerten weissen Queerstreifen und Unterflügeln, die einen Winkel machen.*)

Réaum. Inf. II. ed. 4. p. 367. 368. t. 29. f. 14-19.

196. *Putataria*, der *Weifsstrich.*

Müller l. c. p. 704. no. 196. der *Weifsstrich.*

Berl. Mag. IV. p. 620. B. das vermeynte Männchen der Vernaria.

Naturf. XI. p. 65. no. 4. der kleine Vogel in *Hufnagels* Anm. B. ist nicht das Männchen der Vernaria, sondern die Ph. *Putataria* L. (von *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 98. B. no. 8.
Unbek. Raupe: perlweifslicher weifsstriemiger Spanner, Ph. *Putataria.***)

Fabric. S. E. p. 620. no. 4. *Phalaena putataria*
— antennis apice setaceis.
In Europae *Nemoribus.*

Clerk Icon. t. 3. f. 9. Ph. *putata.*

Müller Faun. Fridr. p. 47. no. 416. Ph. *putataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1436. Ph. *putataria.* Nom. *Linn.*

197. *Stri-*

*) Ich nehme hierdurch die daselbst angeführten Zitata: als *Rösel* I. Ph. 3. t. 13, und *Müllers* Strigata F. Fr. n. 454. zurück.

**) Im Anhange des Linn. Syst. ed. 12. ist für die Putataria *Schaeff.* Icon. t. 67. f. 10. 11. angeführt. Gewifs von einem Schüler des *Linné*, der sich durch die Aehnlichkeit des Namens verleiten lassen. Denn die Schäfferische Phaläne ist Ph. β. *Potatoria* L. (Faem.) no. 23.

197. *Striataria*, der *Gelbſtrich.*

Müller l. c. p. 704. no. 197. der *Gelbſtrich.*
Wien. Schmett. p. 99. Anm. Vielleicht nur eine Abänderung der *Lactearia* L. no. 194.
Berl. Mag. IV. p. 514. no. 17. Ph. *Strataria*, der *Schneevogel.*

Der Grund gelblich weiſs, mit 2 braunen breiten irregulären Queerbinden; die Felder dazwiſchen braunpunktirt.

— p. 622. G. Viel ähnliches mit Hufnagels *Atomaria* no. 12.
Naturf. XI. p. 68. no. 17. Ph. *Strataria.*
Clerk Icon. t. 55. f. 4.
Fabric. S. E. p. 620. no. 5. *Phalaena ſtriataria.* Nom. *Linn.*

In Europae *Umbroſis.*

Alae omnes albidae, ſtrigis *anteriorum* duabus; *poſteriorum* unica, flaveſcentibus.

198. *Vibicaria*, der *Purpurſtrich.*

Müller l. c. p. 704. no. 198. der *Purpurſtrich.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 750. Ph. *Vibicaria.*

Bey uns *ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 612. no. 82. Ph. *Rubro-faſciata*, die *rothe Binde.*

Strohgelb, mit einer breiten *roſinrothen* Binde durch alle vier Flügel.

Naturf. XI. p. 84. no. 82. Rubro - faſciata — eigentlich *faſciaria*, weil ſie unter die *Pectinicornes* gehört, iſt L. *Vibicaria* (v. *Rottemb.*).
Wien. Schmett. p. 117 P. *Fadenraupen*, Larvae *Filiformes; bogenſtriemigte Spanner*, Ph. G. *Arcuato-ſtriatae.*

No. 2. *Schmelenſpannerraupe* (Airae montanae), *Schmelenſpanner.* Ph. *Vibicaria.*

Scop. Entom. carn. p. 226. no. 562. Ph. *Cruentata.*
Long. lin. 6. *Lat.* $4\frac{1}{2}$.
Alae ſupra oſſeae, faſcia communi fimbriaque ruſſeis.
Schaeff. Icon. t. 12. f. 5.
Fabric. S. E. p. 623. no. 19. *Phalaena Vibicaria.*
Pectinicornis; alis *rotundatis*, flaveſcentibus; ſtrigis tribus purpureis; anteriore obſoletiore.
In Europae *Nemoribus.*
Convenit *Linn.* deſcriptio, at alae *haud angulatae.*
Geoffr. Inſ. II. p. 132. no. 48.
Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus luteis; faſcia transverſa rubra.
La *Bande rouge.*
Long. 6 lign. *Larg.* 13 lign.
Cramer Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. D. Ph. G. *Vibicaria.*

199. *Thymiaria*, der *Wellenſtrich.*

Müller l. c. p. 705. no. 199. der *Wellenſtrich.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 751. Ph. *Thymiaria.*
Bey uns *ſelten.*
Friſch Inſ. X. p. 20. 3 Pl. t. 17. no. 17.
Vom braunen *Spannmeſſer* mit den zwey Kopf- und Rückenſpitzen, und ſeinem *grünlichen Papilion.*
Wien. Schmett. p. 97. B. no. 5. *Thymianſpannerraupe* (Thymi vulgaris); *Thymianſpanner*, Ph. *Thymiaria.*
Jährlich die *Raupe* immer auf *Schlehen* (Prunus ſpinoſa).
Albin Inſ. t. 48. f. 81. *Raupe:* auf dem *Weißdorn* (Crataegus Oxyac.).

200. *Pun-*

200. *Punctaria*, der *Punktſtrich.*

Müller l. c. p. 705. no. 200. der *Punktſtrich.*
Berl. Mag. IV. p. 514. no. 18. Ph. *Punctaria*, der *Rothſtreif.*
Blaſsgelb, mit einem rothen Queerſtreif und vielen rothen Punkten.
— — p. 622. G. Im Frühjahr die zeitigſte unter allen; ſchon an den Baumſtämmen, wenn der Schnee noch nicht weggeſchmolzen iſt.
Wien. Schmett. p. 103. Anm. Ph. *Punctaria.*
— — p. 107. H. *Stricheraupen*, Larvae *Strigillatae*; *wechſelnde Spanner*, Ph. G. *Alternantes.*
1) mit einem Queerſtriche.
No. 2. *Eichenbuſchſpannerraupe* (Quercus Roboris); *Eichenbuſchſpanner*, Ph. *Punctaria.*
Knochs Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 13. t. 1. f. 4. Ph. *Punct.* Foemina; f. 5. *Larva;* f. 6. *Pupa.*
Réaum. Inſ. II. t. 29. f. 1-4. *)
Chenille arpenteuſe verte du chêne. Ph. *Punctaria.*
Fabric. S. E. p. 620. no. 6. *Phalaena punctaria.*
In Europa; *Anglia.*

201. *Amataria*, der *Favoritſpanner.*

Müller l. c. p. 705. no. 201. der *Liebling.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 752. Ph. *Amataria*, der *Lieblingsmeſſer.*
Bey uns etwas ſelten auf *Birken.*

*) Dieſes Zitatum hat *Linné* zu *Amataria* n. 201, und *Degeer* Tom. II. P. I. p. 360 no. 2. bey G. *Pendularia* L. *Faun.* Suec. ed. 2. no. 1244. geſetzt; die Wiener Entomologen aber p. 103. Anm. ſagen: es gehöre zu *Punctaria* L.

Berl. Mag. IV. p. 514. no. 19. Ph. *Vibicaria*, das *rothe Band.*

Schmuziggelb, mit einer ſchmalen rothen Binde durch alle vier Flügel; die Hinterflügel mit einer kleinen Spitze.

Naturf. XI. p. 68. no. 19. Ph. *Vibicaria* iſt *Linn. Amataria.* (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen*, Larvae *Raniformes.*

Chenilles Arpenteuſes en bâton raboteux.

Zackenflüglichte Spanner; Ph. G. *Angulatae.* No. 9. *Ampferſpannerraupe* (Rumicis acuti et acetoſae); *Ampferſpanner*, Ph. G. *Amataria.*

Fabric. S. E. p. 621. no. 7. *Phalaena amataria.* Nom. *Linn.*

Müller Faun. Fridr. p. 47. no. 414. Ph. *Amataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1433. Ph. *Amataria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 128. no. 37.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis patentibus angulatis cinereis, faſcia duplici transverſa, punctoque obſcuriore, atomis cineraſcentibus.

L' *Anguleuſe.*

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

Scop. Entom. carn. p. 214. no. 528. Ph. *Amataria.*

Long. lin. 7. *Lat.* 4.

Per alas expanſas omnes utrinque ab apice primoris unius ad apicem alterius ſociae decurrunt ſtrigae duae obſcuriores; quarum poſtica tenuior et repanda extremitates ſuas adnectit apicibus alarum anticarum, ſeu extremitatibus ſtrigae ſuperioris.

Ama-

Amataria *Linn.* ſolo colore a noſtra differt; illa enim *albida* apicibus alarum margine rufis; noſtra vero *Zinziberis* colore, ſtriga ſuperiore ferruginea, altera fuſca.

202. *Falcataria*, der *Sichelflügel.*

Müller l. c. p. 705. no. 202. der *Sichelflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 753. Ph. *Falcataria*, der *Sichelmeſſer.*

Kleem. Beytr. I. p. 177. t. 21. die kleine zimmetbraune mit einem hochfleiſchfarbenen Flecken gezierte, und mit einer beſondern Rücken- auch Schwanzſpitze verſehene *Raupe*, ohne Nachſchieberfüſse. (Seltſame *Puppe* f. 4. 5.)

— Raupenkal. p. 94. no. 273. Ph. *Falcataria*, der *Sichelflügel.*

Berl. Mag. IV. p. 514. no. 20. Ph. *Falcataria*, der *Kukuk.*

Okerbraun, mit vielen blaſsgrünen ausgekappten Queerſtreifen; die Spitzen der Oberflügel ſichelförmig.

— — p. 623. I. die Raupe eben ſo beſchrieben, als die *Kühnſche.*

Gleditſch Forſtw. I. p. 556. no. 9. Ph. *Falcataria*, der *Kukuk.*

Gladbachs Schmetterl. p. 53. t. 23. f. 5. 6. der *S Vogel.*

Wien. Schmett. p. 64. T. *Spitzraupen*, Larvae *Cuſpidatae.*

Chenilles à queue ſimple. Réaum.

Spannerförmige Spinner; Ph. *Bombyces Geometriformes.*

No. 2. *Weißbirkenſpinnerraupe* (Betulae albae); *Weißbirkenſpinner*, Ph. *Falcula*, G. *Falcataria* L.

Naturf.

Naturf. IX. p. 96. t. 1. f. 6. von der seltenen Puppe einer Birkenraupe (*Mas*). (D. *Kühn.*)

Schaeff. Icon. t. 64. f. 1. 2.

Fabric. S. E. p. 621. n. 8. *Phalaena Falcataria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 415. Ph. *Falcataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1434. Ph. *Falcataria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. I. Mém. 10. p. 333. t. 24. f. 1-7. (*Foemina.*)

Chenille à quatorze jambes, verte, à six tubercules coniques et charnus sur le dos, dont le dessus du corps est d'un brun tirant sur le pourpre, et dont le postérieur, qui est dépourvu de jambes, se termine en pointe conique — sur l'*Aune.*

— — p. 695. t. 24. f. 7.

Phalene à antennes à barbes et à trompe, dont les ailes supérieures, qui sont brunes et traversées d'une raye obscure, sont courbées en crochet vers l'angle extérieur.

— Tom. II. P. I. p. 353. no. 7. t. 6. f. 1. Phal. *Faucille.* (*Mas.*)

Phalene à antennes barbues à trompe, à ailes horizontales d'un blancheâtre feuille-morte rayées de brun, avec une ligne oblique et une tache brune, et dont l'angle extérieur est courbé en crochet.

— *Ueberf.* I. 2 Qu. p. 91. t. 24. f. 1-7.

Die grüne vierzehnfüssige *Erlenraupe*, mit sechs kegelförmigen, fleischichten Rückenbuckeln, die obenauf braun und purpurfarbig ist, am Schwanze aber keine Füsse, sondern nur eine konische Spitze hat.

Degeer

Degeer Ueberſ. 4 Qu. p. 118. t. 24. f. 7.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern und Saugrüſſel, deſſen Oberflügel braun ſind, eine dunkle Queerſtreife haben, und am Aufsenwinkel hakenförmig gebogen ſind.

— — II Th. I B. p. 257. no. 7. t. 6. f. 1. die *Sichelphalene.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und horizontalen, weiſslich fahlbraunen, braungeſtreiften Flügeln, mit einer ſchrägen Linie und braunen Flecken, deren Aufsenwinkel hakenförmig gekrümmt iſt.

203. *Sambucaria*, der *Spitzſchwanz.*

Müller l. c. p. 705. no. 203. die *Schwanzecke.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 754. Ph. *Sambucaria*, der *Schwanzmeſſer.*

Bey uns etwas *ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 512. no. 14. Ph. *Sambucaria*, der *Spitzſchwanz.*

Blaſsgelb, mit kleinen halbolivenfarbenen Stralen und zwo Queerſtreifen durch die Ober- und einem durch die Unterflügel.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 17. no. 26. Ph. *Sambucaria*, der *Spitzſchwanz.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 25. t. 6. die groſſe, braune und dunkelgeſtreifte *Spannenraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 949. no. 1. Ph. *Sambucaria*, die *gelbliche Fliedermotte.*

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen.*

No. 1. *Holunderſpannerraupe* (Sambuci nigrae); *Holunderſpanner*, Ph. *Sambucaria.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 16. der *Holunderſpanner.*

Ono-

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 413. Ph. *Sambucaria*, der *Holdervogel.*

Liſt. Goed. p. 26. no. 10. f. 10. et p. 33. Eruca *Extenſor*, ſeu *Grallator.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 177. no. 1.

Phalaena media ochroleucos, alis ampliſſimis; *exterioribus* duabus lineis transverſis e fulvo virentibus; *interioribus* una diviſis.

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 203. Ph. *Sambucaria.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 63. f. 8.

Fabric. S. E. p. 621. no. 10. *Phalaena Sambucaria.* Nom. *Linn.*

Larva ſubnodoſa, pulla, fuſco-lineata.

Pupa fuſiformis, brunnea, fuſco-punctata.

Ova coſtata.

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 3. t. 1.

De *Vlier-Vlinder.*

Geoffr. Inſ. II. p. 138. no. 58.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus *ſulphureis*, linea duplici transverſa obſcuriore, inferioribus caudatis.

La *Souffrée à queue.*

Long. 10. lign.

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1435. Ph. *Sambucaria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 447. no. 3. *Phalene ſouffrée à queue.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues d'un jaune paille avec deux lignes transverſes d'un jaune foncé, dont les inférieures ſont angulaires à deux points bruns.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 327. no. 3. die *ſchwefelgelbe Schwanzphaläne.*

Die

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und ſtrohgelben breiten Flügeln, mit zwo dunkelgelben Queerlinien, deren Unterflügel eckigt ſind, und zween braune Punkte haben.

204. *Lacertinaria*, der *Eidexſchwanz.*

Müller l. c. p. 706. no. 204. der *Eidexſchwanz.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 755. Ph. *Lacertinaria*, der *Eidexmeſſer.*

Auf Birken nicht ſelten.

Berl. Mag. IV. p. 510. no. 9. Ph. *Lacertinaria*, die *Zahnmotte.*

Schmuziggelb; die Oberflügel mit zwo braunen Queerſtreifen und ausgezackt.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 30. Ph. *Lacertinaria*, die *Zahnmotte.*

Wien. Schmett. p. 64. T. *ſpannerförmige Spinner.* No. 5. *Hangelbirkenſpinnerraupe* (Betulae albae *Virgis pendulis*); *Hangelbirkenſpinner*, Ph. Bomb. *Lacertula*, G. *Lacertinaria* L.

Sulzers Geſch. p. 161. t. 22. f. 10. Ph. *Lacertinaria*, der *Eidexſchwanz.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 204. Ph. *Lacertinaria.*

Schaeff. Icon. t. 66. f. 2. 3.

Fabric. S. E. p. 622. no. 11. *Phalaena Lacertinaria.*

Pectinicornis; alis eroſis, luteſcentibus, ſtrigis duabus fuſcis.

Larva nuda, rubra, dorſo angulato.

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 418. Ph. *Lacertinaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1438. Ph. *Lacertinaria.* Nom. *Linn.*

De-

Degeer Inſ. I. Mém. 10. t. 10. f. 5. 8.

Chenille à quatorze jambes, brune avec des nuances et des taches obſcures, dont le poſtérieur, qui manque de jambes, ſe termine en pointe ſimple, et qui vit ſur le Bouleau.

— — p. 695. t. 10. f. 7. 8.

Phalene à antennes à barbes et à trompe; d'un brun clair jaunâtre, dont les ailes ſupérieures, qui ont deux lignes transverſales brunes, ſont courbées en crochet vers l'angle extérieur.

— II. Part. I. p. 335. no. 3. t. 5. f. 6. la *Chenille* — Phalene *Lacertine.*

Phalene à antennes barbues, à trompe; à corcelet uni; à ailes découpées voutées d'un jaune griſeatre avec deux lignes transverſes brunes et un point brun obſcur.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 94. t. 10. f. 5. 8.

Die braune vierzehnfüſsige Birkenraupe, mit ſchwarzen Flecken und Schattirungen, die keine Hinterfüſse, ſondern nur eine einfache Schwanzſpitze hat.

— — 4 Qu. p. 117. t. 10. f. 7. 8.

Ein brauner hellgelblicher *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, und einem Saugrüſſel, deſſen Oberflügel zwo braune Queerlinien haben, und gegen den äuſſerlichen Winkel wie Häkchen gebogen ſind.

— II Th. 1 B. p. 242. no. 3. die *Eidexenmotte.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, glattem Bruſtſchilde, und gelbgraulichen gezackten, gewölbten Flügeln, mit zwo braunen Queerlinien, und einem dunkelbraunen Punkt.

205. *Alniaria*, der *Erlenſpanner.*

Müller l. c. p. 706. no. 205. der *Nageflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 756. Ph. *Alniaria*, der *Franſemeſſer.*

Bey uns *ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 27. Ph. *Alniaria*, das *Brett.*

Okergelb, mit braunen Flecken geſprenkelt, die Flügel ſtark ausgezackt.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 102. no. 290. p. 111. no. 313. Ph. *Alniaria*, der *Nageflügel.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 1. t. 1. die ſchlanke ſchwarzbraune *Spannenraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 557. no. 10. II. p. 751. no. 68. Ph. *Alniaria;* das *Brett;* das *Brettſpiel.*

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen.* no. 2. *Erlenſpannerraupe* (Betulae Alni); *Erlenſpanner*, Ph. *Alniaria.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 154. no. 370. Ph. *Alniaria*, der *Nageflügel.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 148. no. 25. Phalena *de l' Aune.*

Fabr. S. E. p. 622. no. 12. *Phalaena Alniaria.* Nom. *Linn.*

Larva griſeo-fuſca, luteo-punctata; verrucis dorſalibus tribus remotis; caudalibus quatuor approximatis.

Pupa coeruleſcens, poſtice attenuata.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 419. Ph. *Alniaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 125. no. 1439. Ph. *Alniaria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. p. 349. Mém. XI. t. 10. f. 9 - 14.

Grande *Chenille arpenteuſe* en baton à dix jambes, dont la tête eſt égale et unie, et qui mange les feuilles du Bouleau.

Degeer Inſ. Tom. I. p. 696. t. 10. f. 13. 14.

Phalene à antennes à barbes, ſans trompe; à corcelet jaune-citron, et à ailes découpées d'un jaune d'ocre clair.

— Tom. II. Part. I. p. 305. no. 4.

Phalene *branche ſeche.*

Phalene à antennes barbues ſans trompe; à ailes presque horizontales découpées d'un jaune d'ocre clair avec deux lignes obliques brunes, à corcelet jaune-citron.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. 11te Abh. p. 102. t. 10. f. 9-14.

Der groſse zehnfüſsige *Stockſpanner* auf den Birken, mit einigen Hökern und ganz glattem Kopfe.

— — 4 Qu. p. 118. t. 10. f. 13-14.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, einem zitrongelben Halskragen, und hellokergelben ausgezackten Flügeln.

— II Th. I B. no. 4. der *dürre Aſt.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, mit hellokergelben gezähnelten, mit zwo braunen Queerſtreifen verſehenen, beynahe horizontalſtehenden Flügeln, und einem zitrongelben Halskragen.

206. *Syringaria*, der *Fliedermeſſer.*

Müller l. c. p. 706. no. 206. der *Fliedermeſſer.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 757. Ph. *Syringaria*, der *Gemſemeſſer.*

Auf

Auf der Lonicera und dem Liguſtro *nicht ſelten.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 36. t. 10. die dicke beſonders ſchöne Spannenraupe, mit zwey den Gemſenhörnern ähnlichen Haken, und andern auf dem Rücken ſtehenden Zapfen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 36. no. 94. Ph. *Syringaria*, der *Fliedermeſſer.*

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen.*

No. 8. *Fliederſpannerraupe* (Syringae vulgaris); *Fliederſpanner*, Ph. *Syringaria.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 17. t. 9. f. 9. 10. 11. der *Fliedermeſſer.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 413. Ph. *Syringaria*, der *Syringenvogel.*

Fabric. S. E. p. 622. no. 13. *Phalaena Syringaria.* Nom. *Linn.*

Larva glauca luteoque varia, dorſo aculeis ſex, poſticis longioribus recurvis.

Pupa folliculata, farcta, antice griſea, poſtice brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 125. no. 32.

Phalaena pectinicornis, alis margine ſinuatis, fulvo-nigro-fuſco-roſeoque marmoratis, ſingulis ſubtus puncto nigro, ſuperioribus extremo dilatato, recurvis.

La *Phalene jaſpée.*

Long. 9. lign.

207. *Dolabraria*, der *Hobelſpanner.*

Müller l. c. p. 706. no. 207. der *Eichenmeſſer.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 758. Phal. *Dolabraria.*

Bey uns *ſehr ſelten* auf *Birken.*

Berl. Mag. IV. p. 516. no. 22. Ph. *Vſtulataria*, der *Brandvogel.*

Weiſslichgelb, mit vielen gelbbraunen Strichlein; die Spitzen der Oberflügel wie ausgebrannt.

Naturforſch. XI. p. 69. no. 22. Ph. *Vſtulataria* iſt *Dolabraria* L. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 104. F. *Aeſteraupen.*

No. 16. *Wintereichenſpannerraupe* (Quercus Roboris); *Wintereichenſpanner*, Phal. *Dolabraria.*

Sulzers Geſch. p. 161. t. 22. f. 9. Ph. *Dolabraria*, der *Birkenmeſſer.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 17. *Phalaena Dolabraria.*

Pectinicornis, alis angulatis, flavis, ſtrigis ferrugineis; angulo ani violaceo.

208. *Prunaria*, der *braune Mondſpanner.*

Müller l. c. p. 707. no. 208. der *Schlehedornmeſſer.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 759. Ph. *Prunaria.*

In den Wäldern *nicht ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 26. Ph. *Fulvularia*, der *geſtreifte Tiger.*

Oraniengelb, mit unzählichen blaſsgrauen Strichlein beſäet.

Naturf. XI. p. 70. no. 26. Ph. *Fulvularia* iſt L. *Prunaria* (v. *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtw. II. p. 753. no. 73. Ph. *Fulvularia*, der *geſtreifte Tiger.*

— — p. 821. no. 15. Phal. *Prunaria*, die *Schlehedornmotte.*

Wien. Schmett. p. 104. F. *Aeſteraupen.*

No. 17. *Pflaumenſpannerraupe* (Pruni domeſticae); *Pflaumenſpanner*, Ph. *Prunaria*, et p. 105. *Anm. Wien.*

Wien. Schmett. p. 152. wo gezeigt wird, daſs es die *Prunaria* L. ſey.

Schaeff. Icon. t. 17. f. 2. 3. *Männchen* und *Weibchen.*

Scop. Entom. carn. p. 216. no. 533. Ph. *Corticalis.* *Long.* lin. $10\frac{1}{2}$. *Lat.* $6\frac{1}{2}$.

Alae oſſeae; lineolis transverſis parvis numeroſis ferrugineis; linea craſſiore utrinque pariter ferruginea, in ſingulis alis.

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 126. Ph. *Corticalis.* Varietas Hungarica flava, lineolis fuſcis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 421. Ph. *Prunaria,* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1440. Phal. *Prunaria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 624. no. 21. *Phalaena Prunaria.* Nom. *Linn.*

Larva ferruginea, dorſo antice poſticeque ſpinis duabus.

209. *Pennaria*, der *Endpunkt.*

Müller l. c. p. 707. no. 209. der *Rothflügel.*

Wien. Schmett. p. 103. E. *Zweigſchoßraupen;* Larvae *Surculiformes*; *geradſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Rectofaſciatae.*

No. 12. *Hagebüchenſpannerraupe* (Carpini Betuli); *Hagebüchenſpanner,* Ph. *Pennaria.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 420. Phal. *Pennaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1441. Phal. *Pennaria.* Nom. *Linn.*

210. *Piniaria*, der *Fichtenſpanner.* (*Mas.*)

Müller l. c. p. 707. no. 210. die *Bruchlinie.*

*) *Nicht abgebildet.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 760. Phal. *Piniaria.* In den *Wäldern* nicht ſelten.

Berl. Mag. IV. p. 506. no. 2. Phal. *Piniaria*, der *Wildfang.*

Braun, ſo an manchen Orten ins Gelbe fällt; das *Weibchen* fällt mehr ins Gelbbraune, als das Männchen.

— — p. 620. A. Beſtätigung, daſs die gelbbraunen mit ſchwärzlichem Rande die *Weibchen* ſind.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 502. no. 4. Ph. *Piniaria*, der *Wildfang.*

Wien. Schmett. p. 106. G. *Streiferaupen;* Larvae *ſtriatae; ſtaubigte Sqanner*, Ph. G. *Pulverulentae.*

3) Mit nur angefangenen Queerſtrichen, oder zuſammengefloſſenen Punkten am Auſsenrande.

No. 7. *Föhrenſpannerraupe* (Pini Sylveſtris); *Föhrenſpanner*, Ph. *Piniaria.* *)

Gladbachs Schmett. p. 36. t. 17. f. 1-6. der *Fichtenſpanner* mit ſeiner Raupe und Puppe. **)

Naturf. 15 St. p. 67. Beſchr. der *Raupe* (von *Scheven*). Die Larve viel ähnliches mit der Larve der G. *brumatae.*

Alton. Merkur no. 110. bey Dresden an den Tannenwäldern groſsen Schaden gethan. Der Name

*) Dieſe *Spannerart* trägt die Flügel in der Ruhe einigermaſsen erhaben, und ſie ſind *mehr auf der Unter-* als Oberſeite mit *Punkten beſtäubt.* Bey beyden Geſchlechtern iſt die Oberſeite gar zu verſchieden. Daher hat *Linné* bey der Beſchreibung ſein Augenmerk vornämlich auf die *Unterſeite* gerichtet.

**) Ich zweifle faſt nicht, daſs nicht dieſer die G. *Piniaria* L. ſey' da das Weibchen davon auch ganz okerbraun iſt.

me *Proceſſionsraupe* falſch, weil dieſe auf den *Eichen* wohnen.

Fabric. S. E. p. 624. no. 23. *Phalaena Piniaria.*
Pectinicornis, alis fuſcis, flavo-maculatis, ſubtus nebuloſis, faſciis duabus fuſcis.
Larva viridis, ſupra albo—ſubtus flavo-ſtriata.
Pupa folliculata, brunnea.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 30. Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 817. Phal. pectinicornis, ſpirilinguis, alis planiuſculis rotundatis, ſupra fuſcis, antrorſum albis.

Clerk Icon. t. 1. f. 10. Ph. *Piniaria.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1233. p. 325. Phalaena *Piniaria.*
Pectinicornis, alis omnibus fuſcis diſco bimaculato albo; ſubtus nebuloſo-ſubfaſciatis.

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 17. t. 4. f. 8. 9. das ſchwarzbraungelbliche *Männchen;* f. 10. das okergelbe *Weibchen.*
De *Vlinder Anomalus.*

Schaeff. Icon. t. 159. f. 1. 2. (Mas, aber verſtäubt).

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 351. no. 5. t. 5. f. 20.
Phalene panachée à raye blanche.
Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales brunes ou *rouſſâtres* (Foemina); dont les inférieures ſont picquées de points olives en deſſous avec une raye longitudinale blanche.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 255. no. 5. t. 5. f. 20. die *weißgeſtreifte Phaläne mit federbuſchartigen Fühlhörnern.*
Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen braunen, oder *roſtfarbigen* (*Weibchen*) Flügeln, davon die untern auf der Unterſeite eine längſt herun-

terlaufende weiſſe Streife haben, und mit olivenfarbigen Punkten geſprenkelt ſind.

β. Foemina.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. no. 818.

Phalaena pectinicornis, alis planiuſculis rotundatis nebuloſis *luteſcentibus*, inferioribus linea longitudinali alba.

— — ed. 2. no. 1234. p. 325. Phal. *Tiliaria.*

Pectinicornis; alis *luteſcentibus* ſubtus nebuloſo-faſciatis, linea alba interrupta.

Clerk Icon. t. 4. f. 11. Phal. *Tiliaria.*

Réaum. Inſ. II. t. 28. f. 6.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 143. no. 10. Nom. *Linn.* ex F. Su. ed. 1. no. 818.

Antennes en forme *de lance*, dentelées (*Lanceolatae*).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 390. no. 8. Ph. *Tiliaria*, der *Lindenmeſſer.*

II. *Mit kammförmigen Fühlhörnern und runden Flügeln.*

211. *Elinguaria*, der *gelbbandirte Birnſpanner.*

Müller l. c. p. 708. no. 211. der *Kohlſauger.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 761. Ph. *Elinguaria.* Bey uns *ſelten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 35. Phal. *Elinguaria.*

1) Der *Körper* dicker, als bey Spannern gewöhnlich.

2) Die *Raupen* auf Schlehendornen.

3) Verwandeln ſich unter einem veſten Dache von Seide mit untergemengter Erde.

Röſels

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 35. t. 9. die groſſe braunlichgraue *Spannenraupe* mit dem platten Kopfe.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 28. Ph. *Elinguaria*, *der Kohlſauger.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 788. no. 14. Ph. *Elinguaria*, die *gelbe Birnmotte*, *mit der breiten dunkelgelben Binde.*

Wien. Schmett. p. 103. E. no. 11. *Geißblattſpannerraupe* (Lonicerae Caprifolii); *Geißblattſpanner*, Ph. *Elinguaria.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 356. Ph. *Elinguaria.*

Fabric. S. E. p. 628. no. 43. *Phalaena Elinguaria.* Nom. *Linn.*

Larva rugoſa, cinereo-brunneoque variegata.

Pupa folliculata, antice fuſca, poſtice brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 422. Ph. *Elinguaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1442. Phal. *Elinguaria.* Nom. *Linn.*

212. *Melanaria*, der *Schwärzling.*

Müller l. c. p. 708. no. 212. der *Schwärzling.*

Wien. Schmett. p. 115. Anm. Vielleicht nur eine *Abänderung* von *Macularia* L. da bey einigen die *Oberflügel*, gleichſam von der Sonne gebleicht, ganz *weißlich* ausſahen.

Fabric. S. E. p. 625. no. 25. *Phalaena Melanaria.* Nom. *Linn.*

Clerk Icon. t. 4. f. 2.

Knochs Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 11. t. 1. f. 3. Ph. *Melanaria.*

213. *Macularia*, der *Fleckling.* *)

Müller l. c. p. 708. no. 213. der *Fleckling.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 39. no. 762. Ph. *Macularia*, der *Fleckling.*

Nicht selten *nahe bey Wäldern.*

Kleem. Beytr. I. p. 123. t. 14. f. 5.

Der zur 3 Kl. der N. V. gehörige gelb- und schwarzgefleckte *Nachtpapilion.*

Wien. Schmett. p. 115. N. *Zeichenraupen*, Larvae *signatae; halbstreifigte Spanner;* Ph. G. *Subfasciatae.*

No. 13. *Unbekannte Raupe. Goldgelber schwarzfleckigter Spanner*, Ph. G. *Maculata* (*Macularia* L.).

Schaeff. Icon. t. 12. f. 3.

Scop. Ent. carn. p. 224. no. 557. Ph. *Maculata.*

Long. lin. 7. *Lat.* $4\frac{3}{4}$.

Flava; alis omnibus utrinque fusco-maculatis.

In *pratis* non rara.

Fabric. S. E. p. 637. no. 88. *Phalaena Maculata.* Nom. *Linn.*

In *Anglia frequens.*

Antennae mihi omnes *setaceae.*

Geoffr. Inf. II. p. 140. no. 61. Phal. seticornis spirilinguis, alis patentibus flavis, maculis numerosis fuscis.

La *Phalene panthere.*

Long. 5 lign. *Larg.* 1 pouce.

214. *Atomaria*, der *Atomspanner.* **)

Müller l. c. p. 708. no. 214. der *Sprenkling.*

Füeßl.

*) Vielleicht nur eine Abänderung von *Melanaria.*

**) Nicht *Hufnagels* Atomaria: *Berl. Magaz.* IV. p. 510. no. 18. S. *Naturf.* XI. p. 66. no. 12.

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 763. Ph. *Atomaria*, der *Sprenkling*.

Friſch Inſ. XIII. p. 12. no. 6. 1 Pl. t. 5. von dem weiſs- und ſchwarzgewürfelten *Spannenmeſſer* auf den Linden.

Kleem. Beytr. I. p. 285. t. 34. die zur 3ten Kl. der N. V. gehörige groſse bräunlichgraue, mit zarten Linien und Würfelflecken gezierte zehnfüſsige *Spannenraupe*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 68. no. 194. Phal. *Atomaria*.

Gleditſch Forſtw. I. p. 390. no. 7. Ph. *Atomaria*, der *faule Eſel*.

Wien. Schmett. p. 105. G. *ſtaubigte Spanner*.

2) Mit zuſammenſtoſsenden Queerſtrichen.

No. 5. *Flockenkrautſpannerraupe* (Centaureae Scabioſae); *Flockenkrautſpanner*, Ph. G. *Atomaria*.

(Pennata (et Fem.) Iſoſcelata Scop.)

Cathol. A. p. 583. Ph. *Atomaria*, der *braunſtaubige Spannmeſſer*.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 31. Ph. *Atomaria*. Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 840.

Act. Vpſ. 1736. p. 24. no. 48.

Papilio alis planis pallidis angulatis.

Wilke's Engl. Moths and Butterfl. Book I. Chap. 3. Cl. I. 5. a. i. No. 1. p. 35. t. 70.

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 569. Phal. *Pennata* (Mas).

Long. lin. $6\frac{1}{4}$. *Lat.* $4\frac{2}{3}$.

Antennae amplae, deflexae, ubique pectinatae, pectinibus piloſis; alae pallide ferrugineae; faſciis obſoletis lineolisque plurimis confluentibus nebuloſae.

Scop.

Scop. Ent. carn. p. 225. no. 558. Phal. *Iſoſcelata.* (*Foemina.*)

Long. lin. 6. lat. $3\frac{1}{2}$.

Alae ſupra albae, faſciis 4 lineolisque parvis transverſis fuſcis, ſubtus flaveſcentes.

Fabric. S. E. p. 625. no. 26. *Phalaena Atomaria.* Nom. *Linn.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 48. no. 426. Ph. *Atomaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1443. Ph. *Atomaria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 133. no. 50.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus flaveſcentibus, faſciis plurimis transverſis, nonnullis connexis, atomisque fuſcis.

La *Rayure jaune picotée.*

Long. 5 lign.

Bibl. reg. Pariſ. p. 26. f. 9. 10. 11.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 344. no. 2. t. 5. f. 14. *Phalene jaune à atomes gris.*

Phalene à antennes barbues, à trompe; à ailes dentelées horizontales d'un jaune couleur d'orange, toutes parſemées de traits et de petites lignes transverſes d'un gris agathe.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 250. no. 2. t. 5. f. 14. die *gelbe Phaläne mit grauen Atomen.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, gezähnelten horizontalen, orangegelben, mit achatgrauen Strichen und kleinen Queerlinien ganz beſäeten Flügeln.

Schaeff. Icon. t. 17. f. 3.

215. *Pulveraria*, der *Staubling.* *)

Müller

*) Nicht *Pulveraria* Hufnag. *Berl. Mag.* IV. p. 518. no. 29. denn dieſe iſt *Defoliaria* L. S. *Naturf.* XI. p. 70. no. 29.

Müller l. c. p. 708. no. 215. der *Staubling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 764. Ph. *Pulveraria*, der *Staubling.*

Bey uns etwas *ſelten.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 390. no. 9. Ph. *Pulveraria*, die *Sommerſproſſe.*

Wien. Schmett. p. 105. zu den ſtaubigten Spannern G. 1) mit einem *faſt gleichfarbigten wellenrandigten Queerbande.*

Anm. In dieſer Art *Defoliaria* L. viele *Abänderungen.* Eine davon mag wohl die *Pulveraria* L. ſeyn.

Schriften der Dronth. Geſ. IV. p. 284. no. 43. Ph. *Pulveraria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 627. no. 39. *Phalaena Pulveraria.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1446. Ph. *Pulveraria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 350. no. 3. t. 5. f. 19. *Phalene griſe à bande olive.* *)

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 254. no. 3. t. 5. f. 19. die graue *Phaläne* mit der olivenfarbigen Binde.

216. *Faſciaria*, der *Bandling.*

Müllerí l. c. p. 708. no. 216. der *Bandling.*

Berl. Mag. IV. p. 520. no. 32. Ph. *Neuſtriaria*, der *Fichtenmeſſer.*

Röthlichgrau, mit einer etwas dunklern Binde durch die Oberflügel.

Naturf. XI. p. 71. no. 71. Ph. *Neuſtriaria* iſt Phal. *Faſciaria* L. (v. *Rottemb.*).

Gle-

*) Je ne ſcai pas au juſte, ſi la Ph. G. *Pulveraria* L. eſt de cette eſpece.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 503. no. 5. Ph. *Neuſtriaria*, der *Fichtenmeſſer.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 15. t. 3. die blaſsgrüne *Spannenraupe* auf den Pappeln.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 35. no. 88. Ph. *Faſciaria*, der *Bandling.*

Wien. Schmett. p. 96. A. *Halbeulenraupen*, Larvae *Seminoctuales; doppelſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Biſtriatae.*

No. 2. *Kienbaumſpannerraupe* (Pini Sylveſtris); *Kienbaumſpanner*, Ph. *Faſciaria.**)

Scop. Ent. carn. p. 216. no. 534. Ph. *Cervinalis.* **)
Long. lin. 10. *Lat.* 6½.

Alae *cervinae;* anticae faſciis binis, fuſcis, dentatis, lineaque alba undata ſubmarginali; *poſticae* linea nigra marginali.

Fabric. S. E. p. 628. no. 40. *Phalaena Faſciaria.* Nom. *Linn.*

Faſcia lata ferruginea, margine antico et poſtico albo.

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1444. Ph. *Faſciaria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 160. no. 100.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis ſubdeflexis, exterioribus caeſio-purpureis, faſciis trans-

*) Anm. Dieſer Spanner ändert an Farben ſehr merklich ab, bald grünlicht, bald matt- und blaſsboth, bald iſabell- kupfer- oder zimmetfarbig. Vielleicht eine Spielart von *Proſapiaria* L. n. 222.

**) Den die Wiener Entomologen doch p. 111. als eine beſondere Art betrachten, und mit dem *Geoffroyſchen* Dent de ſcie für einerley halten: L. *Runzelraupen*, Larvae *Rugoſae; mittelſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Mediofaſciatae*, 1) Die Oberflügel braun. No. 1. *Roſenpappelſpannerraupe* (Alceae Roſeae); *Roſenpappelſpanner*, *G. Cervinata* (Cervinalis *Scop.*).

transverſis undulatis, interioribus pallidis, omnibus margine ſerrato.

La *dent de ſcie.*

Long. 8. lign.

Degeer Inſ. II. Part. I. p. 348. no. 2. *Phalene griſe à bandes.*

Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales d'un gris cendré avec deux larges bandes brunes découpées transverſes bordées de blanc, et une ligne blanche en Ziczac.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 252. no. 2. die *graue Bandphaläne.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauen horizontal ſtehenden Flügeln, mit zwo breiten braunen gezackten, weiſsgerändelten Queerſtreifen, und einer weiſſen zickzackichten Linie.

217. *Betularia*, der *Birkenſpanner.*

Müller l. c. p. 709. no. 217. der *Weißling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 765. Ph. *Betularia*, der *Chineſe.*

Nicht ſelten auf *Pappeln*, *Weiden* und *Hanf.*

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 30. Phal. *Betularia*, der *Birkvogel.*

Ganz weiſs, mit ſchwarzen Punkten und Flecken beſäet.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 359. no. 3. Ph. *Betularia*, der *Birkenmeſſer.* p. 550. no. 9. Ph. *Betularia*, der *weiſſe Birkvogel.*

Kleem. Beytr. I. p. 329. t. 39. f. 1-7. die zur N. V. 3 Kl. gehörige, bald braun, bald grau, oder auch gelblich grüne, groſse, glatte, aſtförmige

Span-

Spannenraupe mit einem gespaltenen dreyeckigen braungelben Kopfe und zehn Füßen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 85. no. 246. et no. 268. — große glatte astförmige *Spannenraupe.* (K. B. t. 39. f. 1 - 7.)

Sulzers Gesch. p. 161. t. 23. f. 1. Ph. *Marmorata*, der *Marmormesser.* *)

Der Oberflügel führt drey weiße und zwey braune Bänder, schwarz punktirt und gestreift. Das Männchen hat gekämmte Fühlhörner.

Wien. Schmett. p. 99. C. *Rinderaupen*, Larvae *Corticinae; spinnerförmige Spanner*, Ph. G. *Bombyciformes.*

1) *Große Spanner;* Männchen und Weibchen geflügelt.

No. 2. *Birkenspannerraupe* (Betulae albae); *Birkenspanner*, Ph. *Betularia.*

Abhandl. der königl. schwed. Akad. der Wiss. Uebers. 17 Th. p. 212. t. 6. f. 2. 3. (Carl *Klerk* Beschr. e. *Nachtvogels.*)

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 18. der *Birkenspanner.*

Albin Ins. t. 40. 41. 91. *Raupe* und *Spanner.* **)

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 41. Phal. *Betularia.* Nom. *Linn.* ex ed. 1. Faun. Suec. no. 850.

Bekm.

*) Hr. *Sulzer* macht daraus eine eigene Art. Sein Exemplar ist in der Zeichnung dunkler als das kleemannische: beyde aber haben den deutlichen Linn. Karakter: *Thorace fascia atra.*

**) Auf allen 3 Tafeln des *Albins* einerley Art, nämlich diese *Betularia* L. Sie nimmt auf verschiedenen Bäumen verschiedene Gestalten an. Daher hat sie *Albin* für 3 besondere Arten gehalten. Und eben dies hat vermuthlich Hr. *Sulzern* bewogen, seine und die *kleemannische* Marmoratam für eine verschiedene Art anzusehen. *S. Wien. Schmett.* p. 99. Anm. *)

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 217. Phal. *Betularia.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 88. f. 4. 5.

Fabric. S. E. p. 628. no. 41. *Phalaena Betularia.* Nom. *Linn.*

Réaum. Inſ. Tom. II. t. 27. f. 15.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 423. Ph. *Betularia.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1445. Ph. *Betularia.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. p. 344. t. 17. f. 19-22. *Grande Chenille arpenteuſe en bâton*, à dix jambes, brune, dont la tête eſt refendue profondement, et qui vit ſur l'Orme.

— — p. 699. t. 17. f. 22.

Phalene à antennes en filets et à courte trompe; blanche, avec une infinité de points, de petites taches et rayes noires.

— Tom. II. Part. I. p. 344. no. 1. t. 5. f. 18. *Phalene blanche, tachetée de noir.* (*Mas.*)

Phalene à antennes barbues à trompe; à ailes horizontales blanches avec un grand nombre de taches, de points, et de mouchetures noires; à corcelet à raye noire.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 98. t. 17. f. 19-22. der groſse, braune, zehnfüſsige *Stockſpanner* mit tief geſpaltenem Kopfe auf den Rüſtern.

— — 4 Qu. p. 122. t. 17. f. 22.

Ein weiſſer *Nachtvogel* mit unzählichen ſchwarzen Punkten, kleinen Streifen und Flecken, mit fadenförmigen Fühlhörnern, und kurzem Saugrüſſel.

— II Th. I B. p. 250. no. 1. t. 5. f. 18. die *weiſſe ſchwarzgefleckte Phaläne.* (*Männchen.*)

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, horizontalen, weiſſen, ſchwarzgefleckten, punktirten, geſprenkelten Flügeln, und *ſchwarzgeſtreiftem Bruſtſchilde.*

218. *Pantaria*, die *portugieſiſche Fleckſtreife.* *)

Müller l. c. p. 709. no. 218. der *Panterling.*
Wien. Schmett. p. 115. N. *Zeichenraupen.*
3) Mit faſt zerſtreuten Fleckchen **).
No. 12. *Unbekannte Raupe. Weiſſer düſterngefleckichter Spanner*, G. *Pantaria.* (Sylvata *Scop.*)
Scop. Ent. carn. p. 220. no. 546. Ph. *Sylvata.*
Long. lin. $8\frac{1}{2}$. *Lat.* 5.

Alba; alis *anticis* maculis fuſcis ſubelatis, baſi tamen et prope angulum poſticum macula maiore obſcuriore et colore ferrugineo inquinata; abdomine paleaceo, punctorum nigrorum ſeriebus 7.

In ſylvis *faginis*, umbroſis.

219. *Wauaria*, das *lateiniſche V.*

Müller l. c. p. 709. no. 219. der *W-ling.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 767. Ph. *Wauaria.*
Ziemlich gemein auf den *Johannis-* und *Krauſelbeerſtauden.*
Berl. Mag. IV. p. 508. no. 5. Ph. *Vauaria*, das *lateiniſche V.*

Hellmauſefarbig, mit einigen braunen Flecken, darunter einer ein V vorſtellet.

Röſels

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Linné* fragt hiebey: An femina huius *aptera*? die Wiener Entomologen antworten p. 115. Anm. *) *Nein.* Oder das *Männchen* kann keine *gekämmte* Fühlhörner haben, und die Art müſste alsdann *Pantherata* heiſsen. Die Fühlhörner unſerer Stücke ſind nur *borſtenförmig.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 17. t. 4. die bräunlich grüne gelbgeſtreifte und ſchwarzpunktirte *Spannenraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 35. no. 90. Phal. *Wauaria*, das *lateiniſche W.*

Friſch Inſ. III. p. 15. no. 6. 2 Pl. t. 3. f. 1-3. der grüngelbe und ſchwarz beſprengte *Spannenmeſſer.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 1012. no. 5. Ph. *Wauaria*, des *grünen Spannenmeſſers mauſegraue und ſchwarzbandige Motte.*

Das *lateiniſche W.*

Wien. Schmett. p. 106. G. No. 12. *Johannisbeerſpannerraupe* (Ribes rubri); *Johannisbeerſpanner*, Ph. *Wauaria.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 15. Ph. *Wauaria.*

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 219. Phal. *Wauaria.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 58. f. 1.

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 151. no. 36. *Le double W; Littera* W.

Liſt. Goed. f. 12. *Somnolentus.*

Act. Vpſal. 1736. p. 23. no. 44. *Papilio* alis planis albidis, faſciis linearibus nigricantibus.

Petiv. Muſ. 3. no. 4. *Phalaena* hortenſis media cinerea, maculis fuſcis notata.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 179. no. 41.

Phalaena minor, alis amplis, e cinereo albicantibus, interdum fuſco-cinereis, 4 in exteriorum margine maculis linearibus e rufo nigricantibus.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1248. Ph. *Wauaria.* Vulgo *W littera.*

Fabric. S. E. p. 626. no. 32. *Phalaena Wauaria.* Nom. *Linn.*

Larva ſubpiloſa, viridis, nigro-punctata, linea dorſali lateribusque flavis.

Pupa nuda, brunnea, acuminata.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 427. Ph. *Wauaria.* Nom. *Linn.*

— p. 49. no. 434. Ph. *Viduaria.*

Pectinicornis, alis pallentibus, ſuperioribus margine inferiori quatuor maculis fuſcis; *poſtico linea arcuata* undulataque albida.

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1447. Ph. *Wauaria* et *Viduaria* F. Fr. no. 434. Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 132. no. 46.

Phalaena pectinicornis, ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, ſuperiorum margine exteriore macula triplici nigro-fuſca.

Le *Damas cendré.*

Long. 4. lign. *Larg.* 8. lign.

220. *Sacraria*, die *barbariſche Blutſtreife.* *)

Müller l. c. p. 709. no. 220. der *Blutling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 768. Ph. *Sacraria.*

Fabric. S. E. p. 628. no. 42. *Phalaena Sacraria.* Nom. *Linn.*

221. *Purpuraria*, der *Purpurſpanner.*

Müller l. c. p. 710. no. 221. der *Purpurling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 769. Ph. *Purpuraria.*

Bey uns etwas *ſelten.* **)

Berlin. Mag. IV. p. 516. no. 25. Phal. *Cruentaria*, das *rothe Band.*

Die

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Füeßl.* hat dabey *Schaeff.* Ic. t. 19. f. 16. angeführt; ſolche iſt aber Pyralis *ſanguinalis* L.

Die Oberflügel grünlichgelb mit *rothen Binden;* die Unterflügel oraniengelb.

Naturf. XI. p. 70. no. 25. Ph. *Cruentaria* iſt L. *Purpuraria* (v. *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtw. I. p. 653. no. 31. Ph. *Purpuraria*, der *kleinſte Spannenmeſſer.*

— II. p. 821. no. 16. Ph. *Purpuraria*, die *gelbgeflügelte Spannenmeſſermotte.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 9. *Wegetrittſpannerraupe* (Polygoni avicularis); *Wegetrittſpanner*, Ph. *Purpuraria.*

— p. 152. wird gezeigt, daſs des *Schaeff.* Icon. t. 19. f. 16. nicht dieſe G. *Purpuraria*, ſondern eher Pyralis *Sanguinalis* L. ſey.

Schaeff. Icon. t. 173. f. 5. 6.

Fabric. S. E. p. 629. no. 45. *Phalaena Purpuraria.* Nom. *Linn.*

Müller Faun. Fridr. p. 49. no. 432. Ph. *Purpuraria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1448. Ph. *Purpuraria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 126. no. 34.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis luteo-rubris, *faſcia duplici transverſa ſanguinea.*

L' *Enſanglantée.*

Long. 6. lign.

Leche nov. Inſ. Spec. p. 32. no. 63.

Phalaena pectinicornis flava, alis *faſciis duabus rubentibus* transverſalibus (*Mas*).

222. *Proſapiaria*, der *Blaurand.* *)

Müller l. c. p. 710. no. 222. der *Stammling.*

*) Vielleicht eine Spielart von G. *Faſciaria* L. S. *Wien. Schmett.* p. 96. Anm. *)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1252.
Alis luteſcentibus; faſcia ſaturatiore vtrinque *ſtriga glauca* diſtincta.

Vddm. Diſſ. 66. *Phalaena* alis primariis dilute cinnamomeis; faſciis duabus linearibus ſubcoeruleis.

Clerk Icon. t. 3. f. 1. Ph. *Proſapiaria.*

Fabric. Mantiſſ. p. 285. no. 26 - 27. *Phalaena Proſapiaria.*
Pectinicornis, alis luteſcentibus, atomis ſtrigisque tribus fuſcis, tertia maculari. — In Europae *Nemoribus.*

223. *Puſaria*, der *kleine Weißling.*

Müller l. c. p. 710. no. 223. der *Kleinling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 770. Ph. *Puſaria.*
In den *Wäldern* nicht ſelten.

Berlin. Mag. IV. p. 510. no. 10. Ph. *Puſaria*, das *braune Band.*
Ganz weiſs, mit drey blaſsbraunen Queerſtreifen.

— p. 621. E. Einige *Abänderungen.*

Naturf. XI. p. 66. no. 10. Ph. *Puſaria.*
Die *Raupe* gelblich grün, mit gelben Einſchnitten in den Gelenken. Ueber den Rücken läuft eine karminrothe unterbrochene Linie.
— Deren *Hufnagel* in der Anm. gedenkt, ſind bloſs eine *Varietät* (v. *Rottemb.*).

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 220. no. 45. t. 17. Ph. *Puſaria.* Auf den ſchneeweiſſen Flügeln zween undeutliche Striche.

Wien. Schmett. p. 107. H. *Stricheraupen*, Larvae *Strigillatae ; wechſelnde Spanner*, Phal. G. *Alternantes.*
2) Mit drey Queerſtrichen.

No. 4. *Weißbirkenſpannerraupe* (Betulae albae); *Weißbirkenſpanner*, Phal. *Puſaria.* (Strigata *Scop.*)

Schaeff. Icon. t. III. f. 7.

Scop. Ent. carn. p. 218. no. 541. Ph. *Strigata.* *Long.* lin. 7. *Lat.* $4\frac{1}{2}$.

Alba; alis *anticis* ſtrigis transverſis tribus; *poſticis* duabus ferrugineis.

Fabric. S. E. p. 625. no. 27. *Phalaena Puſaria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 430. Ph. *Puſaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1449. Ph. *Puſaria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 448. no. 4. t. 8. f. 12. *Phalene blanche à trois lignes griſes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues blanches, traverſées de trois, et les inférieures de deux lignes griſes.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 329. no. 4. t. 8. f. 12. Die *weiſſe Phaläne* mit drey *grauen Linien.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und breiten weiſſen Flügeln, davon die Oberflügel drey, die Unterflügel aber zwo graue Queerlinien haben.

224. *Veſpertaria*, der *portugieſiſche Abendſpanner.* *)

Müller l. c. p. 710. no 224. der *Abendling.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 4. *Unbekannte Raupe; weißgrauer dunkelſtreifiger Spanner*, Phal. *Veſpertaria.*

Fabric. S. E. p. 626. no. 31. *Phalaena Veſpertaria.* Nom. *Linn.*

Habitat in *Germania*, *Anglia.*

*) *Nicht abgebildet.*

225. *Papilionaria*, der *tagfalterartige Spanner.*

Müller l. c. p. 710. no. 225. der *Tagling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 771. Ph. *Papilionaria*, der *Tagmeſſer.*

Nicht ſelten auf *Birken.*

Friſch Inſ. X. p. 20. no. 17. 3 Pl. t. 17. vom braunen *Spannmeſſer* mit den zwey Kopf- und Rückenſpitzen, und ſeinem *grünlichen* Papilion.

Berl. Mag. IV. p. 506. no. 1. Ph. *Praſinaria*, das *grüne Blatt.*

Grasgrün, mit drey ſchmalen gelblich weiſſen unterbrochenen parallellaufenden Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 63. no. 1. Ph. *Praſinaria*, iſt L. *Papilionaria* (v. *Rottemb.*).

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. t. XII. p. 43. die ſchöne grüne breitleibige *Spannenraupe* mit dem beſondern Kopf (Femina).

— IV. p. 134. t. 18. f. 3. Ein ungemein ſchöner celadongrüner *Nachtvogel* der dritten Klaſſe. (Mas.)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 96. Ph. *Papilionaria*, der *Tagling.*

Wien. Schmett. p. 97. B. no. 1. *Buchenſpannerraupe* (Fagi ſylvaticae); *Buchenſpanner*, Ph. *Papilionaria.*

Fiſchers N. G. v. Livl. p. 154. no. 371. Ph. *Papilionaria*, der *Tagling.*

Schäffers Abhandl. von Inſ. III. p. 83. c. tab. adj. f. 1-7. die *Ellernraupe.*

— Icon. t. 17. f. 1.

Fabric. S. E. p. 624. no. 20. *Phalaena Papilionaria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 425. Ph. *Papilionaria.* Nom. *Linn.*

Mül-

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1450. Ph. *Papilionaria.* Nom. *Linn.*

226. *Tripunctaria*, der *aſiatiſche Dreypunkt.*

Müller l. c. p. 710. no. 226. der *Punktling.*
Seligm. ausl. Vögel I. t. 69.
Fabric. S. E. p. 627. no. 35. *Phalaena tripunctaria.*

Pectinicornis, alis fuſcis, *anticis* faſcia maculari, *poſticis* diſco albo.

Faſcia alarum e *maculis quinque* conſtat.

Cramer Pap. exot. II. p. 34. t. 22. Fig. E. Ph. *Tripunctaria.*

227. *Tricinctaria*, der *amerikaniſche Dreygürtel.**)
Müller l. c. p. 711. no. 227. der *Gürtling.*
Muſ. Ludov. Vlricae p. 394. no. 29.

Corpus magnitudo Pap. *Cardamines.*

Antennae pectinatae, fuſcae.

Alae concolores, flavae, at ſupra pallidiores.

Arcus fuſcus ex coſta Primoris ad anum ducit.

Arcus altera a coſta Primorum ducit per medium alae anterioris, ad marginem alae poſticae.

Arcus tertius apicem Alae anterius claudit.

228. *Caffraria*, der *Kafferſpanner.***)
Müller l. c. p. 711. no. 228. der *Kafferling.*
Linn. Muſ. Lud. Vlr. p. 393.

Corpus mediae magnitudinis, albicans, capite ſubflaveſcente.

Antennae albae, bifariam pectinatae, radiis fuſcis.

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*

Alae ſubconcolores, patentes, integerrimae, albidae.

Primores ſupra punctis ocellaribus luteis, centro ferrugineo, *ſeptem* in faſciae formam digeſtae. Praeter haec tria ejusmodi puncta verſus baſin et unum medio.

— *ſubtus* concolores, ſed obſoletiores. Puncta 7 ut ſupra, ſed alia tantum duo, quorum unum in medio, unum ad marginem anticum verſus baſin.

Poſticae ſimiles, ſed puncta 7 obſoleta ſupra, ſubtus evidentiora.

Punctum ferrugineum, lunatum, in medio alae ſubtus, absque annulo luteo.

229. *Iatropharia*, der *amerikaniſche Purgirnuß-ſpanner.*

Müller l. c. p. 711. no. 229. der *Purgierling.*
Cathol. I. p. 46. Ph. *Iatropharia.*
Clerk Icon. t. 55. f. 3.
Merian. Surin. t. 38. f. 1.
Fabric. S. E. p. 627. no. 36. *Phalaena Iatropharia.* Nom. *Linn.*

III. *Mit borſtenförmigen Fühlhörnern und eckigen Flügeln.*

230. *Viridata*, der *grünflüglichte Spanner.**)
Müller l. c. p. 711. no. 230. der *Grünflügel.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 772. Phal. *Viridata*, der *Grünflügel.*
Bey uns nicht ſelten in *Hecken und Gebüſche.*
Wien. Schmett. p. 97. B. no. 7. *Brombeerſpanner-raupe*

*) S. unſere Anmerk. bey Linn. *Vernaria* no. 195.

raupe (Rubi fruticosi); *Brombeerspanner*, Ph. *Viridata.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 19. der *Grünflügel; Brombeerspanner.*

Réaum. Inf. Tom. II. Mém. 9. p. 149. *Arpenteuse de la ronce.*

Albin. Inf. t. 48. f. 80. *Vierhörnigte Raupe* auf *Haselnußblättern.*

Scop. Ent. carn. p. 215. no. 530. Ph. *Viridata.*

Long. lin. $5\frac{1}{4}$. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Alae montano viridi colore tinctae, striga fimbriaque pallidiore, margine crassiore flavescente.

Fabric. S. E. p. 630. no. 54. *Phalaena Viridata.* Nom. *Linn.*

231. *Margaritata*, der *perlflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 712. no. 231. der *Perlflügel.*

Wien. Schmett. p. 95. A. No. 1. *Haynbüchenspannerraupe* (Carpini Betuli); *Haynbüchenspanner*, Ph. *Margaritaria.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 428. Ph. *Margaritaria.*

Subpectinicornis, *alis margaritaceis*, fascia rivulari lutescente, extremitatibus fuscis.

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1452. Ph. *Margaritaria.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1249. Ph. *Margaritaria.*

Geoffr. Inf. II. p. 137. no. 57.

Phalaena feticornis spirilinguis, alis patentibus, sinuatis, pallido-glaucis, fascia transversa obscuriore.

Le *Celadon.*

Long. 9. lign. *Larg.* 21. lign.

Réaum.

Réaum. Inſ. I. t. 39. f. 13. 14.
Chenille à forme de poiſſon.
Raj. Hiſt. Inſ. p. 132. no. 77. *Phalaena* minor alis ex coeruleo viridibus, exterioribus duabus lineis transverſis albicantibus diſtinctis.

232. *Notata*, der *Zeichenflügel.*

Müller l. c. p. 712. no. 232. der *Zeichenflügel.*
Wien. Schmett. p. 104. F. No. 11. *Weidenſpannerraupe* (Salicis Pentandrae etc.); *Weidenſpanner*, Ph. *Notataria* (Notata L.).
Berl. Mag. IV. p. 600. no. 53. Ph. *Exuſtata*, der *Vierling.*
Weiſsgrau, mit 4 braunen Flecken, welche in einem Viereck zuſammenſtehn; die Unterflügel mit einer ſtumpfen Spitze.
Naturf. XI. p. 76. no. 53. Ph. *Exuſtata* iſt Linn. *Notata* (v. *Rottemb.*).
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 34. Ph. *Exuſtata*, der *Vierling.*
Clerk Icon. t. 6. f. 11.

233. *Porata*, der *italiäniſche Punktflügel.**)

Müller l. c. p. 712. no. 233. der *Punktflügel.*
Wien. Schmett. p. 101. D. *Stengelraupen*, Larvae *Pedunculares; zackenſtriemigte Spanner*, Phal. G. *Crenatoſtriatae.*
1) Mit ſtumpfgezähnten Unterflügeln; die Männchen mit ſehr gekämmten Fühlhörnern.
No. 7. *Aeberreißſpannerraupe* (Artemiſiae campeſtris); *Aeberreißſpanner*, Phal. *Selenaria* (*Porata* Linn.).
Fabric. S. E. p. 631. no. 56. *Phalaena Porata.*
Seti-

*) *Nicht abgebildet.*

Seticornis, alis pallidis, rufo-pulverulentis, omnibus puncto ocellari albo. — In *Europa*, *Anglia.*

234. *Repandata*, der *wellenflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 712. no. 234. der *Wellenflügel.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 40. no. 773. Ph. *Repandata*, der *Wellenflügel.*

Nicht selten auf den *Eibenbäumen.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 2. *Weißbüchenspannerraupe* (Carpini betuli); *Weißbüchenspanner*, Ph. *Repandata.*

Hollar Inf. t. 3. f. 2. (*Naturf.* IX. p. 222.) Ph. *Repandata.*

Kleem. Beytr. I. p. 233. t. 18. f. 1. der mit ausgekappten, weifs und grau gemengten, auch mit aus- und eingekappten schwarz- und bräunlichgelb gezeichneten Flügeln gezierte *Spannenpapilion.*

Gleditsch Forstwiff. II. p. 750. no. 62. Ph. *Repandata:* der *aschgraue* braungewässerte *Spannenmesservogel* mit eckigten Flügeln, wovon die untern einen zurückgeschlagenen schwarzen Rand haben.

Clerk Icon. t. 6. f. 8. Ph. *Repandata.*

235. *Dubitata*, das *Räthsel.* *)

Müller l. c. p. 712. no. 235. das *Räthsel.*

Berlin. Mag. IV. p. 610. no. 80. Ph. *Fuliginata*, das *Käuzlein.*

Glänzend grau, mit braunen ausgeschwungenen Queerbinden, die Flügel ausgezackt.

Naturf. XI. p. 84. no. 80. Ph. *Fuliginata* ist Linn. *Dubitata* (v. *Rottemb.*).

Kleem.

*) *Linné* sagt davon: Statura *Geometrae;* Magnitudo *Noctuae;* Facies *Tineae.*

Kleem. Beytr. I. p. 134. t. 28. f. 2. der mit gelblich grauen, ſchwarzbraungezeichneten *Vorder*- und mit aſchfarbig braungrau gezeichneten, nett ausgekappten Hinterflügeln gezierte *Spannenpapilion.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 748. no. 51. Ph. *Fuliginata*, das *Käuzlein.*

Wien. Schmett. p. 109. K. *Sheineulenraupen*, Larvae *Noctuiformes*; *wellenſtriemigte Spanner*, Ph. G. *Undatae.*

1) Die Unterflügel klein ausgezähnt.

No. 3. *Wegedornſpannerraupe* (Rhamni cathar.); *Wegedornſpanner*, Ph. *Dubitata.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 33. Phal. *Dubitata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 842. (ed. 2. no. 1259.)

Clerk Phal. t. 6. f. 2.

236. *Emarginata*, der *Rändelflügel.*

Müller l. c. p. 713. no. 236. der *Rändelflügel.*

Berl. Mag. IV. p. 526. no. 46. Ph. *Eroſata*, die *Zackmotte.*

Okerbraun, mit 4 ſchwarzen Punkten, und 2 feinen Queerſtreifen, die Flügel ausgeſchwungen und gezackt.

Naturf. XI. p. 73. no. 46. Ph. *Eroſata* iſt L. *Emarginata* (von *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtw. I. p. 656. no. 43. Ph. *Eroſata*, die *Zackmotte.*

— II. p. 753. no. 74. Phal. *Emarginata*, die *blaſsgelbe Spannenmeſſermotte, mit 2 hellgrauen Streifen und ausgeſchweiften Flügeln.*

Wien. Schmett. p. 104. F. No. 10. *Unbekannte Raupe. Beinfarbener rothgeſtrichter Spanner*, Ph. *Emarginata.*

Anm.

Anm. Das *Männchen* dieſes *Spanners* hat doch *haarichte* Fühlhörner (Antennae *pubeſcentes* L.).

Fabric. S. E. p. 631. no. 57. *Phalaena emarginata.*

Seticornis, alis ſubemarginatis, pallidis; faſciis duabus griſeis punctoque fuſco.

Clerk Phal. t. 4. f. 12.

IV. *Mit borſtenförmigen Fühlhörnern und runden Flügeln.*

237. *Chaerophyllata*, der *ſchwarzflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 713. no. 237. der *Kerbelfreund.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 774. Ph. *Chaerophyllata*, der *Schwarzflügel.*

Nahe bey den Wäldern auf den Viehweiden nicht ſelten.

Wien. Schmett. p. 116. O. *Spreckenraupen*, Larvae *Punctatae; einfärbigte Spanner*, Ph. G. *Vnicolores.*

No. 1. *Kälberkernſpannerraupe* (Chaerophylli Sylveſtris); *Kälberkernſpanner*, Ph. *Chaerophyllata.*

Gladbachs Schmett. p. 41. t. 19. f. 4. 5. Phal. *Chaerophyllata: Mas* et *Foemina;* der *Mohr mit weiſſen Flügelſpitzen.*

Beſchäftig. der naturforſch. Fr. zu Berlin III. p. 33. t. 1. f. 3. Ph. G. *Chaerophyllata;* der *Mohr mit weiſſen Flügelſpitzen.* (D. *Kühn.*)

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 55. Ph. *Atra.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 864.

Act. Vpſal. 1736. p. 23. no. 25. *Papilio* alis nigris, apicibus albis.

Scop.

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 127. Ph. *Chaerophyllata.*

Alis *anticis* totis nigris, ſoloque apicis margine albo.

In Montibus circa *Schemnitzium* non rara.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1274. Ph. *atrata.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 73. *Phalaena Chaerophyllata.* Nom. *Linn.*

Müllerі Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1457. Ph. *Chaerophyllata.* Nom. *Linn.*

238. *Clathrata*, der *gitterflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 713. no. 238. der *Gitterflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 775. Ph. *Clathrata*, der *Gitterflügel.*

Nicht ſelten in Wäldern im *Graſe.*

Berl. Mag. IV. p. 614. no. 90. Ph. *Clathrata*, das *Gitter.*

Weiſs mit braunen gegitterten Streifen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 748. no. 54. Ph. *Clathrata*, das *gelbe Gitter.*

Wien. Schmett. p. 107. H. *wechſelnde Spanner.*

3) Mit unter einander verflochtenen Nerven und Queerſtrichen.

No. 5. *Unbek. Raupe. Gelblichtweiſſer braunſchwarzgegitterter Spanner*, Ph. *Clathrata.*

Sulzers Geſch. p. 162. t. 23. f. 2. Ph. *Clathrata*, der *Gitterflügel.*

Gelblichweiſſe Flügel, mit drey bis vier Reihen brauner Linien, *gittermäſsig* unordentlich durchzogen.

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 536. Ph. *Retialis.*

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

Alae albae; venis faſciisque 4 murinis *reticulatae.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 634. no. 72. *Phalaena Clathrata.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 135. no. 53.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus fuſcis, utrinque maculis albis quadrangulis teſſellatis.

Les *barreaux. Long.* 5. lign. *Larg.* 11. lign.

239. *Vndulata*, der *Wellenſpanner.*

Müller l. c. p. 713. no. 239. die *Braunwelle.*

Berl. Mag. IV. p. 512. no. 13. Ph. *Undulataria*, die *Wellenmotte.*

Weiſslichgrau, mit vielen dicht an einander liegenden wellenförmigen bräunlichen Queerlinien.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 752. no. 70. Ph. *Vndulata*, die *Werftmotte*, oder *Spannenmeſſer des Werfts.*

Wien. Schmett. p. 109. K.

3) Feine Wellenlinien über alle Flügel.

No. 16. *Saalweidenſpannerraupe* (Salicis Capreae); *Saalweidenſpanner*, Ph. *Vndulata.*

Fabric. S. E. p. 632. no. 59. *Phalaena Vndulata.* Nom. *Linn.*

Müller Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1463. Ph. *Vndulata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 6. f. 3.

240. *Flaveolata*, das *indianiſche Gelbfeld.*

Müller l. c. p. 714. no. 240. das *Gelbfeld.*

Linn. Muſ. Lud. Vlr. p. 396. no. 31.

Corpus quartae ſ. quintae magnitudinis; Capite, Thorace, Lingua, Abdomine flavum, apice abdominis nigro.

Antennae ſetaceae, nigrae.

Pedes flavo - et nigro - varii.

Alae primores utrinque nigrae.

Macula flava, magna, extrorſum crenata, antice ſinu excavata, ad marginem tenuiorem, verſus baſin.

Poſticae utrinque a baſi ultra medium flavae.

Margo diſcum verſus crenatus; reliquum alae verſus marginem exteriorem nigrum.

Nervi alarum apice albeſcunt.

Cramer Pap. exot. I. p. 139. t. 88. Fig. C. Ph. *Flaveolata.*

Seba Theſ. IV. t. 7. f. 7. 8. t. 13. f. 3. 4.

241. *Aeſtuata*, der *indianiſche Kettenſpanner.*

Müller l. c. p. 714. no. 241. t. 22. f. 9. der *Kettenvogel;* der *röthlichbraune weißgefleckte kapenſiſche Nachtvogel.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 98. *Phalaena Aeſtuata.*

Seticornis, cyaneo - nigra, albo - maculata.

Statura P. *Vrticatae*, at paulo maior. Thorax et abdomen cyanea, ſtriis quatuor albis.

Linn. Muſ. Lud. Vlr. p. 397. no. 32. Ph. *Aeſtuata.*

Corpus tertiae magnitudinis, pallidum.

Antennae nigrae.

Pedes pallidi, albo - notati.

Alae omnes concolores utrinque, fuſcae.

— *Primores* utrinque concolores.

Maculae 2 oblongae, fere contiguae, albae ad baſin.

Maculae 6 albae oblongae, obtuſae, coadunatae, in diſco.

Margo linea alba notatus.

— *Poſticae* fuſcae.

Macu-

Macula ex 7 albis, linearibus, obtusis coadunatis, maiorem alae partem a basi versus marginem occupans.

Margo posticus lineola alba.

242. *Grossulariata*, der *gefleckte Tiger.*

Müller l. c. p. 714. no. 242. der *Tintenfleck.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 40. no. 776. Ph. *Grossulariata*, der *Tiger.*

Auf den *Krausel-* und *Johannisbeerstauden* häufig.

— Mag. der Entomol. II. p. 37. Ph. *Grossulariata.* (Chorh. *Meyer.*)

Berl. Mag. IV. p. 602. no. 59. Ph. *Grossulariata*, der *gefleckte Tiger.*

Weiss mit schwarzen Flecken; an einigen Orten safrangelb.

Frisch Inf. III. p. 14. no. 5. 2 Pl. t. 3. vom weissen *Spannmesser* mit schwarzen und gelben Flecken.

Rösels Insektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 9. t. 2. die graulich weisse *Spannenraupe* mit dem gelben Bauche und schwarzen Flecken auf dem Rücken.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 102. no. 291. p. 112. no. 314. Ph. *Grossulariata*, der *Tintenfleck;* der *gefleckte Tiger*, der *Harlekin.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 1012. no. 6. Ph. *Grossulariata*, der *gefleckte Tiger.*

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 221. no. 48. Phal. *Grossulariata;* Dänisch: *Snare-Orm; Schlingenwurm.*

Fischers N. G. von Livl. p. 154. no. 372. Ph. *Grossulariata*, der *Tintenfleck.*

Wien. Schmett. p. 115. N.

3) Mit fast zerstreueten Fleckchen.

No. 11. *Stachelbeerſpannerraupe* (Ribes Groſſulariae); *Stachelbeerſpanner*, Ph. *Groſſulariata.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 16. Ph. *Groſſulariata.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. no. 20. Phal. *Groſſulariata*, der *Tiger.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 374. Ph. *Groſſulariata.*

Seligman ausl. Vögel. Tom. VI. t. 97.

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 242. Ph. *Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 40.

Petiv. Muſ. p. 4. no. 7. *Eruca* geometrica, pulchre variegata, *Groſſularias* depaſcens.

Phalaena hortenſis alba, maculis plurimis nigris inſignita.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 178. no. 14.

Phalaena media, alis amplis albis, maculis crebris nigris et lineis transverſis luteis variis.

— p. 179. *Eruca* maiuſcula groſſula, albo-rubro-nigroque coloribus varia.

— p. 373. no. 1. *Eruca* Geometra Groſſulariam depaſcens.

Schaeff. Icon. t. 67. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 219. no. 544. Ph. *Groſſulariata.*

Long. lin. 9. *Lat.* 6.

Alba; alis fuſco-maculatis, *anticis* ſupra baſi faſciaque flavis.

Fabric. S. E. p. 631. no. 58. *Phalaena Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

Larva Geometra ſubpiloſa, ſupra cinerea, nigro-punctata, ſubtus flava.

Pupa ſubfolliculata, atra: faſciis flavis.

Mülle-

Müllerí Faun. Fridr. p. 49. no. 435. Ph. *Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1458. Phal. *Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 137. no. 56.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, maculis inaequalibus nigris plurimis, faſciaque transverſa lutea.

La *Mouchetée.*

Long. 8. lign. *Larg.* 1½. pouce.

Bibl. Reg. Pariſ. p. 16. f. 2. Ph. *hortenſis.*

243. *Crataegata*, der *Heckenkriecher.*

Müller l. c. p. 714. no. 243. t. 22. f. 10. der *Heckenkriecher.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 777. Ph. *Crataegata*, der *Gelbflügel.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Berl. Mag IV. p. 522. no. 37. Ph. *Luteolata*, die *gefleckte Zitrone.*

Wien. Schmett. p. 104. F. No. 13. *Weißdornſpannerraupe* (Crataegi Oxyac.); *Weißdornſpanner*, Ph. *Crataegata.*

Beſchäft. naturf. Fr. zu Berl. IV. p. 29. t. 2. Ueber den *Weißdornſpanner* nach Hn. *Sepp.* Ph. *Crataegata.* (*Bergſträſſer.*)

Schrift. der Dronth. Geſellſch. III. p. 368. no. 34. Ph. G. *Luteolata.* Nom. *Linn.* (*Ström.*)

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 240. Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 163. f. 2. 3.

Linn. S. N. ed. 10. p. 525. no. 168. Ph. *Luteolata.*

Vddm. Diſſ. 70. *Phalaena* flava, alis patentibus macula tricuſpide fuſca, pupilla alba.

Scop. Ent. carn. p. 224. no. 556. Ph. *Crataegata.*

Long. lin. 9. *Lat.* 5½.

Lutea tota; alis anticis margine superiore maculis ferrugineis 5, antice minoribus, macula ocellari dentata alba; iride fusca, ferrugineae secundae adnata.

Fabr. S. E. p. 633. no. 65. *Phalaena Crataegata.* Nom. *Linn.*

Larva grisea, tuberculo dorsali didymo.

Pupa fusca, folliculo cinereo, ferrugineo-maculato.

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1459. Phal. *Crataegata.* Nom. *Linn.*

Sepp Nederl. Inf. VI. p. 25. t. 6. De *Hagedoorn-Vlinder.*

Geoffr. Inf. II. p. 139. no. 59.

Phalaena seticornis spirilinguis, alis patentibus luteis, duplici punctorum cinereorum ordine, superioribus maculis duabus, et rachi croceo-ferrugineis.

La *Citronelle rouillée.*

Long. 7. lign. *Larg.* 15. lign.

244. *Populata*, der *Pappelnspanner.*

Müller l. c. p. 715. no. 244. die *Sudelspitze.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 40. no. 778. Ph. *Populata.* Auf den *Pappelbäumen etwas selten.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 684. no. 8. Ph. *Populata*, der *Spannenmesser der Aspen.*

Wien. Schmett. p. 113. M. *Schuppenraupen*, Larvae *Squamosae; eckestreifige Spanner*, Ph. G. *Angulato-fasciatae.*

2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.

No. 17. *Aespenraupenspannerraupe* (Populi Tremulae etc.); *Aespenspanner*, Phalaena *Populata.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 632. no. 60. Phal. *Populata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 5. f. 14. 15.

245. *Bilineata*, die *Doppellinie.*

Müller l. c. p. 715. no. 245. t. 22. f. 11. die *Ziegelwelle.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 779. Ph. *Bilineata*, die *güldene Kette.*

Ziemlich gemein in *Wäldern* im *Graſe.*

Berl. Mag. IV. p. 600. no. 55. Ph. *Bilineata*, die *güldne Kette.*

Pomeranzengelb, mit verſchiedenen weiſſen und braunen ſchmalen ſchlangenförmigen Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 77. no. 55. Ph. *Bilineata.* Die *Raupe* auf dem Rücken weiſsgrau, an den Seiten und am Bauche aber gelblichweiſs; zu Ende des Aprils im Graſe. (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtw. II. p. 753. no. 75. Ph. *Bilineata;* die gelbe *Spannenmeſſermotte* mit einer zurückgeſchlagenen Binde, und ſchwarz und weiſſen Saume.

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 284. no. 44. Ph. *Bilineata.* Nom. *Linn.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 17. *Wiederſtoßſpannerraupe* (Lychnidis dioicae); *Wiederſtoßſpanner*, Ph. *Bilineata.*

Anm. Nur bey wenigen Stücken dieſer Art verbreiten ſich zwo ſchwarze Queerlinien auf den Oberflügeln einigermaſſen in ein Queerband. (Faſcia L.)

Schaeff. Icon. t. 12. f. 4.

Scop. Ent. carn. p. 227. no. 566. Ph. *Bilineata.*

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

Alae utrinque ſulphureo-ochreaceae; anticae ſupra lineis binis repando-dentatis fuſcis albisque; omnibus ſubtus limbo fuſceſcente.

Müllеri Faun. Fridr. p. 50. no. 445. Ph. *Bilineata*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 127. no. 1467. Phal. *Bilineata*. Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 75. *Phalaena bilineata.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 143. no. 68.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus luteis, lineolis fuſcis et albidis vndulatis, limbo dentato.

La *Brocatelle d'or.*

Long. 4. lign. *Larg.* 10 lign.

246. *Chenopodiata*, der *Gänſefußſpanner.*

Müller l. c. p. 715. no. 246. der *Hochpunkt.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 780. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor.*

Bey uns *etwas ſelten;* in Bündten.

Friſch Inſ. V. p. 35. no. 14. 2 Pl. t. 14. von dem *grünen Ausſpanner* mit drey weiſſen Linien auf jeder Seite. *)

Berlin. Mag. IV. 602. no. 58. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor.* *Hellblaſsgelb* mit Ockerbraun ſchattirt.

Kleem. Beytr. I. p. 313. t. 37.

Die zur 3ten Klaſſe der *Nachtvögel* gehörige glatte mit eckigen Abſätzen und Zeichnungen begabte zehnfüſsige Spannenraupe.

Naturforſch. XI. p. 77. Ph. *Chenopodiata* iſt die *Kleemanniſche.*

1) Die

*) Dieſes Zitatum ſtehet nach *Linné* bey ſeiner *Prunata* no. 250; es gehöret aber eigentlich hierher. S. *Naturf.* XI. p. 77.

1) Dieſe gleichet einigermaſsen der Ph. *Prunata* L. no. 250. weil Kl. ſeine Figuren nach ſehr dunklen Exemplaren entworfen; die meiſten Stücke der *Chenop.* aber weit heller ausfallen.

2) Die Zeichnungen der Prunata weit dunkler als ſelbſt bey den dunkelſten Exemplaren der Chenop. auch hat die Prunata *nichts gelbliches* wie jene. (v. *Rottemb.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 84. no. 244. p. 92. no. 266. Ph. *Chenopodiata.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 1013. no. 7. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor.*

Wien. Schmett. p. 112. M.

1) Mit einer Ecke des Queerbandes.

No. 2. *Gänſefuſsſpannerraupe* (Chenopodii viridis); *Gänſefuſsſpanner*, Ph. *Chenopodiata* — und p. 153. daſs die *Schaeff.* Icon. t. 76. f. f. 4. 5. nicht *Chenopodiata*, ſondern ihre *Menſuraria* ſey p. 111. no. 2.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 47. Phal. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 856.

Act. Vpſ. 1736. p. 24. no. 47.

Papilio alis planis griſeis, faſcia pallida.

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 436. Ph. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 127. no. 1460. Phal. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 636. no. 83. *Phalaena Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

247. *Comitata*, der *Braunpunkt.*

Müller l. c. p. 715. no. 247. der *Geſellt.*

Wien. Schmett. p. 112. M.

1) Mit einer Ecke des Queerbandes.

No. 3. *Unbekannte Raupe. Blaſsockergelber bräunlichtſtreifiger Spanner*, Ph. *Comitata.*

— Der *Chenopod.* ſehr ähnlich p. 108. (*)

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 437. Ph. *Comitata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1461. Ph. *Comitata.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 51. f. 10.

Fabric. S. E. p. 632. no. 61. *Phalaena Comitata.* Nom. *Linn.*

248. *Plagiata*, der *breitbandirte Spanner.*

Müller l. c. p. 715. no. 248. das *Breitband.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 781. Phal. *Plagiata* Bey uns *nicht ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 522. no. 38. Ph. *Plagiata*, das *doppelte Band.*

Der Grund weiſsgrau, mit einigen braunen Queerſtreifen, die theils heller, theils dunkler ſind.

Wien. Schmett. p. 111. L. *Runzelraupen;* Larvae *Rugoſae; mittelſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Mediofaſciatae.*

2) Die Oberflügel grau.

No. 4 *Johanniskrautſpannerraupe* (Hyperici perforati); *Johanniskrautſpanner*, Ph. *Plagiata.*

Schaeff. Icon. t. 12. f. 1. 2. *)

Clerk Phal. t. 6. f. 1.

249. *Miata*, der *Doppelhaken.*

Müller l. c. p. 716. no. 294. die *Dreynull.*

Füeſsl. Magaz. der Entom. II. p. 37. Ph. *Miata.*

1) Die *Raupe* friſst *Eichblätter*, auch *Schlehenblätter.*

2) Das

*) An haec; an Mülleri *Matronaria*: Faun. Fridr. p. 49. no. 433. — Zool. D. Pr. no. 1455.

2) Das dritte Paar der Vorderbeine ganz roth.

3) Die Haut des Oberleibes durchaus grünlich gelb. (Chorh. *Meyer.*)

Berl. Mag. IV. p. 522. no. 41. Ph. *Miata*, der *Doppelhaken.*

Blaſsgrün mit vielen ſchmalen braunen Strichen und grauen Flecken.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 751. no. 67. Ph. *Miata*, der *Doppelhaken.*

Kleem. Beytr. I. p. 222. t. 27. f. 1-8. *Raupe bis zum Ey des Vogels.*

— p. 120. t. 14. f. 1. 2. *Männchen* und *Weibchen.*

Die platte, bräunlich graue, mit einem herzförmig getheilten Kopfe, und hellem rautenförmig ſchwarz gezeichneten Rücken verſehene zehnfüſsige *Spannenraupe.*

Der zur N. V. 3 Kl. gehörige bräunlich graue und mit vielen Kappenzügen gezierte *Nachtpapilion.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 104. no. 295. Ph. *Miata.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.

No. 21. *Mayenſpannerraupe* (Betulae albae); *Mayenſpanner*, Ph. *Miaria* (*Miata* L.).

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 54. Phal. *Miata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 863.

Act. Vpſal. 1736. p. 23. no. 43.

Papilio alis planis vireſcentibus cinereo-maculatis.

Réaum. Inſ. II. t. 29. f. 11-13.

Fabric. S. E. p. 633. no. 67. *Phalaena Miata.*

Setacornis, alis griſeis, faſciis tribus viridibus, intermedia latiore, fuſco-undata.

250. *Pru-*

250. *Prunata*, der *Grauflügel.* *)

Müller l. c. p. 716. no. 250. der *Greifsflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 782. Ph. *Prunata.*
Bey uns *etwas ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 600. no. 54. Ph. *Prunata*, der *Erpel.*
Dunkelbraun, mit 2 bräunlich gelben irregulären Queerſtreifen, welche etwas weifsgefleckt ſind.

Naturf. XI. p. 76. no. 54. Ph. *Prunata.* Die Grundfarbe der *Raupe* von Hrn. *Hufnagel* unrichtig beſchrieben, die niemals grün, ſondern braun iſt.

Wien. Schmett. p. 105. Anm. (*) p. 113. M.
2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.

No. 19. *Zwetſchkenſpannerraupe* (Pruni domeſticae); *Zwetſchkenſpanner*, Ph. *Prunata.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 155. no. 57. Phal. *Prunata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 866.

Clerk Phal. t. 7. f. 3. Ph. *Prunata.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1464. Ph. *Prunata*, Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 632. no. 64. *Phalaena prunata.* Nom. *Linn.*

251. *Averſata*, der *Finnländer.*

Müller l. c. p. 716. no. 251. der *Finnländer.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 783. Ph. *averſata.*
Bey uns ſelten.

Wien. Schmett. p. 117. P.

No.

*) Der *Chenopodiatae* ähnlich. S. unſere Anm. bey derſelben no. 246. Es gehört auch das vom Linné zu Prunata geſetzte Zitatum *Friſch* zu jener.

No. 3. *Unbek. Raupe. Bleicher braungeſtrichter Spanner*, Ph. *Averſata.*

Cathol. A. p. 636. Ph. *Averſata.*

Müllerі Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1468. Ph. *Averſata.*

Clerk Phal. t. 5. f. 7.

252. *Triſtata*, der *Trauerſpanner.*

Müller l. c. p. 716. no. 252. der *Kloſtervogel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 784. Ph. *Triſtata.* Auf Birken *nicht ſelten.*

Gleditſch Forſtw. II. p. 752. no. 71. Ph. *Triſtata*, die *weiß- und ſchwarzgewäſſerte Spannenmeſſermotte.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

3) Mit hellem Durchſchnitte, und unrichtigem Rande des Queerbandes.

No. 26. *Unbekannte Raupe; ſchwarzer* weiſsſtreifigter und ſchwarzgeſtrichter Spanner.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 53. Phal. *Triſtata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 862.

Act. Vpſ. 1736. p. 23. no. 25. *Papilio* alis planis albidis; faſciis latis cinereis.

Müllerі Faun. Fridr. p. 50. no. 440. Ph. *Triſtata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1465. Ph. *Triſtata.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 71. *Phalaena Triſtata.* Nom. *Linn.*

Othon. *Fabric.* Faun. Groenland. p. 195. no. 149. Ph. *Triſtata.* Nom. *Linn.*

Habitat in *Betula nana*, et aliis fruticibus montanis, numeroſa ſatis.

Clerk Phal. t. 1. f. 13.

253. *Al-*

253. *Alchemillata*, der *Alchemiſtenkrautſpanner.*

Müller l. c. p. 715. no. 253. der *Alchymiſt.*

Wien. Schmett. p. 112. M.

No. 8. *Sinaufſpannerraupe* (Alchemillae vulgaris); *Sinaufſpanner*, Ph. *Alchemillata.*

Martini allgem. Geſch. d. N. II. p. 46. der *Alchymiſt;* der *Sinauvogel.*

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 285. No. 45. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 444. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1466. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. p. 358. t. 22. f. 10-16.

Petite *Chenille arpenteuſe* verte, à dix jambes, dont les ſeparations des anneaux ſont jaunâtres, qui a tout le long de chaque côté du corps une raye blanche, et qui vit ſur le Pied-de-Lion.

— — p. 695. t. 22. f. 16.

Petite Phalene à antennes à barbes, et à trompe, dont les ailes ſupérieures, qui ſont amples et plates, ont des rayes ondées blanchâtres et brunes.

— Tom. II. Part. I. p. 357. no. 10. *Phalene du Pied-de-Lion.*

Phalene à antennes barbues à trompe; à ailes horizontales d'un brun griſeatre avec deux bandes ondées, et une ligne en Ziczac blanches ſur les ſupérieures.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 106. t. 22. f. 10-16. die kleine zehnfüſsige *Spannenraupe*, mit gelblichen Ringgelenken, und an beyden Seiten weiſsgeſtreift, auf der *Sinau*, oder *Alchemiſtenkraut.*

De-

Degeer Ueberſ. 4 Qu. p. 117. t. 22. f. 16.

Ein kleiner *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, und Saugrüſſel, deſſen breite und flache Oberflügel weiſsliche und braune wellenförmige Streifen haben.

— II Th. 1 B. p. 259. no. 10. die *Sinau- oder Alchymiſtenkrautphaläne.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen braungraulichen Flügeln, mit zwo gewäſſerten weiſſen Binden, und einer ſolchen zickzackichten Linie auf den Oberflügeln.

254. *Haſtata*, das *Spieſsband.*

Müller l. c. p. 717. no. 254. das *Spieſsband.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 785. Ph. *Haſtata*, das *Spieſsband.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Kleem. Beytr. I. p. 369. t. 44.

Die zehnfüſsige, zimmetbraune, zartgeſtreifte, und auch ſchwarze *Spannenraupe* mit gelben hufeiſenförmigen Seitenflecken und zehn Füſsen.

Wien. Schmett. p. 113. M.

No. 25. *Birkenbuſchſpannerraupe* (Betulae albae); *Birkenbuſchſpanner*, Ph. *Haſtata.*

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 52. Ph. *Haſtata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 861.

Act. Vpſ. 1736. p. 24. no. 46. *Papilio* alis planis cinereis, faſciis albis punctatis.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1470. Ph. *Haſtata.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 70. *Phalaena Haſtata.* Nom. *Linn.*

Faſciae

Faſciae albae in noſtro ſpecimine *nigro-punctatae.* *)

Othon. *Fabric.* Faun. Groenl. p. 195. no. 150. Phal. *Haſtata.* Nom. *Linn.* — *Gras-Fidrilde.* Ol. 602?

Frequenter obvia menſibus Iunio et Iulio in *graminibus* et *muſcis* montanis: *Triſtatae* ſocia, oui ſimilis, ſed *maior.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 455. t. 8. f. 20. no. 7.

Phalene blanche et noire à tache en fer-de-pique.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues blanches avec des bandes ondées et des taches découpées noires tant en deſſus qu'en deſſous.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 334. no. 7. t. 8. f. 20. die weiſs und ſchwarze *Phaläne* mit einem weiſſen Fleck, wie ein *Pikeneiſen.*

Die Phaläne mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und breiten weiſſen Flügeln, mit gewäſſerten Binden, und ſchwarzen gezackten Flecken ſowohl unten als oben.

255. *Albicillata*, das *Weiſsfeld.*

Müller l. c. p. 717. no. 255. das *Weiſsfeld.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 786. Ph. *Albicillata*, der *Weiſsger.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Wien. Schmett. p. 114.

2) Die Queerflecken am Unterrande.

No. 8. *Unbekannte Raupe. Milchweiſſer grau-ſchwarzfleckichter Spanner*, Ph. *Albicillata.*

Knochs

*) Auch in dem *Kleemannſchen* Exemplar.

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte I St. p. 40. no. 7. t. 2. f. 8. *Larva.* Ph. *Albicillata*, der *weiſſe Schleyer.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 69. *Phalaena Albicillata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 1. f. 12.

256. *Dealbata*, der *Bleicher.*

Müller l. c. p. 717. no. 256. der *Tüncher.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 786. Ph. *Dealbata*, der *Bleicher.* In den Wäldern *nicht ſelten.*

Wien. Schmett. p. 116. O.

No. 3. *Unbek. Raupe; weiſſer, unten ſchwarzadrichter Spanner*, Ph. *Dealbata.*

Sulzers Geſch. p. 162. t. 23. f. 3. Ph. *Dealbata*, der *Getünchte.*

Die *obere Seite* der Flügel wie getüncht, die *untere* mit ſchwarzen Adern durchzogen, und auf den vordern ein halbes Möndchen.

Fabric. S. E. p. 632. no. 63. *Phalaena dealbata.* Nom. *Linn.*

257. *Marginata*, der *Braunrand.*

Müller l. c. p. 717. no. 257. der *Flicker.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 788. Ph. *Marginata*, der *Braunrand.*

Nicht ſelten in *Wäldern im Graſe.*

Berlin. Mag. IV. p. 524. no. 42. Ph. *Marginata*, das *Kalbfell.*

Ganz weiſs, mit dunkelgraubraunem Rande und Flecken.

— p. 625. O. ändert ſich ſehr ab; einige beynahe ganz weiſs.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 570. no. 8. II. p. 751. no. 66. Phal. *Marginata*, das *Kalbfell.*

Wien. Schmett. p. 114. N.
No. 10. *Haſelſtaudenſpannerraupe* (Coryli Avellanae); *Haſelſtaudenſpanner*, Ph. *Marginata.*
Sulzers Kennz. der Inſ. t. 16. f. 96. Ph. *Hortulata.**)
Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 51. Phal. *Marginata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 860.
Act. Vpſ. 1736. p. 23. no. 37. *Papilio* alis planis albis, maculis fuſcis inaequalibus marginalibus.
Müllerі Faun. Fridr. p. 50. no. 441. Ph. *Marginata.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1471. Ph. *Marginata.* Nom. *Linn.*
Fabric. S. E. p. 633. no. 66. *Phalaena Marginata.* Nom. *Linn.*
Interdum maculae aliquot nigrae in diſco alae.
Scop. Entom. carn. p. 221. no. 548. Ph. *Staphylaeata.* **)

Long.

*) Dies war nach *Linn.* S. N. ed. 10. Ph. *Vrticalis*, und ed. 12. Ph. *Vrticata.* Allein wenn man damit die Abbildung der wahren *Vrticata*: *Röſel* I. N. V. 4. t. 14. vergleicht, ſo wird man die deutlichſte Verſchiedenheit bemerken. Vermuthlich iſt daher *Sulzers* Phaläne eine Abänderung der Ph. *Marginata*, wobey ſie auch *Linné* angeführt hat. S. *Wien. Schmett.* p. 122. Anm.

**) Variat 1) *Alis anticis*: faſcia abrupta fuſca, maculisque marginalibus coalitis.
2) — — macula parva diſci maculisque marginalibus disjunctis.
3) — — poſticis limbo, et diſco fuſco-faſciato maculato.
4) — — limbo maculis tribus obſoletis, faſcia nulla.

Long. lin. $5\frac{3}{4}$. *Lat.* $3\frac{2}{3}$.

Alae concolores albae; *anticae* limbo maculisque binis contiguis fuscis crassiori margini impositis.

Habitat in *Fago*, in *Staphylaea*.

Geoffr. Inf. II. p. 139. no. 60.

Phalaena seticornis spirilinguis, alis patentibus albis, margine undique interrupte fuscis.

La *Bordure entrecoupée.*

Long. 6. lign. *Larg.* 11. lign.

258. *Ocellata*, das *Doppelauge.* *)

Müller l. c. p. 717. no. 258. das *Doppelauge.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 41. no. 789. Ph. *Ocellata*, das *Doppelauge.*

Bey uns *selten.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

No. 9. *Labkrautspannerraupe* (Galii Sylvatici); *Labkrautspanner*, Phal. *Ocellata* (Fasciata *Scop.*).

Scop. Ent. carn. p. 221. no. 550. Ph. *Fasciata.* **)

Long. lin. 6. *Lat.* lin. $4\frac{1}{2}$.

Alba; alis *anticis* supra basi fasciaque dentata fusco ferrugineoque variis.

Fabric. S. E. p. 635. no. 78. *Phalaena ocellata.*

Seticornis, alis albidis; fascia lata abbreviata fusca, puncto subocellari atro.

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 442. Ph. *Ocellata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1472. Ph. *Ocellata.* Nom. *Linn.*

*) *Nicht abgebildet.*

**) Habitus et fasciae figura, ut in *Frisch* Inf. VII. t. 19. f. 2; sed *colores alii.*

259. *Janata*, der *indianiſche Janus.**)

Müller l. c. p. 717. no. 259. der *Janus.*

Linn. Muſ. Lud. Vlr. p. 398. no. 33. Ph. *Janata.*

Corpus mediae magnitudinis, cinereum.

Antennae nigrae.

Oculi nigri.

Alae *primores ſupra* cinereae.

Lineae 2, ſaturatiores, undatae, transverſae, remotae.

— — *ſubtus* cinereo-fuſcae.

Faſcia alba in medio.

— *poſticae ſupra* fuſcae.

Faſcia transverſalis alba.

Maculae 3, albae, in margine poſtico.

— — *ſubtus* cinereae.

Lineae 2 ſaturatiores, undatae, transverſae.

Macula rotunda, fuſca, ad angulum ani.

Fabric. S. E. p. 635. no. 80. *Phalaena Janata.*

Seticornis, alis cinereis; *poſticis* ſupra fuſcis, faſcia punctisque tribus albis.

260. *Fluctuata*, die *Waſſerwoge.*

Müller l. c. p. 718. no. 260. die *Waſſerwoge.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 790. Ph. *Fluctuata.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Friſch Inſ. VII. p. 27. no. 19. 3 Pl. t. 19. vom gelbgrünen *Spannenmeſſer*, der aufgerichtet zu ſtehen pflegt.

Berlin.

*) *Nicht abgebildet.*

Linné hat dabey eine artige Bemerkung:

Si Ph. *ſubtus* inſpiciatur, ut cauda ſit capitis loco, refert eandem ſupra, antice viſam; hinc *Hyſteronproteron*, vel *Janus bifrons* audit.

Berlin. Mag. IV. p. 604. no. 65. Ph. *Fibulata*, der *Gartenvogel.*

Weifslich mattaſchgrau gefleckt mit einigen dunkelbraunen Flecken auf den Oberflügeln.

Naturf. XI. p. 80. no. 65. Ph. *Fibulata* iſt L. *Fluctuata* (v. *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 750. no. 61. Ph. *Fluctuata*, das *weiſſe Bändchen.*

Wien. Schmett. p. 114. N.

1) Das Queerband vom Auſſenrande bis in den Mittelraum.

No. 2. *Merrettigſpannerraupe* (Cochleariae Armoraciae); *Merrettigſpanner*, Phal. *Fluctuata.*

Schriften der Dronth. Geſ. III. p. 369. no. 35. Phal. *Fluctuata.* Nom. *Linn.*

Olaffens Reiſ. durch Isl. I. p. 320. no. b. Ph. *Fluctuata.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 594. no. 2288. *Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, *erucae viridis bacilliformis.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 35. *Phalene du Pin.* Ph. *Fluctuata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 844.

Fabric. S. E. p. 634. no. 74. *Phalaena Fluctuata.* Nom. *Linn.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 50. no. 443. Ph. *Fluctuata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1473. Ph. *Fluctuata.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 123. f. 6.

Geoffr. Inſ. II. p. 143. no. 69.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, lineolis faſciisque plurimis undulatis fuſcis, limbo ſubdentato.

La *Brocatelle d'argent.*
Long. 4. lign. *Larg.* 10. lign.

261. *Juniperata*, der *Wacholderſpanner.*

Müller l. c. p. 718. no. 261. der *Wacholdervogel.*
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 1044. no. 1. Ph. *Juniperata*, die *aſchgrauliche Wacholdermotte.*
Wien. Schmett. p. 110. K.
4) Ein wechſelndes Queerband über die Oberflügel.
No. 29. *Krammetsſpannerraupe* (Juniperi communis); *Krammetsſpanner*, Ph. *Juniperata.*
Cathol. I. p. 405. Ph. *Juniperata.*
Clerk Phal. t. 2. f. 8.

262. *Sordiata*, die *Saloppe.*

Müller l. c. p. 718. no. 262. die *Saloppe.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 791. Ph. *Sordiata.*
Bey uns *etwas ſelten.*
Röſels Inſektenbel. III. p. 17. t. 3. f. 3. die groſse, weiſslichbraune, gewäſſerte, mit Spitzen und Knöpflein beſetzte Spannenraupe der *Roſe von Jericho.*
Kleem. Beytr. I. p. 235. t. 28. f. 3. 4. der groſse mattledergelbe und mit etwas ausgekappten Hinterflügeln begabte *Spannenpapilion.*
Der hellumbrabraune mit hellledergelben Flecken, und ausgekappten Hinterflügeln beſetzte *Spannenpapilion.*
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 32. Ph. *Sordiata*, die *Saloppe.*
Wien. Schmett. p. 105. Anm. Ph. *Sordiata.*
Naturf. XV. p. 65. t. 3. f. 15. (*Capieux.*) (*Mas.*)
Schaeff. Icon. t. 164. f. 6. 7.

263. *In-*

263. *Incanata*, das *Mäntelchen.*

Müller l. c. p. 718. no. 263. das *Mäntelchen.*
Berl. Mag. IV. p. 604. no. 62. Ph. *Incanata*, das *Mauſefell.*
Durchaus weiſsgrau.
Wien. Schmett. p. 117. P.
No. 7. *Unbekannte Raupe: graulichter wellenſchattigter Spanner*, Ph. *Incanata.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 51. no. 447. Ph. *Incanata.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1474. Ph. *Incanata.* Nom. *Linn.*
Clerk Phal. t. 3. f. 3.

264. *Immutata*, der *Scheckſpanner.*

Müller l. c. p. 719. no. 264. der *Nämliche.*
Wien. Schmett. p. 117. P.
No. 6. *Ehrenpreißſpannerraupe* (Veronicae agreſtis); *Ehrenpreisſpanner*, Ph. *Immutata.*
Fabric. S. E. p. 637. no. 92. *Phalaena Immutata.*
Seticornis, alis niveis, ſtrigis undatis, obſcurioribus, margine poſtico nigro punctato.
Geoffr. Inſ. II. p. 140. no. 63.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albidis, atomis cineraſcentibus, et faſcia undulata ferruginea.
Les Atomes à une bande.
Long. 5. lign.
Clerk Phal. t. 6. f. 11.

265. *Immorata*, der *Leimflügel.* *)
Müller l. c. p. 719. no. 265. der *Zauderer.*

*) *Nicht abgebildet.* Gar kein anderer Schriftſteller dabey angeführt.

266. *Remutata*, der *Randpunkt.*

Müller l. c. p. 719. no. 266. Ein *Anderer.*

Berl. Mag. IV. p. 606. no. 69. Ph. *Trilineata*, der *Dreyſtrich.*

Blaſsgelb, etwas grau beſtäubt, mit drey braunen Queerlinien durch alle vier Flügel, und einem ſchwarzen Punkt in jedem Oberflügel.

Naturf. XI. p. 81. no. 69. Ph. *Trilineata* iſt Ph. *Remutata* L. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 117. P.

No. 5. *Zaunwickenſpannerraupe* (Viciae ſepium); *Zaunwickenſpanner*, Ph. *Remutata.*

Clerk Phal. t. 5. f. 12.

267. *Succenturiata*, der *Anhangſpanner.*

Müller l. c. p. 719. no. 267. der *Anhang.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 792. Ph. *Succenturiata.*

Bey uns *nicht ſelten.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 30. t. 7. das gelblich grüne *Spannenraupleín der Pflaumenbäume*, mit dem dunklen Rückenſtreif.

Friſch Inſ. IV. p. 31. no. 16. 2 Pl. t. 16. der kleine *Spannenmeſſer* auf dem *Till.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 17. no. 27. Ph. *Succenturiata*, p. 36. no. 92. Ph. *Succenturiata.* *)

Wien. Schmett. p. 110. K.

No. 24.

führt. Sollte dieſe *Linné* allein gekannt haben? In der Faun. Suec. ed. 2. no. 1290. die genaueſte Beſchreibung.

*) Es muſs aber an beyden Orten heiſſen: *Röſel* I. Phal. 3. t. 7. und nicht t. 8. weil no. 93. dieſe *Röſelſche* t. 8 mit Recht als eine *neue* Geometra angeführt wird, die *Linné* Faun. Suec. ed. 2. Sepoſ. p. 548. no. 2286. beſchrieben hat.

No. 24. *Unbekannte Raupe* *)*; aſchgrauer langflüglichter Spanner*, Ph. *Succenturiata* (*Signata Scop.*).

Scop. Ent. carn. p. 231. no. 578. Ph. *Signata.*
Long. lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Albida; alis *anticis ſupra* ſtrigis duabus obſoletis fuſceſcentibus, punctoque nigro utrinque.

Fabric. S. E. p. 637. no. 86. *Phalaena Succenturiata.* Nom. *Linn.*
Clerk Phal. t. 5. f. 2.
Geoffr. Inſ. II. p. 141. no. 64.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, ſuperioribus macula nigra, et faſcia duplici in extremo undulata.

La *Phalene blanche à tache et bande noire.*
Long. 4. lign. *Larg.* 9. lign.

268. *Strigilata*, der *kammſtrichigte Spanner.*

Müller l. c. p. 719. no. 268. der *Kammſtrich.*
Wien. Schmett. p. 117. P.

No. 4. *Vogelwickenſpannerraupe* (Viciae Craccae); *Vogelwickenſpanner*, Ph. *Strigilata.* (*Variegata Scop.*)

Scop. Ent. carn. p. 222. no. 553. Ph. *Variegata.***)
Long. lin. $6\frac{1}{2}$. *Lat.* $4\frac{1}{4}$.

 Albi-

*) Die Wiener Entomologen müſſen die *Röſelſche* I. Ph. 3. t. 7. nicht für die Succent. L. halten, weil ſie die Raupe für noch unbekannt ausgeben; indeſſen haben ſie doch den vom *Linné* angemerkten karakteriſtiſchen Umſtand mit angeführt: *langflüglichter Spanner:* und den hat die *Röſelſche.*

**) Hr. Rath *Scop.* ſetzt hinzu: Cf. Geom. *Immutata* Cel. *Linn.* Dies mag den Ritter bewogen haben, dieſe Varieg. mit ſeiner Immut. für einerley zu halten, und bey der letztern den Scop. zu zitiren.

Albida; atomis faſciisque undatis tenuibus fuſcis variegata; alis omnibus puncto medio margineque nigro punctato utrinque.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 128, no. 1476. Ph. *Strigilata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 5. f. 2.

269. *Didymata*, der *Zwillingſpanner.*

Müller l. c. p. 720. no. 269. der *Doppellappen.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

No. 13. *Megerkrautſpannerraupe* (Galii Molluginis); *Megerkrautſpanner*, Ph. *Galiata.* (*Didymata Linn.*) *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 438. Ph. *Didymata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1477. Ph. *Didymata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 6. f. 10.

270. *Rectangulata*, der *Winkelhaken.*

Müller l. c. p. 720. der *Winkelhaken.*

Berl. Mag. IV. p. 524. no. 43. Ph. *Viridulata*, das *grüne Bändchen.*

Schwarzgrau mit hellgrünen Queerſtreifen; die Flügel länglicht. **)

Naturf. XI. p. 73. no. 43. Ph. *Viridulata*, ſcheint Ph. *Rectangulata* L. zu ſeyn; jedoch bin ich noch ungewiſs. (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtw. II. p. 750. no. 59. Ph. *Rectangulata*, der *rechte Winkel.*

Wien.

*) Die 2 braunen Fleckchen (macula fuſca biloba L.) oder Punkte am Unterrande zeigen ſich nur bey einigen *Spielarten.*

**) Hufnagels Rectangulata p. 606. no. 71. iſt nicht des *Linné* Rectangulata. S. *Naturf.* XI. p. 82.

Wien. Schmett. p. 112. L.
No. 9. *Aepfelſpannerraupe* (Pyri mali); *Aepfelſpanner*, Ph. *Rectangulata.*
Müller Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1478. Phal. *Rectangulata.* Nom. *Linn.*
Fabric. S. E. p. 636. no. 85. *Phalaena Rectangulata.* Nom. *Linn.*
Clerk Phal. t. 8. f. 6.

271. *Ocellata*, das *Violetauge.* *)
Müller l. c. p. 720. no. 271. das *Violetauge.*

272. *Vrticata*, der *Neſſelſpanner.*
Müller l. c. p. 720. no. 272. t. 22. f. 12. der *Neſſelſpanner.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 793. Ph. *Vrticata*, der *Neſſelſpanner.*
Auf den *Neſſeln* häufig.
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 78. no. 225. p. 89. no. 258. Ph. *Vrticata*, der *Neſſelſpanner.*
Röſels Inſektenbel. I. N. V. 4Kl. p. 37. t. 14. der grünlichgraue dunkel und hellgeſtreifte *Blattwickler* auf der groſsen Brenneſſel.
Wien. Schmett. p. 121. B. kurzſchnauzigte *Zünſler*, Ph. *Pyralides Brevipalpes.*
1) Die Flügel gewäſſert (undulatae).
No. 12. *Brenneſſelzünſlerraupe* (Vrticae urentis); *Brenneſſelzünſler*, Ph. Pyr. *Vrticalis.*
Liſt. Goed. p. 150. no. 61. f. 61.
Eruca *Munda*, quia puram ſe conſervare ſolet.
— ſ. *Pareſca*, quia *pari* eam perſequuntur. *Raj.*

*) Nicht mit no. 258. *Ocellata* zu verwechſeln. Dieſe gegenwärtige *nicht abgebildet.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 222. no. 73.

Phalaena minor, alis oblongis ex albo et coeruleo nigricante variis, ad exortum flavis.

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 272. Phal. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 151. no. 37. *Teigne de l'Ortie.*

Petiv. Gazoph. p. 51. *Phalaena minor* alba, maculis nigreſcentibus ornata.

Schaeff. Icon. t. 119. f. 1. 2.

Scop. Ent. carn. p. 220. no. 547. Ph. *Vrticata.*

Long. lin. $6\frac{3}{4}$. *Lat.* 4.

Alae albae; macularum fuſcarum ordinibus transverſis binis poſticis; thorace anoque flavis.

Poda Muſ. graec. t. 2. f. 2. Ph. *Saliftaria.*

Hollar Inſ. t. 10. f. 3. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Vrticata.*

Fabric. S. E. p. 639. no. 101. *Phalaena Vrticata.* Nom. *Linn.*

Larva 16-poda, nuda, albida, dorſo fuſco, collari bipunctato. Latet intra folium urticae, quod contorquet.

Conjungit *Geometras Linn.* cum *Pyralidibus.*

Pupa folliculata, brunnea.

Müllleri Faun. Fridr. p. 51. no. 448. Ph. *Hortulata*, et no. 449. Ph. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1479. Ph. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

Réaum. Inſ. I. t. 49. f. 17. 18.

Geoffr. Inſ. II. p. 135. no. 54.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albo-fuſcoque nebuloſis, ano flava.

La *queue jaune.*

Long. 7. lign.

Degeer

Degeer Inſ. I. p. 418. Mém. 13. t. 28. f. 12-19.

Chenille à ſeize jambes, verte, avec une raye d'un verd obſcur tout le long du dos, qui plie les feuilles de l'*Ortie*, et ſ'en nourrit.

— — p. 701. t. 28. f. 18. 19.

Phalene à antennes en filets; blanche, à taches noires nuancées, et à corcelet jaune.

— Tom. II. Part. I. p. 445. §. 1. no. 1. *Phalene queue jaune.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes horizontales blanches, à taches ovales noires, et dont le corcelet et le derriere ſont jaunes.

— *Ueberſ.* I. 3 Qu. 13te Abh. p. 23. t. 28. f. 12-19.

Die ſechzehnfüſsige grüne *Neſſelraupe* mit der langen dunkelgrünen Rückenſtreife.

— — 4 Qu. p. 124. t. 28. f. 18. 19.

Ein weiſſer *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, ſchwarzſchattirten Flecken und gelbem Halskragen.

— II Th. I B. p. 326. no. 1. der *Gelbſchwanz.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen weiſſen Flügeln, mit eyförmigen ſchwarzen Flecken, gelbem Bruſtſchilde und Schwanze.

273. *Limbata*, der *Braunſaum.**)

Müller l. c. p. 720. no. 273. der *Braunſaum.*

Wien. Schmett. p. 122. B.

4) Mit einem Mittelpunkt.

No. 20. *Ginſterzünſlerraupe* (Spartii juncei); *Ginſterzünſler*, *Pyralis Limbalis.* S. p. 121. Anm. (*) **)

Fa-

*) *Nicht abgebildet.*

**) Wo aber die Zahlen verſetzt zu ſeyn ſcheinen.

Fabric. S. E. p. 639. no. 102. *Phalaena Limbata.* Nom. *Linn.*

274. *Nymphaeata*, der *Seeblumenſpanner.*

Müller l. c. p. 721. no. 274. der *Schwimmer.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 794. Phal. *Nymphaeata*, der *Seeblumſpanner.*

Im Graſe, an feuchten Orten, nahe bey Seen und Sümpfen.

Berlin. Mag. IV. p. 618. no. 99. Ph. *Nitidulata*, der *Waſſervogel.*

Shneeweiſs, mit einigen irregulären hellbraunen Zeichnungen.

Naturf. XI. p. 89. no. 99. Ph. *Nitidulata* iſt L. *Nymphaeata.* (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 121. B.

2) Die Flügel gegittert (*Reticulatae*).

No. 13. *Seeblumenzünſlerraupe* (Nymphaeae luteae ac albae); *Seeblumenzünſler*, *Pyralis Nymphaealis.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 227. no. 87. *Phalaena* minor, piſcinas et ſtagna frequentans, alis utrisque albo et fuſco colore variis.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 42. *Phalene de la Lentille d'eau:* Phal. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 851.

Act. Vpſ. 1736. p. 24. no. 52. *Papilio* alis planis e nitido albis, omnibus *reticulatis.*

Schaeff. Icon. t. 189. f. 4. 5.

Fabric. S. E. p. 640. no. 105. *Phalaena Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

Müllers Faun. Fridr. p. 51. no. 450. Ph. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1480. Ph. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

275. *Po-*

275. *Potamogata*, der *Saamenkrautſpanner.*

Müller l. c. p. 721. no. 275. der *Saamkrautſpanner.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 794. Ph. *Potamogata*, der *Saamkrautſpanner.*

Häufig am *Katzenſee.*

Berl. Mag. IV. p. 604. no. 66. Ph. *Nymphaeata*, die *Nymphe.*

Glänzend weiſslich, mit olivenbraunen in einander gezogenen Zeichnungen.

Naturf. XI. p. 80. no. 66. Ph. *Nymphaeata* iſt L. *Potamogata.* (v. *Rottemb.*)

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 44. *Phalene du Potamogeton.* Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 852.

Act. Vpſal. 1736. p. 24. no. 51. *Papilio* alis planis nitidis albis, inferioribus reticulatis.

Schaeff. Icon. t. 118. f. 5. 6.

Fabric. S. E. p. 642. no. 104. *Phalaena Potamogata.* Nom. *Linn.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 51. no. 451. Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1481. Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.*

276. *Stratiotata*, das *Amphibium.*

Müller l. c. p. 721. no. 276. das *Amphibium.*

Wien. Schmett. p. 123. B.

No. 23. *Waſſeraloëzünſlerraupe* (Stratiotis Aloidis); *Waſſeraloëzünſler*, *Pyralis Stratiotalis.*

Mannigf. (neue) 3 Jahrg. p. 350.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 45. Phal. *Stratiotata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 854.

Geoffr. Inſ. II. p. 142. no. 66.

Pha-

Phalaena feticornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, faſciis linearibus fuſcis, punctoque nigro.

La *Phalene griſe à lignes brunes et point noir.*

Long. $3\frac{1}{2}$. lign. *Larg.* 9. lign.

Degeer Inſ. I. Mém. 16. p. 517. t. 37. f. 1-19.

Chenille aquatique verte, qui au premier coup d'œil ſemble être velue, et qui mange les feuilles du *Stratiotes* ou de l'*Aloë Paluſtris* de Bauhin.

— — p. 702. t. 37. f. 16-18.

Phalene à antennes en filets, à ailes planes, griſes, nuancées de blanc ſur le mâle, et brunes ſur la femelle: d'une Chenille aquatique du *Stratiotes.*

— *Ueberſ.* I. 3 Qu. p. 85. t. 37. f. 1-19.

Eine grüne *Waſſerraupe*, die beym erſten Anblick rauch ſcheint, und die Blätter der Waſſeraloe friſst.

— — 4 Qu. p. 125. t. 37. f. 16-18.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, flachen, grauen, bey dem *Männchen* weiſs ſchattirten, und bey dem *Weibchen* braunen Flügeln, von einer *Waſſerraupe* der Waſſeraloe.

— II. Part. I. p. 426. no. 15. *Phalene aquatique du Stratiotes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues griſes ou brunes avec un point blanc bordé de noir, et dont les ailes inférieures ſont blanches à rayes noires.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 309. no. 15. die *Waſſeraloëphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und grauen oder braunen nie-

der-

derhangenden Flügeln, mit einem weiſſen ſchwarzgerändelten Punkt, und weiſſen ſchwarzgeſtreiften Unterflügeln.

277. *Paludata*, der *Sumpfſpanner.* *)

Müller l. c. p. 721. no. 277. der *Moraſtläufer.*

Berl. Mag. IV. p. 526. no. 47. Phal. *Inſtitata*, die *Kreidenmotte.*

Ganz ſchneeweiſs; der Rand mit gelben Flecken; in den Unterflügeln ein ſchwarzer Punkt.

Naturf. XI. p. 74. no. 47. Ph. *Inſtitata:* wo es ſehr wahrſcheinlich gemacht wird, daſs dieſe Inſt. L. *Paludata* ſey. (v. *Rottemb.*)

278. *Lemnata*, der *Waſſerlinſenſpanner.*

Müller l. c. p. 721. no. 278. der *Waſſerſchmetterling.*

Berl. Mag. IV. p. 614. no. 88. Ph. *Gemmata*, der *Edelſtein.*

Schneeweiſs, in der Mitte eines jeden Flügels ein ſchwarzer Punkt; der Hinterrand der Unterflügel ſchwarz mit einer Reihe weiſſer Punkte.

Naturf. XI. p. 86. no. 88. Ph. *Gemmata* iſt L. *Lemnata*, und beynahe der *kleinſte* unter den Spannmeſſern. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 121. B.

5) Einfarbigte (Vnicolores).

No. 30. *Waſſerlinſenzünſlerraupe* (Lemnae majoris).

La *Chenille de lentille aquatique Réaum.*

Waſſerlinſenzünſler, Ph. *Lemnalis.*

Raj.

*) Nicht abgebildet.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 205. no. 102.
Phalaena aquatica minima alba ſive argentea.
Fabric. S. E. p. 640. no. 106. *Phalaena Lemnata.* Nom. *Linn.*
Réaum. Inſ. II. t. 32. f. 1 et 13.
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1482. Ph. *Lemnata.* Nom. *Linn.*
Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 43. *Phalene de lentille d'eau;* Ph. *Lemnata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 852.

279. *Hyalinata*, der *amerikaniſche Durchſichtige.**)
Müller l. c. p. 722. no. 279. der *Dreyeckflügel.*
Fabric. S. E. p. 640. no. 103. *Phalaena hyalinata.* Nom. *Linn.*
Parva; abdomen cylindricum, niveum, ano valde barbato, barba nigra.

280. *Cingulata*, der *Ringelflügel.*
Müller l. c. p. 722. no. 280. der *Ringelflügel.*
Wien. Schmett. p. 123. B.
6) Mit hellen Wellenſtrichen (Albido-repandae).
No. 31. *Unbekannte Raupe. Schwarzer Zünſler mit weiſſem Queerſtriche*, Ph. *Cingulalis.*
Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 96. Phal. *Cingulata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 906.
Act. Vpſal. 1736. p. 23. no. 38. *Papilio* alis planis nigris; linea transverſa alba.
Fabric. S. E p. 638. no. 93. *Phalaena Cingulata.* Nom. *Linn.*
Geoffr. Inſ. II. p. 194. no. 32.
Tinea nigra, faſcia transverſa alba.

La

*) *Nicht abgebildet.*

La *Teigne cordeliere.*
Long. $2\frac{1}{2}$. lign.
Clerk Phal. t. 2. f. 10.

281. *Brumata*, der *Froſtſchmetterling.*

Müller l. c. p. 722. no. 281. der *Winterſchmetterling.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 796. Ph. *Brumata*, der *Winterſpanner.*
Bey uns nicht ſelten, doch niemals ſchädlich.
Berl. Mag. IV. p. 612. no. 85. Ph. *Hyemata*, der *Spätling.*
Gelblichgrau mit blaſsbraunen ausgekappten Queerlinien.
Naturf. XI. p. 85. no. 85. Ph. *Hyemata* iſt L. *Brumata.* (v. *Rottemb.*)
Kleem. Beytr. I. p. 256. t. 31. f. 1-12.
Die zur 3ten Kl. der N. V. gehörige ſchädliche, geſellige, glatte, grüne, mit weiſſen Streifen gezierte, und mit 10 Füſsen verſehene *Spannraupe.* *)
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 26. no. 58. Ph. *Brumata*; der *Froſtſchmetterling.*
Friſch Inſ. V. p. 35. no. 14. 2 Pl. t. 14. der grüne *Ausſpanner* mit drey weiſſen Linien auf jeder Seite.
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 787. no. 13. Ph. *Brumata*, der *Froſtnachtſchmetterling.*
Wien. Schmett. p. 109. K.
No. 9. *Frühebirnſpannerraupe* (Pyri communis); *Frühebirnſpanner*, G. *Brumata* (Fem. aptera).

*) Vielleicht eine Mittelart: Ph. *Brumata* media. *Glaſer* von ſchädl. Raupen p. 18.

Glaſers phyſikal. ökon. Abhandl. von den ſchädlichen Raupen der Obſtbäume, verbeſſ. Aufl. p. 18. 117. 150. Ph. *Brumata* minor, der *Froſtnachtſchmetterling.*

Bekmanns phyſ. ökon. Bibl. V. p. 249. Phal. *Brumata.*

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. XXXII. p. 19. Bericht vom Fangen der *Froſtnachtſchmetterlinge* (*Cronſtedt*).

— — p. 26. angeſtellte Verſuche, die *Froſtſchmetterlinge* zu hindern. (*Adlerheim.*)

Raj. Hiſt. Inſ. p. 181. no. 4.

Phalaena alis latis, exterioribus albicantibus cum tinctura viridi aut coerulea.

— — p. 369. no. 9. *Eruca* geometra parva, pallide ſeu ex flavo virens, lineolis albicantibus tum ſecundum longitudinem tum transverſis.

Fabric. S. E. p. 636. no. 81. *Phalaena Brumata.* Nom. *Linn.*

Müllers Faun. Fridr. p. 48. no. 424. Ph. *Brumata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1483. Phal. *Brumata.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. 1. Mém. XI. p. 360. t. 24. f. 11-16.

Chenille arpenteuſe verte, à rayes longitudinales blanches qui plie ou attache enſemble les feuilles de pluſieurs eſpeces d'arbres, et qui s'en nourrit.

Le Papillon *femelle* de cette Chenille eſt *ſans ailes.*

— — p. 700. t. 24. f. 11. 12. 13. 14.

Phalene à antennes en filets, à longs poils; d'un brun clair et griſâtre, dont les ailes de la femelle ſont très-courtes.

Degeer

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 452. no. 6. *Phalene hyemale.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues d'un gris-brun à lignes transverſes plus obſcures, et dont la femelle manque d'ailes.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. 11te Abh. p. 107. t. 24. f. 11-16.

Die grüne *Spannraupe*, mit langen weiſſen Streifen, welche die Blätter von vieler Art Bäumen, die ihr zur Nahrung dienen, zuſammenwickelt, und von der das Schmetterlingsweibchen *keine Flügel* hat.

— — 4 Qu. p. 123. t. 24. f. 11-14.

Ein hellbrauner graulicher Nachtvogel, mit fadenförmigen langbehaarten Fühlhörnern, deſſen Weibchen ſehr kurze Flügel hat.

— II B. I Th. p. 331. no. 6. die *Winterphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und breiten graubraunen Flügeln, mit dunklern Queerlinien; das Weibchen ungeflügelt.

Unabgebildete Linnéiſche Spanner.

1. *Pennaria* no. 209.
2. *Pantaria* no. 218.
3. *Sacraria* no. 220.
4. *Veſpertaria* no. 224.
5. *Tricinctaria* no. 227.
6. *Caffraria* no. 228.
7. *Porata* no. 233
8. *Ocellata* no. 258
9. *Immorata* no. 265.
10. *Ocellata* no. 271.
11. *Limbata* no. 273.

12. *Paludata* no. 277.
13. *Hyalinata* no. 279.

Neue Arten von Spannern.

(Geometrae.)

1. Ph. *Geom. Hirtaria*, der *Rauchflügel.* *)

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. Anim. p. 225.
Pectinicornis; alis *hirtis* canis: ſtrigis duabus nigris, poſterioribus approximatis, antennis atris.

— Faun. Suec. ed. 2. p. 325. no. 1236.

Clerk Phal. t. 7. f. 1.

Wien. Schmett. p. 99. C. *Spinnerförmige Spanner.* No. 3. *Kirſchenſpannerraupe* (Pruni Cerafi); *Kirſchenſpanner*, G. *Hirtaria.*

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 11. p. 354. t. 22. f. 6-9. **)
Grande Chenille arpenteuſe en bâton, à dix jambes, brune, à rayes longitudinales, qui tirent ſur la couleur de chair, dont le haut de la tête n'eſt point refendu, et qui mange les feuilles du Saule et de l'Ozier.

— — p. 697. t. 22. f. 9.
Phalene à antennes à barbes noires, ſans trompe, griſe à rayes ondées noirâtres ſur les ailes, et à corcelet tacheté de noir.

— Tom. II. Part. I. p. 306. no. 5. *Phalene à ailes velues.*
Phalene à antennes barbues, ſans trompe; à ailes presque horizontales griſes velues, avec des mouchetures noires ſur les nervures.

Degeer

*) An G. *Hirtaria Fabric.* Mantiſſ. p. 286? Pectinicornis, alis cinereis; ſtriga fuſca undata albae innata.

**) Die Puppe liegt *über* 19 *Monat*, ehe der Vogel auskömmt.

Degeer Ueberſ. I. 11te Abh. 2 Qu. p. 103. t. 22. f. 6-9.

Der groſse, braune, zehnfüſsige, fleiſchfarbig geſtreifte *Stockſpanner* auf den Bruch- und Zachweiden mit ungeſpaltenem Kopfe.

— — 4 Qu. p. 120. t. 22. f. 9.

Ein grauer *Nachtvogel* mit ſchwarzen bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, mit wellenförmigen ſchwärzlichen Streifen auf den Flügeln, und einem ſchwarzgefleckten Halskragen.

— II Th. I B. p. 220. no. 5. der *Rauchflügel.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, und mit grauen, haarichten, auf den Adern ſchwarzgefleckten, beynahe horizontal liegenden Flügeln.

2. *Defoliaria*, der *Blatträuber.*

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. p. 225. Ph. *Defoliaria.* Pectinicornis; alis griſeis, medio albis; puncto lituraque poſtica nigris; *Femina aptera.*

— Faun. Suec. ed. 2. p. 326. no. 1238. Ph. *Defoliaria.*

Clerk Phal. t. 7. f. 4.

Réaum. Inſ. II. t. 30.

Röſels Inſektenbel. III. p. 83. t. 14.

Die zu der 3 Kl. der N. V. gehörige rothbraune *Spannenraupe*, nebſt ihrer Verwandlung in einen *ungeflügelten* Papilion weibliches Geſchlechts. (*Weibchen.*)

— p. 241. t. 40. f. 6. das *geflügelte Männchen.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. t. 766. Ph. *Defoliaria.*

Bey uns ſehr gemein auf allen Arten von Stauden, Gewächſen und Bäumen.

— Magaz. der Entomol. II. p. 36. Ph. *Defoliaria.* (Chorh. *Meyer.*)

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 29. Ph. *Pulveraria*, die *Sommerſproſſe.*

Okergelb mit einer breiten braunen Binde, und vielen braunen Punkten; das *Weibchen* hat keine Flügel.

Naturforſch. XI. p. 70. no. 29. Ph. *Pulveraria* iſt L. *Defoliaria.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 390. no. 9. Ph. *Pulveraria*, die *Sommerſproſſe.*

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. XXXII. p. 21. Ph. *Defoliaria.*

Glaſers phyſikal. ökon. Abhandl. von ſchädlichen Raupen der Obſtbäume p. 24. 30. die *große Art von Froſtnachtſchmetterlingen:* Ph. *Brumata maior*, Ph. *Defoliaria* t. 2. f. 1-6.

Mülleri Faun. Fr. p. 48. no. 424. Ph. *Defoliaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1451. Ph. *Defoliaria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 625. no. 30. *Phalaena Defoliaria.* Nom. *Linn.*

— Femina aptera, nigro-*punctata.*
Larva ferruginea, ſtria laterali ſulphurea.
Pupa brunnea.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 313. no. 236. c. Phal. *Defoliaria*, der *Schabflügel.*

3. *8-maculata*, der *Achtfleck.*

Linn. Mantiſſ. p. 540.

Seticornis, alis nigris; omnibus maculis duabus albis rotundatis. Habitat in *Anglia.*

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 313. no. 236. d. Ph. *8-maculata*, der *Engländer.*

4. *Ri-*

4. *Ribearia*, der *Johannisbeerſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 326. no. 1239.
Pectinicornis; alis griſeis fuſco-ſubfaſciatis, faſcia poſtica moniliformi.
Clerk Phal. t. 6. f. 5. Ph. *Ribeata.*

5. *Pendularia*, der *Hangpuppenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. p. 327. no. 1244. Ph. *Pendularia.*
Pectinicornis; alis omnibus cinereis ocello ferrugineo ſtrigaque nigro-punctata.
Habitat in *Salice.*
Larva *Incarnata*, *pupa pendula.*
Clerk Phal. t. 7. f. 5.
Wien. Schmett. p. 107. H. *wechſelnde Spanner.*
No. 1. *Hangelbirkenſpannerraupe* (Betulae albae); *Hangelbirkenſpanner*, Ph. *Pendularia.*
Réaum. Inſ. II. ed. 4. p. 364-366. t. 29. f. 1.
Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 360. no. 2. t. 6. f. 7. *Phalene à Criſalide ſuſpendue.*
Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales d'un blanc ſale un peu cendré avec deux lignes transverſes de points noirs et un petit oeil roux, et dont les inférieures font un angle.
— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 262. no. 2. t. 6. f. 7. die *Hangpuppenphaläne.*
Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen weiſsgraulichen, etwas aſchfarbigen Flügeln, mit zwo Queerlinien von ſchwarzen Punkten, und einem kleinen braunröthlichen Auge, deren Unterflügel einen Winkel machen.

6. *Carbonaria*, der *Kohlenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 327. no. 1246.

Pectinicornis *nigra;* alis ſtrigis tribus albidis undatis ſubinterruptis; antica remotiore.
Clerk Phal. t. 1. f. 11. Ph. *Carbonaria.*

7. *Fuliginaria*, der *Schlottfegerſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 327. no. 1247. Ph. *Fuliginaria.*
Pectinicornis; alis nigris albo punctato-vndulatis, ſubtus griſeſcentibus.
Clerk Phal. t. 8. f. 7.
Fabric. S. E. p. 629. no. 46. *Phalaena fuliginaria.*
Pectinicornis; alis atris, albo-ſubfaſciatis; ſubtus griſeis; faſciis fuſcis.

8. *Margaritaria*, der *Perlflügel.**)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1249.
Subpectinicornis; alis *margaritaceis;* faſcia rivulari luteſcente, extremitatibus fuſcis. — *Holmiae.*
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1452. Ph. *Margaritaria.* Nom. *Linn.*

9. *Quadrifaſciaria*, die *Vierbinde.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1253.
Pectinicornis, alis griſeis, faſcia fuſca undata, puncto atro.
Clerk Phal. t. 6. f. 4. Ph. *Quadrifaſciata.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 431. Ph. *Quadrifaſciaria.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1453. Ph. *Quadrifaſciaria.* Nom. *Linn.*
Fabric. Mantiſſ. p. 289. no. 77-78.

Se-

*) Nicht mit *Linn. Margaritata* no. 231. zu verwechſeln.

Seticornis; alis griseo-fuscis, fascia lata nigra; puncto subocellari nigro.

In Europae *pratis sylvaticis.*

Alae subtus albidae puncto centrali strigisque nigris.

Wien. Schmett. p. 112. M. *Eckestreifigte Spanner.*

No. 6. *Unbek. Raupe; bräunlicher düsternstreifiger Spanner*, Ph. *Quadrifasciaria.*

10. *Bidentata*, der *zweyzähnichte Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1255.

Seticornis, alis erosis griseis, puncto nigro ocellari; superioribus fascia saturatiore. — In *Rosa et Alno.*

Clerk Phal. t. 7. f. 2. Geometra *Bidentata.*

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 12. p. 378. t. 25. f. 1-6.

Chenille arpenteuse en bâton, d'un brun griseatre; à quatorze jambes, ou à six intermédiaires de grandeur inégale, quatre de ces jambes étant très-petites.

— — p. 695. t. 25. f. 6.

Phalene à antennes à barbes et à trompe; à ailes découpées d'un brun griseatre, dont les supérieures sont traversées de deux rayes ondées obscures, qui renferment un point noir.

— Tom. II. Part. I. p. 343. no. 1.

Phalene brune à deux rayes et un point.

Phalene à antennes barbues, à trompe; à ailes découpées horizontales d'un brun griseatre avec deux rayes transverses ondées obscures bordées de blanc et un point noir au milieu.

— *Ueberf.* I. 12te Abh. 2 Qu. p. 121. t. 25. f. 1-6.

Die

Die graulichbraune, vierzehnfüfsige aftförmige *Spannraupe* mit fechs ungleichen Bauchfüfsen, darunter viere fehr klein find.

Degeer Ueberf. I. 4. Qu. p. 118. t. 25. f. 6.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, Saugrüffel, und braungraulichen ausgezackten Flügeln, davon die Oberflügel zwo dunkle wellenförmige Streifen haben, zwifchen welchen ein fchwarzer Punkt befindlich ift.

— II Th. I B. p. 249. no. 1. die *braune zweygeftreifte und einpunktirte Phalene.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüffel und gezackten horizontalftehenden, braungraulichen Flügeln, mit zwo wellenförmigen dunkeln, weifsgerändelten Queerftreifen, und einem fchwarzen Mittelpunkt.

11. *Teftata*, der *muſchelbraune Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 331. no. 1262.

Seticornis; alis fuperioribus fulvefcentibus; macula pallida ftriga alba, lineolaque apicis alba. —, *Maiuscula.*

12. *Citrata*, der *Zitronblätterſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 332. no. 1265.

Citrata, feticornis, alis grifeis macula fubterminali albo-fulva ftriaque alba, apicis lineola fufca.

Habitat in Foliis *Citri*, quae noctu edebat Larva Geometra viridi-pallefcens. Magnitudo Ph. *Piniariae.*

13. *Liturata*, der *gelbgeſtrichte Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 334. no. 1273.

Seti-

Seticornis, alis ſubangulatis cineraſcentibus; litura poſtica flava, apice ſubtus dealbatis.

Clerk Phal. t. 6. f. 6. Ph. *Liturata.*

Wien. Schmett. p. 106. G.

No. 10. *Unbek. Raupe; hellgrauer gelbfleckigter Spanner*, Ph. *Liturata.*

14. *Lividata*, der *grüngelbe Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 337. no. 1285.

Seticornis; alis antice pallidis ſtriga fuſca, poſtice fuſcis ſtriga pallida.

Clerk Phal. t. 5. f. 10.

15. *Ferrugata*, der *kleine Roſtſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 338. no. 1292.

Seticornis; alis purpuraſcentibus; ſtrigis tribus albidis, poſtice cinereis, macula didyma fuſca.

Fabric. S. E. 637. no. 87. Ph. *Ferrugata.* Nom. *Linn.*

Wien. Schmett. p. 113. M. *Schuppenraupen.*

No. 11. *Vogelkrautſpannerraupe* (Alſines mediae); *Vogelkrautſpanner*, G. *Ferrugaria* (*Ferrugata* L.).

16. *Abſinthiata*, der *Wermuthſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 339. no. 1296.

Seticornis; alis obſcure cinereis puncto liturisque tribus nigris marginalibus, punctoque ani albo.

Clerk Phal. t. 8. f. 9. Ph. *Abſinthiata.*

17. *Purpurata*, die *Purpurbinde.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1302.

Seti-

Seticornis; alis ſuperioribus vireſcentibus; faſciis duabus *purpureis;* inferioribus luteis ſubtus litura purpuraſcente.

Fabric. S. E. p. 637. no. 91. Ph. *Purpurata.* Nom. *Linn.*

18. *Albo-punctata*, der *Weißpunkt.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſita*, p. 548. no. 2285. Pectinicornis ſpirilinguis; alis patentibus cinereis; faſciis duabus fuſcis. — Habitat in *Vmbroſis.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 34. Nom. *Linn.*

19. *Rubroſtriata*, der *rothe Rückenſtreif.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 548. no. 2286. Seticornis, ſpirilinguis, alis patentibus canis, faſciis cinereis duabus tribusve punctoque nigro. Habitat in pratis arboribus conſitis.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 39. Nom. *Linn.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 32. t. 8. das dickere grüne *Spannräuplein mit dem rothen Rückenſtreif.*

20. *Graminea*, der *Grasſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 548. no. 2287. Seticornis, ſpirilinguis; alis patentibus flaveſcente-niveis, faſciisque linearibus nigris. Habitat in *Pratis* et in *Gramine.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 49. Nom. *Linn.*

21. *Muſcaria*, der *Fliegenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2289.

Pha-

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis incumbentibus griſeis, albo-fulvoque reticulato-maculatis.

Habitat in *Sambuco.*

Magnitudo *maioris muſcae.*

Liſt. Goed. p. 136. f. 55.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 156. no. 61. *Phalene du Sureau.* Nom. *Linn.*

22. *Humulata*, der *Hopfenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2291.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis depreſſis fuſcis, linea utrinque ferruginea, humeris gibbis, faſciculoque medii dorſi.

23. *Hortulana*, der *Gartenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2292.

Seticornis, ſpirilinguis, alis deflexis pallide griſeis; faſcia ſaturatiore. Habitat in *hortis.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 75. *Phalene de Jardin.* Nom. *Linn.*

24. *Arbuſtata*, der *Strauchſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2293.

Seticornis, ſpirilinguis; alis deflexis ſupra fuſcis, margine albam lineolam emittentibus.

Inter *Arbuſta.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 76. Nom. *Linn.*

25. *Domeſtica*, der *Hausſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2294.

Seticornis, ſpirilinguis; *corniculis* duobus recurvis baſi criſtatis, alis plano incumbentibus.

In

In *Domibus*, frequens Vere.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 77. Nom. *Linn.*

Réaum. Inſ. I. t. 18. f. 12-14.

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 286. no. 47. Nom. *Linn.* Norv. *Forvaeld.*

26. *Sylveſtris*, der *Waldſpanner*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2295.

Seticornis, ſpirilinguis, corniculis duobus ſubulatis recurvis, alis nigricantibus ſupra albo-maculatis. — In *Nemoribus.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 78. *Phalene des bosquets.* Nom. *Linn.*

27. *Tetralunaria*, das *Fenſterchen*.

Berlin. Mag. IV. p. 506. no. 3.

Die innere Hälfte aller vier Flügel meiſt braun, mit einem durchſichtigen halben Rande, die äuſsere Hälfte weiſslichgelb mit braunen Punkten; der äuſsere Rand ausgeſchweift, und ausgezakt.

Naturf. XI. p. 64. no. 3. G. *Tetralunaria.*

1) In der Gröſse der *Syringaria.*

2) Das *Männchen* merklich kleiner.

3) Der Vogel einer der ſeltenſten und ſchönſten. *) (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 550. no. 8. Ph. *Tetralunaria*, das *Fenſterchen.*

28. *Repandaria*, der *breite Saum.*

Berl. Mag. IV. p. 508. no. 6.

Die

*) Deſſen *Abbildung* zu wünſchen.

Die Flügel ausgeschwungen; das innere Feld pomeranzengelb mit einem braunen Queerstrich, das äufsere Feld etwas ins Bläuliche fallend.

Naturf. XI. p. 65. no. 6. Ph. *Repandaria.* In der Gröfse der Ph. *Vavaria* L. no. 219. *(v. Rottemburg.)*

29. *Fuliginaria*, die *Kellermotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 508. no. 7.

Dunkelerdfarbig, mit einigen hellgrünen Flecken.

— p. 621. C. Raupe soll *Moos* freffen.

Naturf. XI. p. 65. no. 7. Ph. *Fuliginaria.* Das *Weibchen* in der Gröfse der *Vavaria*; das *Männchen* kleiner. *(v. Rottemb.)*

30. *Vrticaria*, die *Neffelmotte.* *)

Berl. Magaz. IV. p. 508. no. 8.

Weifsgrau, braun befläubt mit unterbrochenen ausgekappten braunen Queerstreifen.

— p. 621. D. die kleinere Art wahrscheinlich die *Männchen.*

Naturf. XI. p. 65. no. 8. Ph. *Vrticaria.* In der Gröfse der *Atomaria* L. no. 214. Die *Raupe* zu Ende des Augufts auf dem *Rhamno.* *(v. Rottemb.)*

31. *Flammeolaria*, die *Flammenmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 510. no. 11.

Weifs-

*) Obgleich die Beschreibung des *Linné* von seiner *Vrticata* no. 272. einigermafsen mit dieser übereinkömmt, so ist dennoch die Hufnagelsche eine ganz eigene Art, wie der Hr. von *Rottemburg* ebenfalls zu bestätigen scheint.

Weifsgelb mit okergelben geflammten Zeichnungen, und einem fchwarzen Punkt in der Mitte der Oberflügel.

Naturf. XI. p. 66. no. 11. Ph. *Flammeolaria.* Einer der *kleinften* diefer Klaffe. (v. *Rottemb.*)

32. *Atomaria*, der *faule Efel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 510. no. 12.

Weifsgrau, mit braunen Queerftreifen, die Flügel mit wenigen Staubfedern befetzt.

— p. 622. F. Die *Phaläne* bekömmt man felten zu fehen, *theils* weil fie wie Baumrinde ausfieht; *theils* weil fie fchon fo zeitig im *April* auskömmt.

Naturf. XI. p. 66. no. 12. Ph. *Atomaria.* Nicht *Atomaria* L. no. 214. ob fie gleich die Gröfse und den Bau derfelben hat. Der *Augenfchein* unterfcheidet beyde am deutlichften. (v. *Rottemb.*)

Kleem. Beytr. I. p. 299. t. 35. f. 1. 2. 3. 4. *Raupe und Puppe.* Die grofse glatte, bald dunkelrothbraune, bald röthlichgraue, mit vielen zarten Linien überzogene, und mit etlichen Reihen fchöner gelber Queerflecken auf dem Rücken gezierte, zehnfüfsige *Spannraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 136.

Gleditfch Forftwiff. I. p. 390. no. 7. Ph. *Atomaria*, der *faule Efel.*

33. *Lichenaria*, die *Moosmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 512. no. 15.

Der Grund hellgrau mit vielen, theils dunkelgrünen, theils braunen und grauen Punkten, Zeichnungen und Strichen.

Naturf.

Naturf. XI. p. 67. no. 15. Ph. *Lichenaria.* In der Gröſse der *Vavaria* L. Farben und Zeichnungen, auch die ganze Geſtalt der Raupe dem *Moos* ſo ähnlich, daſs man ſie, wenn ſie darauf ſitzt, kaum davon unterſcheiden kann. (v. *Rottemb.*)

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte, I. St. p. 49. no. 10. t. 3. f. 5-9.

Ph. G. pectinicornis, alis griſeis populeo cupreoque adſperſis; anticis lineis duabus vndulatis nigris albo-diſtinctis, poſticis vna.

34. *Similaria*, der *Semmelvogel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 512. no. 16.

Weiſslichgelb mit braunen Binden, und vielen dergleichen Punkten.

Naturf. XI. p. 67. no. 16. Ph. *Similaria.* Etwas gröſser als *Lichenaria;* aber ſchwer zu beſchreiben. (v. *Rottemb.*)

35. *Binaria*, der *Sperber.*

Berlin. Magaz. IV. p. 516. no. 21.

Okerbraun, mit zween ſchwarzen Punkten auf jedem Oberflügel, deren Spitzen ſichelförmig ſind; das Weibchen etwas heller.

Naturf. XI. p. 68. no. 21. Ph. *Binaria*, das *Weibchen* die Gröſse der *Falcataria*; das *Männchen* kaum halb ſo groſs. (v. *Rottemb.*)

36. *Sepiaria*, die *Zaunmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 516. no. 23.

Dunkel aſchgrau, mit zwo ſchmalen braunen Queerſtreifen.

— p. 624. *Raupe und Phaläne* häufig an alten breternen *bemooſten Zäunen.*

Naturf. XI. p. 69. no. 23. Ph. *Sepiaria.* Von den *kleinſten.* (v. *Rottemb.*)

37. *Faſciolaria*, die *Bandmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 516. no. 24.
Braun, mit gelblichen Binden; der äuſsre Rand gelblich.

Naturf. XI. p. 70. no. 24. Ph. *Faſciolaria.* Auch unter die *kleinſten.* Die *Raupe* auf *Tannen.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 752. no. 72. Ph. *Faſciolaria*, die *Bandmotte.*

38. *Arenaria*, die *Sandmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 518. no. 28.
Weifsgrau, braun beſtäubt, mit geſchlungenen Queerſtreifen durch die Oberflügel.

39. *Quercinaria*, das *gelbe Blatt.*

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 31.
Strohgelb, mit zwo braunen Streifen durch die Oberflügel; alle vier Flügel ausgeſchweift, und ausgezackt.

— p. 624. L. Viel ähnliches mit *Alniaria.*

Naturf. XI. p. 70. no. 31. Ph. *Quercinaria.* Auf beyden Seiten aller vier Flügel blaſsſchwefelgelb. — In der Gröſse der Ph. *Syringaria* — nicht das Männchen der Ph. *Alniaria.* (v. *Rottemb.*)

Kleemanns Beytr. I. p. 219. t. 26. a b. Der zur 3ten Kl. der N V. gehörige hellledergelbe *Spannenpapilion* mit zierlich aus- und eingeſchweiften, auch bräunlichgelb gezeichneten Flügeln.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 655. no. 40. Ph. *Quercinaria*, das *gelbe Blatt.*

40. *Ace-*

40. *Aceraria*, der *Widder.*

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 33.
Ganz leberfarbig, mit kleinen gelblichen Flecken beſäet.
— p. 624. M. Noch eine Art mit weiſslichem Grunde mit verſchiedenen, zum Theil unterbrochenen Queerſtreifen. Vielleicht das *Weibchen*, wie die Fühlhörner anzuzeigen ſcheinen.
Naturf. XI. p. 71. no. 33. Ph. *Aceraria.* Das *Weibchen* hat eine *weiße* Grundfarbe. Das *Männchen* weit ſtärker mit braunen Punkten beſäet. Die Gröſse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

41. *Pruinata*, die *Reifmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 34.
Weiſslichgrün, wie beſtäubt, mit dunkelgrünen, und einer weiſsen ausgekappten Queerſtreife.
— p. 625. N. Einige haben keine grüne Farbe, ſondern fallen ganz ins Weiſsliche, oder ins Röthlichgraue.
Naturf. XI. p. 72. no. 34. Ph. *Pruinata.* Eigentlich *Pruinaria.* Die Grundfarbe aller vier Flügel weiſslichgrün. In der Gröſse der *Vavaria* und *Pectinicornis.* (v. *Rottemb.*)

42. *Puſtulata*, die *Beule.*

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 35.
Schön gelblich grün, mit einem gelblichgrauen Fleck an dem äuſsern Ende des innern Randes aller vier Flügel, dergleichen auch an dem Vorderrande des Unterflügels.
Naturf. XI. p. 72. no. 35. Ph. *Puſtulata.*
Der gelblichgraue Fleck am Unterwinkel

jedes Flügels (in angulo ani). In der Gröfse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 655. no. 41. Ph. *Puſtulata*, die *Beule.*

43. *Serrata*, die *Säge.*

Berlin. Magaz. IV. p. 522. no. 36.
Der Grund weifslich, mit ſehr vielen hellbraunen ausgekappten Queerlinien.

Naturf. XI. p. 72. no. 36. Ph. *Serrata.*
In der Gröfse der *Puſtulata.* (v. *Rottemb.*)

44. *Siterata*, das *grüne Moos.*

Berlin. Magaz. IV. p. 522. no. 39.
Dunkelgrün mit Braun vermiſcht, und einer breiten braunen Binde.

Naturf. XI. p. 73. no. 39. Ph. *Siterata.*
In der Gröfse der *Fimbriata.* (v. *Rottemb.*)

45. *Concatenata*, die *Kette.*

Berlin. Magaz. IV. p. 522. no. 40.
Schmutziggelb mit verſchiedenen grauen, ausgekappten unterbrochenen Queerſtreifen.

46. *Fuſcata*, der *Sperling.*

Berlin. Magaz. IV. p. 524. no. 44.
Durchaus bräunlich grau.

Naturf. XI. p. 73. no. 44. Ph. *Fuſcata.*
Zu den kleinſten Arten. Nicht gröfser, als die *Viridulata.* (v. *Rottemb.*)

47. *Hortulata*, der *Fuchskopf.*

Berlin. Magaz. IV. p. 524. no. 45.

Weifs,

Weifs, mit dunkelgrauen Flecken, der Rückenfchild und Kopf gelb.

48. *Albipunctata*, das *weiße Auge.*

Berlin. Mag. IV. p. 526. no. 48.
Weifsgrau, mit 2 Reihen brauner Punkte, in der Mitte jedes Flügels ein kleiner weifser, braun geränderter Fleck.
Naturf. XI. p. 74. no. 48. Ph. *Albipunctata:* follte *Albipunctaria* heifsen, weil das *Männchen* haarige Fühlhörner hat. *(v. Rottemb.)*
Gleditfch Forftwiff. I. p. 557. no. 11. p. 656. no. 42. Ph. *Albipunctata*, das *weiße Auge.*

49. *Luridata*, der *Hornträger.*

Berlin. Mag. IV. p. 526. no. 49.
Gelblichgrau mit kleinen braunen Strichen befäet, mit 2 roftfarbigen Queerftreifen durch die Oberflügel.
Naturf. XI. p. 75. no. 49. Ph. *Luridata.* In der Gröfse der Ph. *Plagiata. (v. Rottemb.)*

50. *Nigropunctata*, der *Tintenfleck.*

Berl. Mag. IV. p. 526. no. 50.
Weifsgrau, mit blafsgrauen Queerftreifen, und einem fchwarzen Punkt in jedem Flügel.
Naturf. XI. p. 75. no. 50. Ph. *Nigropunctata.* In der Gröfse der *Vavaria. (v. Rottemb.)*
Gleditfch Forftwiff. II. p. 750. no. 60. Ph. *Nigropunctata*, der *Dintenfleck.*

51. *Bidentata*, der *Zweyzack.*

Berlin. Magaz. IV. p. 600. no. 51.
Gelblichbraun, am Rande ins Weifse fallend,

mit einem ſchwarzgrauen, breiten Queerſtreif, der in eine Spitze ausläuft.

Naturf. XI. p. 75. no. 51. Ph. *Bidentata.* In der Gröſse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

52. *Transverſata*, der *Einſiedler.*

Berlin. Magaz. IV. p. 600. no. 52.
Blaſsgelbbraun, mit vielen dunkel- und blaſsgrauen Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 76. no. 51. Ph. *Transverſata.* In der Gröſse der Ph. *Luteolata* ſ. *Crataegata.* (v. *Rottemb.*)

53. *Truncata*, der *Flüchtling.*

Berlin. Magaz. IV. p. 602. no. 56.
Der Grund an der Einlenkung der Flügel rothbraun, in der Mitte grauweiſs beſtäubt, am Ende roſtfarbig und grau, weiſs beſtäubt.

— p. 625. P. Die Farben ſehr abwechſelnd. Sehr ſchwer, ſie am Stamme des Baumes zu erkennen.

Naturf. XI. p. 78. no. 56. Ph. *Truncata.*
In der Gröſse der *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 36. Ph. *Truncata*, der *Flüchtling.*

54. *Dimidiata*, das *abgeſchnittene Band.*

Berlin. Magaz. IV. p. 602. no. 57.
Blaſsgelblichgrau, mit einigen ſchwarzen Punkten, und einem ſchwarzen Strich, ſo kaum bis an die Hälfte der Flügel reicht.

Naturf. XI. p. 78. no. 57. Ph. *Dimidiata.*
Zu den kleinſten; kaum die Gröſse der Ph. *Nymphaeata.*

55. *Cucu-*

55. *Cuculata*, das *Säumchen.*

Berlin. Magaz. IV. p. 602. no. 60.
Weiſs, an der Einlenkung der Oberflügel braun, an der Spitze eine braune Binde; die Unterflügel weiſsgrau.
Naturf. XI. p. 79. no. 60. Ph. *Cuculata.* In der Gröſse der *Clathrata.* (v. *Rottemb.*)

56. *Angulata*, die *Fichtenrinde.*

Berlin. Magaz. IV. p. 604. no. 61.
Grau, mit einer okerbraunen breiten Binde durch die Oberflügel, an der Einlenkung braun.
Naturf. XI. p. 79. no. 61. Ph. *Angulata.* Eigentlich *Angularia.* In der Gröſse der *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

57. *Flaveolata*, die *Kanarienmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 604. no. 63.
Ganz gelblichweiſs.
Naturf. XI. p. 80. no. 63. Ph. *Flaveolata.*
Schmalflüglich; in der Gröſse der *Vrticata.* (v. *Rottemb.*)

58. *Fimbriata*, der *weiße Saum.*

Berlin. Magaz. IV. p. 604. no. 64.
Ganz grasgrün, mit einem weiſsen Rande, und weiſsen Queerſtreifen durch alle vier Flügel.
Naturf. XI. p. 80. no. 64. Ph. *Fimbriata.* Sollte *Fimbriaria* heiſsen, wegen der kammförmigen Fühlhörner. Iſt etwas gröſser als ihn *Röſel* abgebildet hat.
Röſels Inſektenbel. I. NV. 3. Kl. p. 46. t. 13. Das kleine, ſehr ſchlanke und braungeſchuppte *Spannenräuplein.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 97. (nicht Viridata *Linn.*)

Wien. Schmett. p. 97. B. *Schoßraupen. Weißſtriemigte Spanner.*

No. 4. *Haſenöhrchenſpannerraupe* (Bupleuri falcati); *Haſenöhrchenſpanner*, G. *Bupleuraria.* (Fimbrialis *Scop.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 37. Ph. *Fimbriata*, der *weiße Saum.*

Scop. Entom. carn. p. 216. no. 535. Ph. *Fimbrialis. Long.* lin. 6. *Lat.* 5.

Alae capparinae; *anticae* ſtrigis *binis* albis; *poſticae* vna: omnibus fimbria *albida*, *ferrugineo-punctata.* *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 51. no. 454. Ph. *ſtrigata:* Seticornis (Femina), alis viridibus, *margine teſſulato;* ſtrigis *duabus* albis.

— Zool. Dan. Prodr. p. 129. no. 1486. Ph. *Strigata.*

59. *Emarginata*, die *krumme Linie.*

Berlin. Magaz. IV. p. 606. no. 67.

Dunkelgrau, weiſs beſtäubt, mit 2 ausgebogenen gelblichen Queerſtreifen; der äuſsere Rand der Oberflügel ausgeſchnitten.

Naturf. XI. p. 81. no. 67. Ph. *Emarginata.* Nicht die Ph. *Emarginata Linn.* Dieſer in der Gröſse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

60. *Muricata*, die *Purpurmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 606. no. 70.

Am äuſsern Rande oraniengelb, das übrige dunkel

*) Dies ſind die vorzüglichſten Karaktere, um ihn nicht mit *Linn. G. viridata* no. 230. zu verwechſeln.

dunkel purpurroth mit einigen oraniengelben Flecken.

Berlin. Magaz. IV. p. 625. Q. zu den *Klei ſten* dieſer Klaſſe, aber ſchön gezeichnet, und ſelten.

Naturf. XI. p. 81. no. 70. Ph. *Muricata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 748. no. 53. Ph. *Muricata*, die *Purpurmotte.*

61. *Rectangulata*, der *rechte Winkel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 606. no. 71.

Blaſsgrün; die Oberflügel mit einigen dunkelgrauen Queerſtreifen, ſo weiſs gerandet; die Unterflügel hell aſchgrau.

Naturf. XI. p. 82. no. 71. Ph. *Rectangulata.* Nicht die *Rectangulata Linn.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 750. no. 59. Ph. *Rectangula*, der *rechte Winkel.*

Die Flügel grün und braunbandig; unten eine rechtwinklichte Zeichnung.

62. *Halterata*, der *Doppelflügel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 72.

Weiſs mit Aſchgrau beſtäubt; die Unterflügel ganz weiſs.

— p. 626. R. An der Einlenkung der Unterflügel eine Art eines doppelten Flügels.

Naturf. XI. p. 82. no. 72. Ph. *Halterata.* Die mit vier Unterflügeln die *Männchen;* die andern, denen ſie fehlen, die *Weibchen.* (v. *Rottemb.*)

Kleem. Beytr. I. p. 169. t. 19. f. a. b. Der zur 4ten Kl. der N. V. gehörige, und mit 6, als 2 hellgrauen, ſchwarz gezeichneten groſsen *Vorder-* und 4 weiſsgrauen kleinern *Hinterflügeln* gezierte *Papilion.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 109. K. *Scheineulenraupen. Wellenſtriemigte Spanner.*

No. 10. *Bergbuchenſpannerraupe* (Fagi Sylvaticae). *Bergbuchenſpanner*, G. *Hexapterata.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 459. t. 9. f. 8. no. 9. *Phalene à ſix ailes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues d'un gris blancheatre à trois bandes ondées jaunâtres & un point noir, dont le *mâle* a une *troiſieme paire de très-petites ailes.*

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 338. no. 9. t. 9. f. 8. Die *ſechsflüglichte Phaläne.*

Die Phaläne mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und breiten grauweiſslichten Flügeln, mit drey gelblichen gewäſſerten Binden, und ſchwarzem Punkt, davon das Männchen noch ein *drittes Paar ganz kleine Flügel* hat.

63. *Bicolorata*, der *Mittelpunkt.*

Berl. Mag. IV. p. 608. no. 73.

Schneeweiſs; die Oberflügel an der Einlenkung gelbbraun, dergleichen Fleck in der Mitte mit einem ſchwarzen Punkt, am äuſsern Rande ſchwarzgrau.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 557. no. 12. Ph. *Bicolorata*, der *Mittelpunkt.*

64. *Virgata*, die *Stengelmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 74.

Weiſsgrau, mit einer breiten braunen, weiſseingefaſsten Binde durch die Oberflügel, in welchen ein ſchwarzer Punkt.

Naturf. XI. p. 83. no. 74. Ph. *Virgata.* In der Gröſse der G. *Succenturiata* L. (v. *Rottemb.*)

65. *Obli-*

65. *Obliterata*, der *Perpendikel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 75.
An der Einlenkung gelblichgrau, gegen den äuſsern Rand braun, das Weibchen mehr gelbgrau.

— p. 626. S. Sie legen, wenn ſie auf den Blättern ſitzen, die Flügel ſo oben zuſammen, wie die Tagvögel.

Naturf. XI. p. 83. no. 75. Ph. *Obliterata.*
Das *Weibchen* auf der Oberſeite aller 4 Flügel weiſslich und braun beſtäubt; das *Männchen* aber graubraun. *(v. Rottemb.)*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 35. Ph. *Obliterata*, der *Perpendikel.*

66. *Curvata*, der *Krummſtrich.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 76.
Dunkelgrau, mit einer weiſsgrauen breiten Binde.

67. *Rubiginata*, der *Eiſenroſt.*

Berlin. Magaz. IV. p. 610. no. 77.
Roſtfarbig mit 3 dunklern ausgeſchwungenen Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 83. no. 77. Ph. *Rubiginata.* Eine der kleinſten, gleicht in der Gröſse und Grundfarbe der Ph. *Fuſcata*, unterſcheidet ſich aber durch die 3 Queerlinien. *(v. Rottemb.)*

68. *Farinata*, die *Kornmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 610. no. 78.
Weiſslichgrau, fein beſtäubt, welches ihr ein bläuliches Anſehen giebt.

Naturf. XI. p. 84. no. 78. Ph. *Farinata.* Die *Ober-*

Oberflügel aufserordentlich fein grau beſtäubt, daher *perlfarbig*. Die *Unterflügel* ſchneeweiſs. In der Gröſse der *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

69. *Dilatata*, die *Furche.*

Berlin. Magaz. IV. p. 610. no. 81.
Weiſsgrau mit einigen braunen Queerſtreifen und Binden.

Naturf. XI. p. 84. no. 81. Ph. *Dilatata.* In der Gröſse der Ph. *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

70. *Deſignata*, die *braune Binde.*

Berlin. Magaz. IV. p. 612. no. 83.
Aſchgrau, mit einer breiten braunen Binde durch die Oberflügel, welche 2 Spitzen haben.

Naturf. XI. p. 85. no. 83. Ph. *Deſignata.* (v. *Rottemb.*)

71. *Igneata*, die *Brandmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 612. no. 84.
Aſchgrau, mit einer brandgelben Queerbinde durch alle 4 Flügel.

Naturf. XI. p. 85. no. 84. Ph. *Igneata.* In der Gröſse der *Averſata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 749. no. 58. Ph. *Igneata*, die *Brandmotte.*

72. *Serpentata*, die *Welle.*

Berlin. Magaz. IV. p. 612. no. 86.
Röthlichgelb, mit vielen geſchlängelten dunklen Queerlinien.

Naturf. XI. p. 86. no. 86. Ph. *Serpentata.* Die Grundfarbe des *Weibchens* okerbraun; des *Männ-*

Männchens rothbraun. In der Gröfse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)

73. *Spadiceata*, der *Bräunling.*

Berlin. Mag. IV. p. 612. no. 87.
Gelblichgrau mit 2 rothen Queerbinden; die Unterflügel dunkelgrün.

74. *Humiliata*, das *rothe Säumchen.*

Berlin. Mag. IV. p. 614. no. 89.
Schmuziggelb, mit blafsgrauen ausgefchwungenen Queerftreifen; der andere Rand röthlich.

75. *Contaminata*, das *Tifchtuch.*

Berlin. Mag. IV. p. 614. no. 91.
Schneeweifs, an der Einlenkung okerbraun; dergleichen Fleck an dem Vorderrande der Oberflügel; der äufsere Rand grau.
Naturf. XI. p. 86. no. 91. Ph. *Contaminata.* In der Gröfse der *Remutata.* (v. *Rottemb.*)
Gleditfch Forftwiff. II. p. 749. no. 55. Ph. *Contaminata*, das *Tifchtuch.*

76. *Graminata*, die *Erdmotte.*

Berlin. Mag. IV. p. 614. no. 92.
Gelblichgrau, mit weifslichen ausgefchwungenen Queerftreifen.
Naturf. XI. p. 86. no. 92. Ph. *Graminata.* In der Gröfse der *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

77. *Zonata*, das *braune Band.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 93.
Afchgrau, mit einer gelb eingefafsten Binde in den Oberflügeln, in welcher Mitten ein fchwarzer Fleck.

78. *Cor-*

78. *Corculata*, das *ſchwarze C.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 94.
Röthlichbraun, an dem äuſsern Rande ein ſchwarzes C, an der Einlenkung gelblichgrau.
Naturf. XI. p. 87. no. 94. Ph. *Corculata.* In der Gröſse der *Notata.* (v. *Rottemb.*)
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 794. no. 57. Ph. *Corculata*, das *ſchwarze C.*

79. *Innotata*, die *Beyfußmotte.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 95.
Dunkelgrau, mit einem ſchwarzen Punkt in der Mitte der Oberflügel, die Flügel ziemlich lang.
Naturf. XI. p. 87. no. 95. Ph. *Innotata.* In der Gröſse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)
Knochs Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 22. t. 1. f. 7. *Larva.* f. 8. *Phaläna.*

80. *Albulata*, der *Weißling.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 96.
Weiſsgrau mit dunklern Queerſtreifen, in der Mitte eines jeden Flügels ein ſchwarzer Punkt.
Naturf. XI. p. 88. no. 96. Ph. *Albulata.* Nächſt der *Lemmata* die kleinſte. (v. *Rottemb.*)

81. *Coronata*, die *Krone.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 97.
Weiſsgelb mit olivenfarbenen in einander gezogenen Zeichnungen.
Naturf. XI. p. 88. no. 97. Ph. *Coronata.* Die gröſste Aehnlichkeit mit den Ph. *Aquaticis.* In der Gröſse zwiſchen *Potamogata* und *Nymphäata.* (v. *Rottemb.*)

82. *Pal-*

82. *Pallidata*, das *braune Säumchen.*

Berlin. Mag. IV. p. 617. no. 98.
Glänzend, blafsgelb mit einigen feinen braunen Strichen, der äufsere Rand braun.
Naturf. XI. p. 88. no. 98. Ph. *Pallidata.* In der Gröfse der *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

83. *Tridentata*, das *breite Band.*

Berlin. Mag. IV. p. 618. no. 100.
Weifs, an der Einlenkung braun, mit einer breiten braunen Binde durch die Oberflügel.
Naturf. XI. p. 89. no. 100. Ph. *Tridentata.* In der Gröfse der *Remutata.* (v. *Rottemb.*)
Gleditfch Forftwiff. II. p. 749. no. 56. Ph. *Tridentata*, das *breite Band.*

84. *Bifelata*, die *Bürftenmotte.*

Berlin. Mag. IV. p. 618. no. 101.
Schmuziggelb, gegen den äufsern Rand bräunlich grau, mit einem Punkt in der Mitte jedes Flügels.
— p. 626. T. Einige am Ende der beyden Hinterfüfse einen Haufen kleiner Federchen, wie ein Pinfel.
Naturf. XI. p. 89. no. 101. Ph. *Bifelata.* In der Gröfse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)
Gleditfch Forftwiff. I. p. 654. no. 38. Ph. *Bifelata*, die *Bürftenmotte.*

85. *Margine punctata*, die *doppelte Punktreihe.*

Röfels Infektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 41. t. 11.
Die gefchmeidige, mit verfchiedenen Schuppenflecken und Punkten gezierte Spannenraupe. Alis repandis cervinis atomariis, margine flavefcente, *duplici ferie punctorum nigrorum.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 95.

86. *Umbrata*, der *Nachtſchatten.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 21. t. 4.

Die geſchmeidige braune Spannenraupe, mit weiſsen Rücken- und Seitenflecken.

Nigricans, alis cinereis, nigro-punctatis venoſisque.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 33.

87. *Clypeata*, die *Schildmotte.*

Kleemanns Beytr. I. p. 225. t. 26. f. 1-6.

Alis umbroſis nigricantibus, margine *clypeis cinereis.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 25. no. 57.

Die zur N. V. 3 Kl. gehörige, mit 10 Füſsen verſehene glatte, röthlich braungelb gefleckte, und ſchwarz getüpfelte Spannenraupe.

88. *Sericata*, die *Seidenmotte.*

Kleem. Beytr. I. p. 231. 232. t. 27. f. A.

Der zur dritten Kl. der N. V. gehörige, als Seide glänzende, und mit verſchiedenen Kappenzügen gezierte, und gemaſerte bräunlich graue Spannenpapilion. (coll. t. 14. f. 1. 2. t. 28. f. 1. 2.)

Magna. Alis nigro-fuſcis, venis, lineis undulatis, atomisque innumeris nigris.

89. *Rubro-ſtriata*, die *Rothader.*

Kleemanns Beytr. I. p. 301. t. 35. f. A B C D.

Die einſame, glatte, dunkelbräunlich graue zartgeſtreifte, zehnfüſsige Spannenraupe, mit zween höckrigen Abſätzen.

Alis

Alis *anticis* nigricantibus, *rubro-venosis*, *posticis* flaveolatis, nigro-punctatis striatisque.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 27. no. 61.

90. *Glauco-fasciata*, der *Blaustrich.*

Kleemanns Beytr. I. p. 377. t. 40. f. 1-5.

Die halbspannende grasgrüne gelbgestreifte Raupe mit ungleichen Bauchfüfsen des Nachtvogels 2ter Klasse.

Alis aurantiacis, nigro-striatis maculatisque; *anticis* fascia transversa glauca.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 136.

Degeer Ins. I. p. 377. t. 21. f. 10. 11.

Chenille *arpenteuse* verte, à seize jambes, dont les huit intermédiaires membraneuses sont très-inégales entre elles en grandeur.

— *Ueberf.* I. 2 Qu. p. 119. t. 21. f. 10. 11.

Die grüne sechzehnfüfsige *Spannraupe* mit acht stumpfen Mittelfüfsen von ungleicher Gröfse.

91. *Quadrifaria*, das *Schildvögelein.*

Sulzers Gesch. p. 162. t. 23. f. 4.

Braun, auf jedem Flügel mit einem grofsen gelben Fleck, auf beyden Seiten gleich.

92. *Rubro-ciliata*, das *rothe Fränzchen.*

Naturf. III. p. 7. t. 1. f. 3. no. a. (D. *Kühn.*)

Alis stramineis rubro-fasciatis.

Füefsl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 3.

Schäff. Icon. t. 22. f. 5. (verstäubt).

93. *Trifasciata*, die *Dreybinde.*

Naturf. III. p. 7. t. 1. f. 4. no. b. (*Kühn*).

Alis flaveolatis grifeo-atomatis; *tribus faſciis* transverſis rubeſcentibus.

Füeſsl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 4.

94. *Quadripunctata*, der *Vierpunkt.*

Naturf. III. p. 7. t. 1. f. 5. no. c. (*Kühn*).

Alis pallide-flavis, oblique fuſco-ſtriatis, *punctis quatuor fuſcis.*

Füeſsl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 5.

95. *Annulata*, der *Ringelſpanner.*

Naturf. VI. p. 92. t. 4. f. 2. (D. *Schulz*).

Paleacea, ſtriis 2 et faſcia nigra undulata cum *annulo nigro* in cunctis alis. In *Germaniae Dumetis.*

96. *Centumnotata*, der *Hundertſpanner.*

Naturf. VI. p. 93. t. 4. f. 5. (D. *Schulz*).

Albo-nigroque nebuloſa, faſcia lata, in medio anguſtiore cervina, ad apicem alarum.

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 83-84. Ph. *Centumnotata.*

Seticornis; alis ferrugineo-fuſcoque variis, faſcia media griſea *C atro notata.*

97. *Veſtalis*, der *weiße Schleyer.*

Naturf. XIII. p. 30. no. 4. t. 3. f. 7. a b. (*Walch*).

G. *antrorſum* alis *ſuperioribus* albis margine lato cinereo, lineis ferratis nigris et fuſcis ornato; *inferioribus* itidem albis et ad marginem maculis nebuloſis, *retrorſum* alis omnibus unicoloribus dilute cinereis, faſcia obſcuriore et in medio nigro puncto notatis.

98. *Tigris*, der *kleine Tiger.*

Naturf.

Naturf. XIII. p. 31. no. 5. t. 3. fig. 8. a b. (*Walch*).

Antrorſum alae *ſuperiores* albae maculis et punctis nigris; *inferiores* albae punctis tantum nigris ſubtiliſſimis adſperſae; *retrorſum* alae omnes dilute flavae punctis nigris rarioribus.

99. *Frumentata*, der *Getreideſpanner.*

Naturf. XV. p. 112. t. 3. f. a b c. (D. *Meyer.*)

Seticornis, alis rotundatis, *ſuperioribus* albidis, cinereo-faſciato-maculatis, macula vireſcente rhombea; *inferioribus* ſubangulatis fulvis, baſi et margine interiori nigreſcentibus.

Ad *Pragam Bohemiae.*

Larva primo vere victitat graminibus, *frumentis infeſta.*

100. *Pectinataria*, das *gekämmte Fühlhorn.*

Knochs Beytr. zur Inſektengeſch. I. p. 55. t. 3. f. 10.

Alis viridibus; faſciis duabus crenatis lineolaque albeſcente ſubterminali undulata.

101. *Funebris*, der *Trauerſpanner.*

Der *Königl. Norwegiſchen Geſellſch. Schr.* IV. p. 285. t. 16. f. 17.

Seticornis, *alis atris*, maculis albis; *ſuperioribus* tribus, *inferioribus* duabus.

102. *Fulvulata*, der *Sibiriſche Birkenſpanner.*

Pallas Reiſ. Ausz. II. no. 95.

Magnitudo paulo ſupra Crataegatam; corpus nigrum valde hirſutum. Alae *ſuperiores* ſupra fuſco-fuliginoſae; *ſecundariae* luteo-fulveſcentes.

In *Betulis Sibiriae.*

Müllers Suppl. B. p. 313. t. 236. e. Ph. *Fulvulata*, der *Birkenvogel.* *)

103. *Praſinaria*, der *Lerchbaumſpanner.* **)
Wien. Schmett. p. 96. A. no. 3.

104. *Cythiſaria*, der *Geißkleeſpanner.*
Wien. Schmett. p. 97. B. no. 2.

105. *Bajularia*, der *Eichenſpanner.*
Wien. Schmett. p. 97. B. no. 6.
Die *Raupe* immer mit Blütſchuppen und andern dergleichen Dingen beladen; daher könnte man ſie auch den *Laſtträger* nennen.
Geoffr. Inſ. II. p. 126. no. 33.

Pha-

*) Ich könnte hier aus *Gladbachs* Schmetterl. noch einige anführen: allein Beſchreibungen und Abbildungen ſind ſo unvollkommen, daſs der Kenner keine Befriedigung findet. Daher will ich ſie nur nachweiſen.
1) p. 19. t. 9. f. 3. 4. der *kleine rare weiſse Blauſieb.*
2) p. 20. — f. 5. 6. der *weiſse Ochs.*
3) p. 23. t. 11. f. 1. 2. die *kleine Diana.*
4) p. 24. t. 12. f. 1. 2. das *kleine Steindeckerchen.*
5) p. 26. — f. 5. 6. das *Mancheitenvögelchen.*
6) p. 33. t. 14. f. 1-8. t. 15. f. 1-4. die *Halbtrauer.*
7) p. 36. t. 16. f. 6. 7. das *rare Roſevögelchen.*
8) p. 38. t. 18. f. 1. 2. das *Pulvervögelchen.*
9) p. 43. t. 20. f. 1. 2. der *gelbe Vter.*
10) p. 47. t. 21. f. 1-7. das *Kayſervögelchen mit ſeiner Raupe, Geſpinnſt und Puppe.*
11) p. 55. t. 24. f. 7. 8. der *Halbkartun.*
12) p. 63. t. 27. f. 3-6. das *Hirſchbärtchen.*
13) p. 67. t. 29. f. 6. 7. das *kleine Perlhühnchen.*

**) Da das Wiener Werk in den Händen aller Entomologen iſt, ſo habe ich mich hier der Kürze befleiſsigen wollen.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis viridibus, limbo maculaque anguli ani cinereo-fuscis.
La Phalene-verdelet.
Long. 6 lign.

106. *Viridata*, der *Brombeerspanner.*

Wien. Schmett. p. 97. B. no. 7.
Réaum. Inf. Tom. II. Mém. 9. p. 149. *Arpenteuse de la Ronce.*
Albin Inf. t. 48. f. 80. die *Raupe* auf *Haselnußblättern.*

107. *Prodromaria*, der *Lindenspanner.*

Wien. Schmett. p. 99. C. no. 1.
Geoffr. Inf. II. p. 118. no. 22.
Phalaena pectinicornis elinguis albida, nigro-punctata, alis deflexis; *superioribus* fascia duplici fusca dentata nigro-terminata.
La Primtaniere.
Long. 11 lign.

108. *Hispidaria*, *dunkelgrauer gelbhörnigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 99. C. no. 4.

109. *Zonaria*, *Garbenspanner.* *)

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 5.
Chenille arpenteuse de la Jacée. *Réaum.*

110. *Pilosaria*, der *Birnspanner.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 6.

*) No. 108. 109. *Weibchen flügellos.*

111. *Horridaria*, *ſchwarzbrauner, ſchwarzgeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 7.

112. *Lichenaria*, *Baumflechtenſpanner.* *)

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 8.

113. *Corticaria*, *Cerreichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 9.

114. *Cineraria*, *Staubmooſſpanner.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 10.

115. *Roboraria*, *Steineichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 1.

116. *Abietaria*, *Edeltannenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 3.

117. *Rhomboïdaria*, *Gutheinrichſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 4.

118. *Secundaria*, *Weiſstannenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 5.

119. *Cinctaria*, *grauneblichter ringleibiger Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 6.

120. *Crepuſcularia*, *Agleyſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 8.

121. *Vi-*

*) Ob dies unſere Lichenaria no. 33. ſey, kann ich nicht mit Gewiſsheit ſagen.

121. *Viduaria*, (p. 315.) *weißer, ſchwarzgeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 9.

122. *Aerugaria*, *Weichſelſpanner.* *)

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 10.

123. *Leucophaearia*, *Kahneichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 11.

124. *Aeſcularia*, *Roßkaſtanienſpanner.*

Wien. Schmett. p. 102. D. no. 12.

125. *Aceraria*, *Ahornſpanner.*

Wien. Schmett. p. 102. D. no. 13.

126. *Lineolata*, *blaßgrauer, feingeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 1.

127. *Arteſiaria*, *ſchiefergraulicher, mattgeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 2.

128. *Coarctaria*, *hellgrauer engſtreifigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 3.

129. *Arenacearia*, *Kronwickenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 5.

130. *Obliquaria*, *Silbergrauer, ſchregbraunſtreifigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 6.

*) No. 121 - 124. *Weibchen flügellos.* Heiſst p. 315. nun *Bajaria.*

131. *Aureolaria*, *Heckenwickenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 8.
Geoffr. Inſ. II. p. 128. no. 138.
Phalaena pectinicornis elinguis, alis patentibus flavis, lineis ſuperne tribus, inferne duabus transverſis fuſcis.
La double ceinture.
Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

132. *Gilvaria*, *Tauſendblattſpanner.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 10.

133. *Angularia*, *Sandlindenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 3.
Geoffr. Inſ. II. p. 127. no. 36.
Phalaena pectinicornis elinguis, alis patentibus angulatis, fuſco-luteis, faſcia duplici transverſa obſcuriore.
La *Zone.*
Long. 8 lign.

134. *Eroſaria*, *Hageichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 4.

135. *Evonymaria*, *Spindelbaumſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 5.

136. *Pectinaria*, *Tannenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 6.

137. *Lunaria*, der *Holzbirnſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 7.
— p. 276. §. 12. t. I. a. fig. 4.
Pectinicornis alis eroſis, flaveſcenti-rufoque variis, biſtriatis, ſuperioribus macula ad angulum externum *lublunari.*
Fabric.

Fabric. S. E. p. 623. no. 14. Ph. *Lunaria.*
Pectinicornis; alis angulato-dentatis, basi rufis, *lunula* alba, apice cinereis.
Sepp Nederl. Inf. VI. p. 9. t. 2. De *Vlinder* het *Herculesje.*

138. *Flavicaria*, *zart ledergelber randmaklichter Spanner. Unbek. Raupe.*
Wien. Schmett. p. 104. F. no. 12.

139. *Apiciaria*, *oranienfarbiger spitzrandstreifiger Spanner. Unbek. Raupe.*
Wien. Schmett. p. 104. F. no. 14.

140. *Parallelaria*, *oranienfarbiger*, *breitrandstreifiger Spanner. Unbekannte Raupe.*
Wien. Schmett. p. 104. F. no. 15.

141. *Capreolaria*, der *Fichtenspanner.*
Wien. Schmett. p. 105. G. no. 2.

142. *Rubicapraria*, *gänsefarbiger*, *mattstreifiger Spanner. Unbek. Raupe.*
Wien. Schmett. p. 105. G. no. 3.

143. *Murinaria*, *mäusefarbiger*, *hellgraustreifiger Spanner.*
Wien. Schmett. p. 105. G. no. 4.

144. *Glarearia*, *Gelbwickenspanner.*
Wien. Schmett. p. 106. G. no. 6.

145. *Consperſaria*, *weißlichter*, *braunsprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*
Wien. Schmett. p. 106. G. no. 8.

146.

146. *Plumaria*, *Schottenkleeſpanner.*

Wien. Schmett. p. 106. G. no. 9.

147. *Alternata*, *weißgraulicher*, *gelbgerandeter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 106. G. no. 11.

148. *Punctulata*, *grauweißlicher*, *ſchwarzſprenklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 106. G. no. 13.

149. *Omicronaria*, *Maſſernſpanner.*

Wien. Schmett. p. 107. H. no. 3.

Chenille arpenteuſe d' érable. *Réaumur. Geoffr.* Inſ. II. p. 144. no. 71.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, ſingulis faſcia undulata ferrata, et *Omicro* albis.

Les *quatre Omicrons.* *Long.* 4. lign.

150. *Decuſſata*, *graulichtweißer*, *braunſchwarzgegitterter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 107. H. no. 7.

151. *Furvata*, *Mehlbaumſpanner.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 1.

152. *Pullata*, *grauſprenklichter*, *ſchwartzſchattichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 2.

153. *Obſcurata*, *Bocksbeerſpanner.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 3.

154. *Obfuſcata*, *Ellerbaumſpanner.*
Wien. Schmett. p. 108. I. no. 4.

155. *Carbonaria*, *Knotenmooſſpanner.*
Wien. Schmett. p. 108. I. no. 5.

156. *Vetulata*, *mattbrauner*, *rothſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 1.

157. *Rhamnata*, *Kreuzdornſpanner.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 2.

158. *Dilutata*, *Heckeichenſpanner.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 4.

159. *Impluviata*, *Gartenbirnſpanner.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 5.

160. *Rupeſtrata*, *fahlweißer*, *blaßbraunſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 6.

161. *Sylvata*, *Rothtannenſpanner.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 7.

162. *Polycommata*, *rindefarbiger*, *ſchwartzſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 8.

163. *Salicata*, *Bandweidenſpanner.*
Wien. Schmett. p. 109. K. no. 11.

164. *Albulata*, *lilienweißer*, *gelblichtſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 12.

165. *Rivulata*, *brauner*, *weißſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 13.

166. *Terſata*, *hellbrauner*, *mattſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 14.

167. *Vitalbata*, *Linenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 15.

168. *Luteata*, *hellederfarbiger*, *jonkillengelbſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 18.

169. *Rubricata*, *röthelſteinfarbiger*, *dunkelſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 19.

170. *Pallidata*, *weißlichter*, *braungelbſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 21.

171. *Oſſeata*, *beinfarbiger*, *bräunlichſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 22.

172. *Candidata*, *Rothbuchenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 23.

173. *Sub-*

173. *Subumbrata*, *hellgrauer*, *dunkelgerändeter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 25.

174. *Pusillata*, *Wacholderspanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 26.

175. *Minutata*, *Wermuthspanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 27.

176. *Variata*, *Pechtannenspanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 28.

177. *Badiata*, *Heckerosenspanner.*

Wien. Schmett. p. 111. L. no. 3.

178. *Caesiata*, *blaugrauer*, *dunkelstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 112. L. no. 6.

179. *Olivata*, *Eschenspanner.*

Wien. Schmett. p. 112. L. no. 7.

180. *Pistacata*, *Graslindenspanner.*

Wien. Schmett. p. 112. L. no. 8.

181. *Fulvata*, *hochgelber*, *oranienstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 112. M. no. 4.

Forsteri nov. Spec. Ins. p. 76. no. 76. Ph. *Fulvata.*

Seticornis, alis rotundatis, anticis fulvis, fascia ad basin, aliaque in medio undato repanda, ferrugineo-rufa.

In Angliae *Crataego oxyacantha.*

182. *Ligu-*

182. *Liguſtrata*, *Hartriegelſpanner.*

Wien. Schmett. p. 112. M. no. 5.

183. *Propugnata*, *graubräunlichter, ſchwarzbraunſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 112. M. no. 7.

184. *Linariata*, *Leinkrautſpanner.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 9.

185. *Spadicearia*, *okerbräunlicher, rothſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 12.

186. *Montanata*, *milchweißer, fahlbraunſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 14.

187. *Ruſticata*, *ſchmuzigweißer, ſchwarzbraunſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 15.

188. *Tophaceata*, *gelbweißer, grauſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 16.

189. *Ruſſata*, *zimmetbrauner, ſchwarzſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 18.

190. *Silaceata*, *dottergelber, ſchwarzgrauſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 20.

191. *Rubicata*, *dunkelrother*, *ſchwarzſtreifichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113 M. no. 22.

192. *Berberata*, *Sauerdornſpanner.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 23.

193. *Derivata*, *taubenhalsfarbiger*, *braungeſtrichter Spanner.* *Unbek Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 24.

194. *Procellata*, *weißer*, *bandſchwarzſtreifichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 1.

195. *Reticulata*, *ſchwarzfleckichter*, *weißaderichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 3.

196. *Vetuſtata*, *flachsfarbiger*, *ſchwarzbraunfleckichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 4.

197. *Rubiginata*, *ſchneeweißer*, *roſtgelbfleckichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 5.

198. *Sinuata*, *mattweißer*, *graubraunfleckichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 6.

199. *Centaureata*, *Flockenblumenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 7.

200. *Aduſtata*, *Spillbaumſpanner.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 9.

201. *Alpinata*, *ſammetſchwarzer*, *oranienfleckichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 115. N. no. 14.

202. *Griſeata*, *lichtgrauer Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 2.

203. *Illibata*, *weißer*, *wellenrandflüglichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 5.

204. *Taminata*, *weißer*, *auſſenrandſprenklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 6.

205. *Heparata*, *leberbrauner*, *ſaumſprenklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 8.

206. *Euphorbiata*, *Wolfsmilchſpanner.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 9.

207. *Pyraliata*, *Wollſtrohſpanner.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 1.

208. *Virgulata*, *weiſsgrauer*, *geradeſchattigter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 8.

209. *Moniliata*, *milchrahmfarbiger*, *perlrandichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 9.

210. *Fim-*

210. *Fimbriata*, *gelblichtweiſser*, *braungerandeter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 11.

211. *Scrulata*, *helfenbeinfarbiger*, *rundmaklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 12.

212. *Decorata*, *weiſser*, *blaurandmaklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 13.

213. *Aeruginaria*, *blaßgraugrüner Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. no. 10.

214. *Serotinaria*, *gelbweiſslichter*, *grauſprenklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 315. no. 14.

215. *Honoraria*, *trübgelbrother*, *doppeltſtreifichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 315. no. 18.

216. *Diverſata*, *braunrother und oranieugelber Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien Schmett. Nachtr. p. 315. no. 14.

217. *Dilucidaria*, *hellſilbergrauer*, *ſchwarzgrauſchattichter Spanner.* *Unbekannte Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 315. no. 6.

218. *Anguſtata*, *ſchiefergrauer*, *weiſs- und düſterſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 315. no. 30.

219. *Scripturaria*, *mattweiſser*, *ſchwarzſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 31.

220. *Inundaria*, *braungrauer*, *weiſs- und ſchwarzſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 32.

221. *Suffumata*, *grauweiſslichter*, *rauhſchwarzſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 27.

222. *Luctuata*, *ſchwarz und weiſswechſelnder Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 28.

223. *Blandiata*, *milchweiſser*, *ſchwarzgrauſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 15.

224. *Conſpicuata*, *hochgelber*, *ſchwarzgerandeter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 16.

225. *Nebulata*, der *Nebelſpanner.*

Scop. Entomol. carn. p. 215. no. 532.
Alae ſupra albido - cervinoque nebuloſae, ſubtus pallidiores; poſticae ſubangulatae.
Long. lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{4}$.

226. *Retialis*, der *Netzſpanner.*

Scop. Entomol. carn. p. 217. no. 536.
Alae albae, venis faſciisque 4 murinis *reticulatae.*
Long. lin. 6. *Lat.* 4.

227. *Pun-*

227. *Punctinalis* der *Punktſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 537.
Alae albae; ſerie transverſa *punctorum* fuſcorum, faſcia obſoleta ſubmarginali atomisque fuſcis.
In *arboribus pomiferis.*
Long. lin. 10½. *Lat.* 6.

228. *Feneſtrella*, der *Fenſterſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 538.
Alae fuſceſcentes, erectae, dentatae, punctis rufis albisque.
Long. lin. 3½. *Lat.* 2.
Floribus involat.

229. *Niveata*, der *Schneeſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 539.
Alba tota et immaculata.
Long. lin. 7. *Lat.* 4¼.
In *Pratis.*
Wien. Schmett. p. 116. O. *Spreckenraupen, einfärbige Spanner.*
No. 4. *Unbek. Raupe. Weiſser, plattrandflüglichter Spanner*, G. *Nivearia.*

230. *Lineata*, der *randlinichte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 218. no. 540.
Alba tota; *linea marginali* venisque ſubtus fuſcis.
Long. lin. 10. *Lat.* 6.
In *Pomariis.*

231. *Exanthemata*, der *roſtpunktirte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 218. no. 542.

Alba; ſtrigis obſoletiſſimis *punctatisque* copioſis *ferrugineis*, utrinque variegatas alas gerens.

Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

In *Salicetis.*

Wien. Schmett. p. 107. H. *Strichraupen; wechſelnde Spanner.*

No. 5. *Unbek. Raupe. Weiſser, braungelblichtgeſtrichter Spanner.*

232. *Punctata*, der *ſchwarze Mittelpunkt.*

Scop. Entom. carn. p. 218. no. 543.

Alba; alis omnibus utrinque puncto nigro medio; *anticis* punctis 7 nigris marginem externum utrinque occupantibus.

Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* $3\frac{3}{4}$.

In *collibus herbidis.*

233. *Ornata*, der *geſchmückte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 219. no. 545.

Alba; alis omnibus ſupra faſciis binis limbi: antica undata.

Long. lin. 6. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

In Pratis *Carnioliae.*

Wien. Schmett. p. 117. P. *Fadenraupen. Bogenſtriemichte Spanner.*

No. 14. *Unbek. Raupe. Schneeweiſser, bräunlichtrandfleckichter Spanner*, G. *Ornata.*

234. *Glaucata*, der *blaurandigte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 220. no. 549.

Alba; alis *anticis* faſcia media ſubeluta fuſcescente, ad marginem inferiorem glauco-fuſcoque varia.

Long. lin $5\frac{1}{3}$. *Lat.* 4.

In *Sylvis.*

235. *Chlorosata et Mucronata*, der *holztaubenfarbige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 222. no. 551. Ph. *Chlorosata.*
Albida; seu colore eodem fere ut vultus in Cachexia virginea.
Long. lin. 7. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.
In Pascuis.

No. 552. Ph. *Mucronata.*
Osso-cinerea; alis *anticis* apice acuminatis lineaque fusca ibidem.
Long. lin. 8. *Lat.* $5\frac{2}{3}$.
In *Salicetis.*

Wien. Schmett. p. 107. E. *Zweigschossraupen. Geradstreifichte Spanner.*
No. 7. *Unbek. Raupe. Holztaubenfarbiger, gelbgestrichter Spanner.* G. *Palumbaria:* Chlorosata et Mucronata *Scop.*

236. *Verberata*, der *Striemenspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 223. no. 554.
Albida; alis *anticis* strigis 5 undatis transversis fusco-ferrugineis, duabus posticis approximatis.
Long. lin. 7. *Lat.* 5.
In *sterilioribus pratis.*

237. *Vndulata*, der *Wellenspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 223. no. 555.
Alae cinereae; *anticae* fascia lata fusco-cinereoque nebulosa dentata; punctis duobus nigris, undulisque obsoletis crebris obscurioribus transversim strigatae.
Long. lin. $7\frac{1}{3}$. *Lat.* 5.
In *Sylvis.*

Wien. Schmett. p. 111. L. *Runzelraupen. Mittelſtreifichte Spanner.*

No. 5. *Lülchſpannerraupe* (Lolii perennis); *Lül hſpanner*, G. *Bipunctaria.*

238. *Contaminata*, der *Schmuzſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 225. no. 559.

Alae utrinque faſciis cinereis et ferrugineis alternantibus coloratae, atomisque fuſcis adſperſae.

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

In *herbidis montanis.*

239. *Menſurata*, der *kaffeſpitzige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 225. no. 560.

Alae cineraſcentes; atomis fuſcis obſitae; *anticae* faſciis tribus lineaque apicis caffeatis; margine paleaceo.

Long. lin. 6. *Lat.* 5.

In *ſiccis et apricis collibus.*

Wien. Schmett. p. 111. L. no. 2. *Treſpeſpannerraupe* (Bromi arvenſis); *Treſpeſpanner*, G. *Menſuraria.*

Schaeff. Icon. t. 76. f. 4. 5.

240. *Moeniata*, die *Kaffeſtreife.*

Scop. Entom. carn. p. 226. no. 561.

Alae *anticae* albido-cineraſcentes, *faſcia caffeata* dentata, margine paleaceo.

Long. lin. $8\frac{1}{3}$. *Lat.* 6.

In *Sylvis.*

Wien. Schmett. p. 112. M. *Schuppenraupen. Eckeſtreifichte Spanner.*

No. 1. *Unbek. Raupe. Veilgrauer, braunſtreifichter Spanner*, G. *Moeniaria.*

241. *Lac-*

241. *Laccata*, der *Lackſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 226. no. 563.

Alae ſupra viridanae; faſciis binis poſticis primorumque margine craſſiore *laccatis.*

Long. lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.

In *Juniperetis* verno tempore.

242. *Inflammata*, der *Feuerſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 226. no. 564.

Alae *anticae* hepaticae; diſco ſubtus nigricante; utrinque maculis quinis lineaque limbi *aureis; poſticae* fuſcae; faſciis binis maculaque *aureis.*

Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.

In *Pratis.*

243. *Aurata*, der *Goldfleckigte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 227. no. 565.

Habitus et colores ut in priore, ſed alae *anticae* maculis 4; *poſticae* unica utrinque *aureis*, faſciis nullis.

Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.

In *Montanis.*

244. *Ochrata*, der *Okerſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 227. no. 567.

Alae *ochrae* colore, ſubtus obſcuriores, utrinque ſtrigis transverſis repandis obſcurioribus.

Long. lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.

In *Montanis.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 129. no. 1489. Phal. *Ochrata.*

Seticornis, alis albo-flaveſcentibus; anticis ſtrigis undulatis 2-3; *poſticis* puncto diſci fuſco.

Geoffr. Inſ. II. p. 153. no. 87.

Ph. feticornis ſpirilinguis; alis deflexis albo-flaveſcentibus, faſcia duplici transverſa fuſca.

La *Phalene blanchâtre à deux bandes brunes.*

Long. 7. lign.

Wien. Schmett. p. 110. K. *Scheineulenraupen; wellenſtrichichte Spanner.*

No. 20. *Schwingelſpannerraupe.* (Feſtucae duriuſculae); *Schwingelſpanner*, G. *Ochreata.*

245. *Limitata*, der *hirſchhornfarbiggeſäumte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 568.

Alae ferrugineae; *anticae* ſupra faſcia lata nigro puncto ſignata, limboque cervinis.

Long. lin. 8. *Lat.* $5\frac{1}{4}$.

In *Pratis noſtris.*

246. *Spataceata*, der *beinfarbige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 570.

Alae oſſeae; ſtrigis transverſis obſcurioribus repandis obſoletis, puncto nigro vtrinque notatis.

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

247. *Alpinata*, der *haarbrüſtige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 571.

Fuſco-cervina; *thorace* capiteque nigricantibus *tomentoſis.*

Long. lin. $5\frac{1}{4}$. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.

In ſummis herbidisque cacuminibus *Alpium Vochinenſium.*

248. *Murinata*, der *mäuſefarbige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 229. no. 572.

Murina

Murina tota; absque maculis fasciisque.
Long. lin. $4\frac{2}{3}$. *Lat.* 3.

249. *Rivulata*, der *bachgestrichte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 229. no. 573.
Alba; alis *anticis rivulis* ferrugineis; *posticis* fascia strigisque duabus transversis fuscis; omnibus striga marginali vtrinque ferruginea.
Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Pratis.*

250. *Litterata*, der *Buchstabenspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 229. no. 574.
Alae cervinae; *anticae* linea transversa postica, alia antica, hisque interiecta littera (V) albis; posticae fasciis binis angustis albis.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Pratis.*

251. *Laevigata*, der *geglättete Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 230. no. 575.
Cinereo-murina; alis subdentatis; denticulis puncto nigro notatis; *anticis* strigis punctatis duabus nigris.
Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Arbustis.*
Wien. Schmett. p. 117. P. *Fadenraupen, bogenstriemichte Spanner.*
No. 10. *Unbek. Raupe, röthlichweißer düsternstriemichter Spanner.*

252. *Inquinata*, der *Sudelspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 230. no. 576.
Tota pallide ferruginea; alis omnibus supra fasciis bilineatis fusceſcentibus, subtus immaculatis.
Long.

Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Pratis.*

253. *Tenebrata*, der *braundüſtere Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 230. no. 577.
Fuſceſcens; alis *anticis* ſubtus macula flava; *poſticis* utrinque faſcia flava.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Montanis.*

254. *Deſpicata*, der *Winkelkriecher.*

Scop. Entom. carn. p. 231. no. 579.
Alae cervinae aut murinae; *anticae* faſcia poſtica maculisque binis marginalibus; *poſticae* faſciis binis ferrugineis.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* $2\frac{3}{4}$.
In incultis, ſiccis neglectisque locis.

255. *Nigrata*, der *Schwärzling.*

Scop. Entom. carn. p. 231. no. 580.
Fuſca; alis omnibus fimbria faſciaque albis; anticis punctis binis albis.
Long. lin. $3\frac{1}{2}$. *Lat.* 2.

256. *Aethiopata*, der *Mohr.*

Scop. Entom. carn. p. 231. no. 581.
Nigra; alis omnibus utrinque faſcia albida.
Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{4}$.
In *herbidis ſubſylveſtribus.*

257. *Obfuſcata*, der *Bräunling.*

Scop. Entom. carn. p. 232. no. 582.
Fuſco-nigra; alis omnibus alba fimbria maculaque flava.

Long.

Long. lin. 3. *Lat.* 2.
In *calidiore Carniolia.*

258. *Trilineata*, die *Dreylinie.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 128.
Alis concoloribus flavis rotundatis.
In *Pratis.*

259. *Trifaſciata*, die *Dreybinde.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 116. no. 129.
Alis rotundatis concoloribus flavis faſciis tribus utrinque ſuperne obſcurioribus, inferne fuſcis.

260. *Nivearia*, der *weiße engliſche Spanner.**)

Fabric. Syſt. Entomol. p. 620. no. 2.
Pectinicornis; alis ſubangulatis albis; margine poſtico anticisque ſubtus fuſcis; poſticis puncto centrali nigro.

261. *Cultraria*, der *deutſche Sichelſpanner.*

Fabric. S. E. p. 621. no. 9.
Pectinicornis; alis *ſubfalcatis*, luteis; faſcia ſaturatiori, antennis apice ſetaceis.

262. *Dentaria*, der *engliſche Zahnſpanner.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 15.
Pectinicornis; alis angulato-dentatis, ſupra pallidis; ſtrigis ferrugineis, ſubtus ferrugineis; *lunula* obſcuriore.

263. *Undaria*, die *indianiſche Braunwelle.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 16.

Bipe-

*) An *Niveata* Scopoli? no. 229.

Bipectinicornis; alis dentatis albis, *fuſco-undatis;* antennis apice ſetaceis.

264. *Rondelaria.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 18.

Pectinicornis; alis anticis griſeis; poſticis ferrugineis.

In *Rondeletia Indiae orientalis.*

265. *Turcaria*, der *deutſche Weißmond.*

Fabric. S. E. p. 624. no. 22.

Pectinicornis; alis griſeo-nebuloſis, omnibus ſubtus puncto nigro; *lunula alba.*

266. *Limbaria*, der *engliſche Schwarzſaum.*

Fabric. S. E. p. 624. no. 24.

Pectinicornis; alis ferrugineis; *limbo* nigro; poſticis ſubtus nigris, albo-ſtriatis.

267. *Ocularia*, das *indianiſche Weißauge.*

Fabric. S. E. p. 625. no. 28.

Pectinicornis; alis rotundatis, flavis, omnibus *puncto ocellari* albo.

268. *Annularia*, der *deutſche braunringlichte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 625. no. 29.

Pectinicornis; alis cinereis; ſtriga *annulo* faſciisque duabus fuſcis.

269. *Praſinaria*, der *engliſche wieſengrüne Spanner.*

Fabric. S. E. p. 626. no. 33.

Pectinicornis; *alis viridibus;* ſtrigis tribus; anticis obſcurioribus, poſtica alba.

270. *Vi-*

270. *Viridaria*, der *engliſche Grünling.*

Fabric. S. E. p. 626. no. 34.
Pectinicornis; alis rotundatis *viridibus;* albo-ſtrigoſis, maculisque marginalibus atris.

271. *Feneſtraria*, der *chineſiſche Blauſtrich.*

Fabric. S. E. p. 627. no. 38.
Pectinicornis; alis rotundatis; atris, *coeruleo-ſtriatis* maculatisque.

272. *Venaria*, die *indianiſche Schwarzader.*

Fabric. S. E. p. 627. no. 39.
Pectinicornis; alis luteis; margine *venisque* dilatatis, ramoſis, *nigris.*

273. *Plumbaria*, der *engliſche bleyfarbige Spanner.*

Fabric. S. E. p. 628. no. 44.
Pectinicornis; *alis plumbeis;* ſtrigis tribus punctoque medio fuſcis.

274. *Faſciata*, die *indianiſche Schneebinde.*

Fabric. S. E. p. 629. no. 47.
Seticornis; alis angulatis fuſcis; *faſcia nivea.*

275. *Regulata*, die *braſilianiſche Braunlinie.*

Fabric. S. E. p. 629. no. 48.
Seticornis; alis angulatis cinereis, *anticis litura fuſca.*

276. *Falcata*, der *engliſche Sichelſpanner.*

Fabric. S. E. p. 629. no. 49.
Seticornis; alis *falcatis* fulvis; punctis duobus fuſcis inter ſtrigas luteas.

277. *De-*

277. *Demandata*, der *Leipziger Purpurthau.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 50.

Seticornis; alis ſubangulatis, luteſcentibus; ſtrigis tribus punctoque medio fuſcis.

Statura *Amatariae*, at minor; alae omnes flaveſcentes, *purpureo ſubtiliſſime irroratae.*

278. *Explanata*, der *chineſiſche Monſonſpanner.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 51.

Seticornis; alis dentatis ferrugineis, faſcia fuſca, puncto nigro.

Muſ. *Monſon.*

279. *Dimidiata*, der *engliſche halbgelbe, halbbraune Spanner.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 52.

Seticornis; alis dentatis; *antice flavis, poſtice fuſcis.*

280. *Irrorata*, der *oſtindianiſche braunbereifte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 53.

Seticornis; alis dentatis flavis, *fuſco-irroratis*, ſubtus macula faſciaque poſtica fuſcis.

281. *Ulmata*, der *engliſche Ulmenſpanner.*

Fabric. S. E. p. 632. no. 62.

Seticornis, alis albis, faſciis duabus ferrugineo-fuſcis, poſtica maculari.

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 13. t. 3. De *Porcelein-Vlinder.*

282. *Rufata*, der *engliſche Fuchs.*

Fabric. S. E. p. 633. no. 68.

Seti-

Seticornis; alis cinereis, poſtice ferrugineis, ſtriga alba, punctisque marginalibus nigris.

283. *Bimaculata*, der *Leipziger Zweyfleck.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 76.
Seticornis; alis albis; *anticis* maculis *duabus coſtalibus* fuſcis.

284. *Volutata*, der *deutſche Linienſtrich.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 77.
Seticornis; alis omnibus viridibus, *ſtrigis duabus albis.*

285. *Lyncea*, der *engliſche Großpunkt.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 79.
Seticornis; alis rotundatis, albis, faſciis duabus punctoque apicis fuſcis.

286. *Exſpectata*, der *aſiatiſche Roſtrand.*

Fabric. S. E. p. 636. no. 82.
Seticornis; alis rotundatis viridibus, *margine ferrugineo.*

287. *Duplicata*, die *engliſche Doppelſtreife.*

Fabric. S. E. p. 636. no. 84.
Seticornis; alis griſeis; ſtrigis duabus fuſcis *duplicatis.*

288. *Punctata*, der *engliſche Punktrand.*

Fabric. S. E. p. 637. no. 89.
Seticornis; alis rotundatis niveis, puncto medio fuſco, *margineque nigro punctato.*

289. *Sociata*, die *Engliſche Zahnbinde.*

Fabric. S. E. p. 637. no. 90.

Seticornis; alis flaviſſimis, faſcia lata, fuſca, retrorſum dentem exſerente.

290. *Niveata*, der *Amerikaniſche Schneeſpanner.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 94.
Seticornis; alis ſtriatis, *niveis*, immaculatis.

291. *Coſtata*, die *Amerikaniſche Roſtrippe.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 95.
Seticornis; alis niveis; anticis *coſta ferruginea.*

292. *Stictica*, der *Afrikaniſche gepickelte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 96.
Seticornis; alis concoloribus rufis, margine nigro, albo-punctato.

293. *Capitata*, der *Indianiſche Roſtkopf.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 97.
Seticornis; cinerea; *capite* thoracis alarumque margine baſi *ferrugineis.*

294. *Argentata*, der *Chineſiſche Silberſtrich.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 99.
Seticornis; alis apice flavis; *anticis* ſtrigis duabus *argenteis;* poſticis macula quadruplici nigra.

295. *Sulphurata*, der *Indianiſche Schwefelſpanner.*

Fabric. S. E. p. 639. no. 100.
Seticornis; alis flavis; maculis margineque poſtico fuſco-ferrugineis.

296. *Perſpectata*, der *Oſtindianiſche Spiegelſpanner.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 640. no. 107.

Seticornis; alis antici griſeis, *hyalino-maculatis*; poſticis *hyalinis;* margine flavo, *hyalino*-maculato.

297. *Indicata*, der *Tottiſche orientaliſche Spanner.*

Fabric. S. E. p. 640. no. 106.

Seticornis; alis flavis; *anticis* ſtrigis tribus, duabus undatis, fuſcis.

Muſ. *Tottianum.*

298. *Derogata*, der *orientaliſche Königsſpanner.*

Fabric. S. E. p. 641. no. 109.

Seticornis; alis albis; ſtrigis plurimis fuſcis. *Koenig.*

299. *Ejectata*, der *orientaliſche*, *glasfleckichte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 641. no. 110.

Seticornis; alis fuſco flavoque variis; maculis *hyalinis* ſparſis.

300. *Feneſtrata*, das *Amerikaniſche Glasfenſter.*

Fabric. S. E. p. 641. no. 111.

Seticornis, flava; alis *albo-hyalinis;* ſtrigis flavis numeroſis, ſubanaſtomoſantibus.

301. *Strigaria*, der *oſtindiſche Strichſpanner.*

Fabric. S. E. App. p. 831. no. 9-10.

Pectinicornis; alis angulato-caudatis, albis; *ſtrigis* undatis fuſcis, ſupra duabus, ſubtus unica.

302. *Equeſtraria*, der *gelbe Ritter.*

Fabric. Mantiſſ. p. 284. no. 11-12.

Pectinicornis; alis angulatis; anticis fuſcescentibus, *faſcia lata flava*, poſticis flavis.
Habitat *Hamburgi.*

303. *Ilyraria*, der *Surinamiſche Bartafter.*

Fabric. Mantiſſ. p. 284. no. 17-18.
Pectinicornis; alis angulatis viridibus; anticis ſtrigis tribus fuſcis.
Anus *rufo-barbatus.*
Cramer Pap. exot. I. t. 10. fig. E. Ph. *Ilyrias.*

304. *Monilaria*, der *Indianiſche grüne Zahnflügel.*

Fabric. Mantiſſ. p. 285. no. 15-16.
Pectinicornis; *alis dentatis viridibus*, ſtriga punctorum nigrorum; poſticis puncto duplici albo.

305. *Roraria*, der *europäiſche Braunreif.*

Fabric. Mantiſſ. p. 285. no. 24-25.
Pectinicornis; alis flavis *fuſco-irroratis*; anticis apice nigris.

306. *Ditaria*, der *Hamburgiſche Roſtfleck.*

Fabric. Mantiſſ. p. 286. no. 33-34.
Pectinicornis; alis viridibus, maculis marginalibus ferrugineis.

307. *Marginaria*, der *Hamburgiſche Randſtrich.*

Fabric. Mantiſſ. p. 286. no. 40-41.
Pectinicornis; alis albidis pulverulentis, omnibus ſtriga marginali punctorum nigrorum.

308. *Cynara*, die *Surinamiſche Zynara.*

Fabric. Mantiſſ. p. 286. no. 47-48.

Seticor-

Seticornis; alis angulatis, fuſco-albo-nigro-fulvoque variis; poſticis ſubtus albis.
Cramer Pap. exot. II. t. 15. fig. CD. Ph. *Cynara.*

309. *Sinuata*, der *Winkelſpanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 287. no. 49-50.
Seticornis; alis emarginato-griſeis; punctis duobus fuſcis inter ſtrigas albidas.
In *Germania.*

310. *Mantata*, der *Surinamiſche Mantoſpanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 287. no. 49-50.
Seticornis; alis angulatis fuſcis; faſcia obſcuriore, anteriorum puncto ocellari atro.
Cramer Pap. exot. I. t. 10. fig. F. Ph. *Manto.*
Müllers Regiſt. Band p. 312. Ph. *Manto*, der *Dreyeckflügel.*

311. *Obſcurata*, der *Schulziſche Zahnflügel.*

Fabric. Mantiſſ. p. 287. no. 54-55.
Seticornis; alis dentatis griſeis, ſtrigis pallidioribus undatis obſoletis.
In *Germania.*

312. *Nitata*, der *kleine Wiſchpunkt.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 55-56.
Seticornis; alis ſubdentatis obſcure griſeis; ſubtus pallidioribus puncto faſciaque fuſcis.
In *Germania.*

313. *Equeſtrata*, der *ſchwarze Ritter.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 65-66.
Seticornis; alis omnibus *nigris*, faſcia fulva.
Habitat *Hamburgi.*

314. *Coerulata*, der *himmelblaubandirte Spanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 67-68.

Seticornis; alis obſcure viridibus fuſco-faſciatis, faſciisque duabus *coeruleis.*

Hamburgi.

315. *Griſata*, der *Grauling.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 72-73.

Seticornis; alis *griſeis;* anticis ſtriga, faſcia punctoque fuſcis.

Habitat *Hamburgi.*

316. *Fimbriata*, der *Gelbſaum.*

Fabric. Mantiſſ. p. 289. no. 77-78.

Seticornis; alis plumbeis; faſcia lata fuſca *flavo-marginata.*

In *Germania.*

Schaeff. Icon. t. 80. fig. 6. 7.

317. *Rivulata*, der *ſchwarzbandirte Spanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 289. no. 79-80.

Seticornis; alis albidis; *faſciis duabus nigris;* poſteriore terminali.

In *Germania.*

318. *Lunulata*, der *Gelbmond.*

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 84-85.

Seticornis; alis fuſcis poſtice ſtrigis undatis flavis.

Verſus marginem poſticum ſtrigae tres *e lunulis flavis.*

In *Germania.*

319. *Me-*

319. *Mediata*, der *Zentralpunkt.*

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 89-90.
Seticornis; alis omnibus griſeo-undatis, *puncto centrali* fuſco margineque nigro-punctato.
In *Germania.*

320. *Centrata*, das *ſchwarze Zentrum.*

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 90-91.
Seticornis; alis flaveſcentibus, fuſco-undatis; *anticis puncto centrali nigro.*
Habitat *Hamburgi.*

321. *Variegata*, die *Buntſchecke.*

Fabric. Mantiſſ. p. 291. no. 92-93.
Seticornis; alis omnibus purpureis, maculis margineque flavis.
Habitat *Hamburgi.*

322. *Melata*, der *Nordamerikaniſche Rothafter.*

Fabric. Mantiſſ. p. 291. no. 99-100.
Seticornis; alis atris albo-maculatis; *ano rufo.*
Cramer Papill. exot. II. t. 18. fig. D.

323. *Elevata*, der *Südamerikaniſche Silberſaum.*

Fabric. Mantiſſ. p. 291. no. 107-108.
Seticornis; alis flaviſſimis, fuſco-punctatis (argenteo-ciliatis), ſubtus immaculatis.

324. *Matronaria*, der *Matronenſpanner.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 433.
Pectinicornis; alis undatim faſciatis; anticis cinereis fuſcisque, poſticis cinereis.

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1455.
— Litura angulo apicis inferiori. —
Schaeff. Icon. t. 12. f. 1. 2?

325. *Faginaria*, der *Buchenſpanner.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1456.
Subpectinicornis; alis dentato-eroſis, fulvis; *anticis* ſtrigis duabus transverſis fuſcis; *poſticis* unica.

326. *Curvata*, das *Krummhorn.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1469.
Ph. G.? Seticornis, ſpirilinguis, *corniculis* duobus recurvis baſi criſtatis, alis plano incumbentibus.
Norv. *Forvaelde.*
Stroem Söndmör. 190. no. 9.

327. *Alternata*, die *Wechſelbinde.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1484.
Seticornis; alis dentatis, faſciis albis nigricantibusque alternis, ſtriga marginali duplici undata.
— Faun. Fridr. p. 51. no. 452.
Schaeff. Icon. t. 126. fig. 2.

328. *Teſſulata*, der *Würfelrand.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1485.
Seticornis; alis omnibus *margine teſſulato*, diſco cinereo, ſubtus luteſcentibus; ſtrigis undulatis albis.
— Faun. Fridr. p. 51. no. 453.

329. *Vſtulata*, der *Brandſpanner.*

Müllerí

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1487.

Seticornis; alis glaucis; ſtrigis tribus undatis, interruptis, albis, margine nigro teſſulato.

330. *Paſcuata*, der *Viehweidenſpanner.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1488.

Seticornis; alis albis; ſupra ſtrigis quinque ſubluteſcentibus; ſubtus tribus nigricantibus punctoque diſci nigro.

331. *Flexuata*, die *Bogenlinie.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1490.

Seticornis; alis murinis; anticis lineis transverſis tribus, *media flexuoſa;* omnibus ſubtus ſtrigis duabus punctoque diſci obſcuris.

332. *Duplicata*, der *Zwillingfleck.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1491.

Seticornis; alis flaveſcentibus, macula media ocellari *didyma* nigra; margine poſtico fuſco.

Strigae duae obſcurae *undulatae* in quibusdam.

333. *O. Miata*, der *O M Spanner.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1492.

Seticornis; alis albidis, ſtrigis quatuor cinereis, ſecunda in figuras *literarum O M* curvata.

334. *Albata*, der *doppelte Weißſtrich.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1493.

Seticornis; alis anticis luteo-fuſcis baſi apiceque ferrugineis; poſticis cinereis, *ſtriga duplici alba.*

335. *Flammata*, der *Flammenſpanner.*

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 21. t. 5. De *Worbelhout-Vlinder.*

Seticornis, alis fuſcis *flammeolatis;* poſticis cinereis, lineis undulatis transverſis albis.

336. *Fulvo-ſtriata*, der *braungelbgeſtrichte Spanner.*

Geoffr. Inſ. II. p. 131. no. 45.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis; alis patentibus albido-luteis; omnibus fulvo transverſim denſe ſtriatis.

La *Phalene ſtriée fauve.*

Long. 5. lign. *Larg.* 1. pouce.

337. *Inaequalis*, die *ungleiche Queerlinie.*

Geoffr. Inſ. II. p. 132. no. 47.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, fuſco-nebuloſis; *lineis transverſis inaequalibus.*

La *Bande inégale.*

Long. 7. lign. *Larg.* 13. lign.

338. *Marginaria*, der *Bindenpunkt.*

Geoffr. Inſ. II. p. 133. no. 49.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereo-obſcuris, linea faſciaque alarum transverſa obſcuriore; *puncto marginali nigro.*

La *Bande à point marginal.*

Long. 5. lign.

339. *Griſeo-nigra*, der *ſchwarzgraue Spanner.*

Geoffr. Inſ. II. p. 134. no. 51.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus *cinereis;* atomis maculisque nigris.

La

La *Griſaille.*
Long. 11. 12. 14. lign.

340. *Sulcata*, die *weiße Pickelbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 134. no. 52.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, faſciis plurimis transverſis, nonnullis connexis, atomisque fuſcis.

La *rayure blanche picotée.*
Long. 5. lign. *Larg.* 13. lign.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 180. no. 6.

Phalaena media, colore vario e ſordido flaveſcente ſeu fulveſcente et nigro, cum tribus lineis transverſis nigris in exterioribus alis.

341. *Ferruginata*, die *Roſtbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 140. no. 62.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus albidis, atomis cineraſcentibus, et faſcia duplici undulata *ferruginea.*

Les *atomes à deux bandes.*
Long. $5\frac{1}{2}$ lign. *Larg.* 1 pouce.

342. *Interrupta*, die *Bruchbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 141. no. 65.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus niveis; omnibus pone faſcia undulata fuſca, ſuperiorum margine externo maculis nigris.

La *bande interrompue.*
Long. $4\frac{1}{2}$ lign. *Larg.* 8 lign.

343. *Brunneata*, die *Braunlinie.*

Geoffr. Inſ. II. p. 142. no. 67.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus albis; linea duplici undulata *fuſca.*

La *Phalene blanche à lignes brunes ſans points*

Long. 5. lign. *Larg.* 1. pouce.

344. *Limbata*, der *Zahnſaum.*

Geoffr. Inſ. II. p. 143. no. 70.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus cinereis, faſciis plurimis fuſcis undulatis transverſis, *limbo ſubdentato.*

La *Brocatelle brune.*

Long. 4. lign.

345. *Fuſco-venoſa*, die *Braunader.*

Geoffr. Inſ. II. p. 144. no. 72.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus cinereis, margine exteriore fuſco, punctoque alarum nigro.

La *Nervure brune.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

346. *Viridi-faſciata*, die *Grünbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 144. no. 73.

Phal. Setic. ſpiril. alis patentibus viridi-fuſcoque variegatis, faſcia triplici undulata obſcuriore.

La *Phalene à bandes vertes.*

Long. 5. lign. *Larg.* 11. lign.

347. *B. ata*, der *Neuyorkiſche B-Spanner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 15. t. 7. f. 2.

Ailes environ *un pouce & demi.*

Setic. Alis *anticis* furvis, flavo-lineatis, verſus apicem *litera B. flava; poſticis* hilare rubris atro-maculatis.

348. *Li-*

348. *Lineola*, die *Neuyorkiſche Einlinie.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 16. t. 8. f. 2.

Ailes environ *deux pouces.*

Seticornis. Alis dentatis aurantiacis concoloribus; *lineola unica* transverſa per omnes alas fuſca.

349. *Uncinularia*, der *Neuyorkiſche Hakenſpanner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 17. t. 8. f. 3. *)

Ailes *un pouce & trois quarts.*

Pectinicornis. Alis pallide viridi-flaveſcentibus, *atro-uncinulatis.*

Cramer Pap. exot. III. t. 228. Fig. E. Ph. *Catenaria.*

350. *Argentata*, der *ſierraleoniſche Silberſpanner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 25. t. 14. f. 2.

Ailes *presque un pouce & trois quarts.*

Seticornis; alis cinereis, *bacillis flavis, argenteo-marginatis; poſticis ocellis binis nigris.*

351. *Area*, die *ſurinamiſche Area.*

Cramer Pap. exot. I. p. 88. t. 56. Fig. D.

Alis concoloribus niveis; *anticis* margine anteriore binis lineolis luteis; *poſticis* dentato-ciliatis, quatuor lineis incurvatis aurantiacis, anticarum partem tangentibus.

352. *Cydonia*, die *ſurinamiſche Zydonia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 34. t. 22. Fig. F.

Alis

*) Ich bin ungewiſs, ob die Phal. *Drury* I. t. 20. f. 3. 4. Geometrae oder Noctuae ſind.

Alis fuſco-cinereis albicantibus margine obſcuriore; *anticis* binis lineis transverſis fuſcis, albo-marginatis.

353. *Deolis*, die *weſtindiſche Deolis.*

Cramer Pap. exot. I. p. 59. t. 36. Fig. F.

Alis *anticis* ſubfalcatis, dente prominente, viridi-micantibus, binis ocellis nigris, iride aurantiaca, *poſticis* incarnatis.

354. *Diores*, die *ſurinamiſche Diores.*

Cramer Pap. exot. I. p. 119. t. 75. Fig. F. *Mas.*

Alis fuſco-incarnatis, lineis transverſis fuſcis undulatis; *anticis* linea ex quatuor o compoſita; *poſticis* dentatis.

355. *Feſtiva*, der *ſurinamiſche Staatsſpanner.*

Cramer Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. C. *Mas.*

Alis griſeo-albis, nigro-venoſis.

356. *Heſperia*, die — *Heſperia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 87. t. 56. Fig. C.

Alis antice cyaneis; poſtice purpuraſcentibus, media faſcia transverſa lata incurvata alba.

357. *Merops*, der *ſurinamiſche Merops.*

Cramer Pap. exot. I. p. 26. t. 18. Fig. C.

Alis rubicunde variegatis; linea transverſa albido-atra undulata.

358. *Myrrha*, die *ſurinamiſche Myrrha.*

Cramer Pap. exot. I. p. 47. t. 29. Fig. G.

Alis *ochreaceis* concoloribus aterrime marginatis; linea *anticarum* transverſa atra.

359. *Sy-*

359. *Syringa*, die *koromandelſche Syringa.*

Cramer Pap. exot. I. p. 8. t. 5. Fig. CD. *Foem.*

Alis *anticis* vireſcentibus; transverſis faſciis rubicundis; *poſticis* rubris nigro-maculatis.

360. *Amabilis*, die *ſurinamiſche Schöne.*

Cramer Pap. exot. II. p. 24. t. 112. Fig. G. *Belle Cloporte.*

Alis niveis; *anticis* longitudinaliter late fuſco-faſciatis; *poſticis* puncto et litera J *deauratis;* atomis numeroſis nigris.

361. *Carinenta*, die *koromandelſche Karinenta.*

Cramer Pap. exot. II. p. 47. t. 128. Fig. F.

Magna. Alis denticulatis vireſcentibus punctatis; *anticis* binis lunulis literisque 7 atris; lineolisque longitudinalibus undulatis nigris.

362. *Cenis*, die *chineſiſche Zenis.*

Cramer Pap. exot. II. p. 82. t. 147. Fig. E.

Alis albicantibus fuſco-maculatis, corpore aurantiaco; *thoracis imagine humana* atro-ſignata, abdominis annulis nigris.

363. *Faſciata*, der *bataviſche Bandſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 12. t. 104. Fig. D.

Alis niveis; faſciis transverſis incarnatis; *poſticis* acute dentatis, tribus margine exteriore punctis atris.

364. *Geminia*, die *amboiniſche Geminia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 57. t. 133. Fig. C.

Alis niveis, transverſe fuſco-faſciatis; *anticarum* margine anteriore nigro-liturato; *poſticis* obtuſe

obtuſe dentatis, dentium baſi binis maculis atris.

Clerk Icon. t. 56. f. 3. 4. Geom. *Sambucaria.* (Alſo nicht *Linn. Samb.*)

365. *Gyges*, der *ſurinamiſche Gygesſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 9. t. 102. Fig. B.

Alis furvis; *anticis* binis lituris albis; *poſticis* diſco albo.

366. *Hilaria*, die *ſurinamiſche Hilaria.*

Cramer Pap. exot. II. p. 26. t. 113. Fig. F.

Alis *anticis* incarnatis, faſcia transverſa ſulphurea, binis ocellis nigris, iride aurantiaca; *poſticis* aurantiacis.

367. *Hypanus*, der *ſurinamiſche Hypanusſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 42. t. 142. Fig. D.

Alis caneſcentibus; faſciis fuſcis transverſis, multisque globulis fuſcis.

368. *Labda*, der *ſurinamiſche Labdaſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 129. t. 181. Fig. D.

Alis *anticis* flaveſcentibus, bacillo transverſo luteo; *poſticis* albis margine incarnatis, omnibus ciliatis.

369. *Lactitinia*, die *koromandelſche Laktizinia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 47. t. 128. Fig. E.

Alis furvis; *anticis* quatuor maculis albis, binis anterioribus coalitis, punctisque binis albis; *poſticis* albo-fuſcis.

370. *Lothos*, der *ſurinamiſche Lothosſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 136. t. 185. Fig. G.

Alis

Alis fuſcis aurantiaco-faſciatis, lineolisque transverſis nigris undulatis.

371. *Marmorata*, der — *Marmorſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 87. t. 151. Fig. F.

Alis *marmoratis* atro-punctatis lineolisque transverſis undulatis nigris; *poſticis* denticulatis.

372. *Netrix*, die — *Näherinn.*

Cramer Pap. exot. II. p. 87. t. 151. Fig. E.

Alis dentatis viridi-flaveſcentibus, numeroſis punctis cineraſcentibus; *poſticis* binis maculis albis ſinuoſis.

373. *Oſiris*, die *ſurinamiſche Oſiris.*

Cramer Pap. exot. II. p. 28. t. 115. Fig. E.

Alis nigris, quatuor magnis maculis hilare flavis.

374. *Perdica*, die — *Perdika.*

Cramer Pap. exot. II. p. 127. t. 178. Fig. E.

Alis incarnatis, fuſco-marginatis, *anticis* faſcia transverſa fuſca, et *ſemicirculo* fuſco communi.

375. *Phylira*, die *ſurinamiſche Phylira.*

Cramer Pap. exot. II. p. 113. t. 170. Fig. D.

Alis concoloribus viridibus, *anticis poſticisque* binis ocellis fuſcis glauco-pupillatis; *poſticis* dentatis.

376. *Polita*, der *ſurinamiſche V-Spanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. E.

Alis flaviſſimis fuſco-maculatis; *anticis* binis litteris V fuſcis verſus marginem anteriorem; *poſticis* dentatis, macula inaequali fuſca magna.

377. *Rhanis*, die *weſtindiſche Rhanis.*

Cramer Pap. exot. II. p. 34. t. 119. Fig. BC.

Alis vireſcentibus, diſco communi rubeſcente, quatuor uncinulis rubris binis maculis flavis, lineaque transverſa alba undulata.

378. *Amata*, der *ſurinamiſche Liebling.*

Cramer Pap. exot. III. p. 62. t. 228. Fig. F.

Alis niveis, hilare-viridi-longitudinaliter faſciatis.

379. *Apidania*, die *ſurinamiſche Apidania.*

Cramer Pap. exot. III. p. 103. t. 152. Fig. CD. C. *Mas.* D. *Foem.*

Alis concoloribus olivaceis, violaceo-lituratis.

380. *Brunnea*, der *ſurinamiſche Bräunling.*

Cramer Pap. exot. III. p. 171. t. 187. Fig. G.

Alis nigro-purpuraſcentibus, atro-transverſe faſciatis.

381. *Canente*, die *koromandelſche Kanente.*

Cramer Pap. exot. III. p. 98. t. 250. Fig. C.

Alis incarnatis, fuſco-lituratis.

382. *Clelia*, die *koromandelſche Klelia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 172. t. 288. Fig. BC.

Alis dentato-falcatis fuſco-canis; atomis numeroſis nigris, *poſticis* margine furvis.

383. *Elco-*

383. *Eleonora*, die *koromandelſche Eleonora.*

Cramer Pap. exot. III. p. 172. t. 288. Fig. EF. *Mas. G. Foem.*

Alis fuſco-olivaceis ſubdentatis luteo-albo-que marginatis, faſcia transverſa communi alba.

384. *Erota*, die *ſurinamiſche Erota.*

Cramer Pap. exot. III. p. 152. t. 276. Fig. G.

Alis nigerrimis concoloribus, faſcia transverſa communi aurantiaca; *poſticis* margine binis lineis coeruleis.

385. *Flaviaria*, der *ſurinamiſche Gelbling.*

Cramer Pap. exot. III. p. 171. t. 287. Fig. F.

Alis ſubfalcatis; *anticis* flavo-olivaceis; *poſticis* hilarioribus.

386. *Formoſanta*, die *ſurinamiſche Formoſanta.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. G.

Alis fuſco-rubris; *poſticis* binis ocellis nigris albo-pupillatis iride alba, punctisque argenteis.

387. *Gootenaria*, die *ſurinamiſche Gootenaria.*

Cramer Pap. exot. III. p. 102. t. 252. Fig. B. *Magna.* Alis fuſcis; *anticis* nigro-hieroglyphicis, tribus maculis albis; *poſticis* lineis longitudinalibus nigris undulatis.

388. *Heſperia*, die *Guinéiſche Heſperia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 99. t. 251. Fig. A. *Foem.* B. *Mas.*

Alis albo-virescentibus, basi fusco-radiatis; lineis transversis apice fuscis; *posticis* nigro-venosis, margine aurantiaco-fuscis.

389. *Lincea*, die *surinamische Linzea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 61. t. 228. Fig. B.

Alis nigro-fuscis; *anticis* tribus maculis olivaceis, apice posticisque semiluteis.

390. *Polita*, die *surinamische Polita.*

Cramer Pap. exot. III. p. 152. t. 276. Fig. F.

Alis incarnatis, fasciis transversis communibus flavissimis; *posticis* fasciis marginalibus flavis, aureis luteisque.

391. *Tasima*, die *surinamische Tasima.*

Cramer Pap. exot. III. p. 80. t. 240. Fig. DE.

Alis falcato-dentatis incarnatis, numerosis punctis nigris, fasciis longitudinalibus communibus olivaceis luteisque.

392. *Titea*, die *virginische Titea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. C.

Alis griseis; *anticis* atro-punctatis, strigisque transversis fusco-nigris; *posticis* linea marginali nigra undulata.

393. *Trosonia*, die *kapensische Trosonia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. F.

Alis *anticis* ferrugineis, albo-maculatis; *posticis* incarnatis.

394. *Veſulia*, die *ſurinamiſche Veſulia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 79. t. 240. fig. B C.
Alis griſeo-flaveſcentibus, atro-punctatis, nigro-venoſis; *poſticis* binis acervulis punctorum atrorum.

395. *Virginiaria*, die — *Virginiaria.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. fig. G.
Alis griſeis, fulvo-punctatis, lineis longitudinalibus undulatis fuſcis continuis et interruptis.

396. *Martia*, die *ſurinamiſche Martia.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 32. t. 305. fig. D.
Alis ſubdentatis, *anticis* incarnatis faſciis transverſis latis, ſtrigisque undulatis fuſcis; *poſticis* rubeſcentibus.

397. *Nina*, die *ſurinamiſche Nina.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 31. t. 305. fig. E.
Alis *anticis* glauceſcentibus fuſco-maculatis, ſtriatisque; *poſticis* rubeſcentibus margine poſtico albo.

398. *Degeeriaria*, der *Degeeriſche Holunderſpanner.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 446. no. 2.
Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes horizontales d'un brun griſeatre, à grandes taches luiſantes d' un blanc jaunâtre.
Phalene du Sureau.
— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 326. no. 2.
Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen braungrau-

lichen Flügeln, mit grofsen, glänzenden, weifsgelblichen Flecken.

Die *Holunderphaläne.*

Goed. Inf. Tom. I. (ed. gall.) t. 68.
Liſt. Goed. p. 136. no. 55. f. 55.
Blank. Inf. t. 15. F. G. H.
Albin. Inf. t. 37. a b c d.
Réaum. Inf. Tom. I. t. 15. f. 7. 8. 9.

399. *Biſtortata*, der *Natterwurzſpanner.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 449. no. 5. t. 8. f. 16.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues, d' un blanc ſale variées de nuances griſes, avec deux lignes transverſes d' un brun noirâtre ſur chaque aile.

Phalene blanche ſale à deux rayes noirâtres.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 330. no. 5. t. 8. f. 16.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und weifsgrauen, breiten, mit graulichen Schattirungen, geſcheckten Flügeln, und zwo braunſchwärzlichen Queerlinien auf jedem.

Die ſchmuzigweiſse Phaläne mit zwo ſchwärzlichen Streifen.

400. *Nigro-faſciaria*, die *Schwarzſtreife.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 457. no. 8. t. 9. f. 5.

Phalene à antennes filiformes; à trompe; à ailes étendues couleur de lilas mêlée de gris & de blanc ſale, avec trois rayes ondées transverſes noires.

Phalene lilas à rayes noires.

Degeer

Degeer Ueberſ. II B. I Th. p. 336. no. 8. t. 9. f. 5.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und breiten, lilafarbigen, grau und ſchmuzigweiſs gemiſchten Flügeln, mit drey ſchwarzen gewäſſerten Queerſtreifen.

Die lilafarbige Phaläne mit ſchwarzen Streifen.

401. *Abietaria*, der *Tannapfelſpanner*.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 462. no. 10. t. 9. f. 12.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues griſes à rayes ondées noires & griſeatres, avec un point noir & une bande d'un brun rouſſâtre.

Phalene de l' arpenteuſe de la Pomme de Sapin.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 340. no. 10. t. 9. f. 12.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und breiten grauen Flügeln, mit wellenförmigen, ſchwarzen und graulichten Streifen, einem ſchwarzen Punkt, und einer braunröthlichen Binde.

Der Tannapfelſpanner.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01476 4096